

1. 卡介苗（BCG）接种是预防小儿结核病的有效措施。我国计划免疫要求在全国普及新生儿卡介苗接种。
2. 小儿年龄的分期：婴儿期是指出生后到1周岁；幼儿期是指1周岁到3岁；学龄前期是指3周岁到6~7岁；学龄期是指6~7岁到进入青春前期。
3. 会阴部骑跨伤，可引起尿道球部损伤。骨盆骨折引起尿道膜部撕裂或撕断，经尿道器械操作不当可引起球膜部交界处尿道损伤。
4. 上腹痛和上腹饱胀不适是胰腺癌最常见的首发症状。早期由于胰、胆管梗阻，管腔内压增高，呈上腹钝痛、胀痛，可放射至后腰部。少数患者呈剧痛。
5. 早产儿病理生理特点：①体温调节中枢不成熟，稳定性不好；②体表面积相对较大，散热多；③皮下脂肪少，贮热能力低，供应热能的棕色脂肪组织发育未成熟；④过冷时肌肉颤动的反应少，控制血液流至皮肤微血管的血管扩张能力差；⑤胃肠发育不全，无法摄取足够热量来维持体温；⑥汗腺功能不足，妊娠32周以后出生的婴儿不会出汗；⑦活动力差等。
6. 甲亢是甲状腺功能亢进的简称，是由多种原因引起的甲状腺激素分泌过多所致的一组常见内分泌疾病。临床上甲亢患者主要表现为：心慌、心动过速、怕热、多汗、食欲亢进、消瘦、体重下降、疲乏无力及情绪易激动、性情急躁、失眠、思想不集中、眼球突出、手舌颤抖、甲状腺肿大等。
7. 新生儿寒冷损伤综合征简称新生儿冷伤，又称新生儿硬肿症。主要由寒冷损伤引起，主要表现为低体温和多器官功能损伤，严重者出现皮肤硬肿。多见于早产儿和寒冷的季节，也可发生在严重的败血症过程中。以皮肤、皮下脂肪组织硬化、水肿为特征，以早产、窒息、感染的新生儿为常见，重症可出现多器官功能损害。
8. 新生儿出生后2~3天出现黄疸，称为生理性黄疸。新生儿体内胆红素在10天左右开始下降，生理性黄疸逐渐消退。
9. 滴虫阴道炎是一种常见的性传播疾病，以黄绿色、稀薄泡沫样白带增多与外阴瘙痒为主要症状。
10. 外阴阴道假丝酵母菌是由假丝酵母菌引起的常见外阴阴道炎症。以外阴奇痒、白带增多和尿频、尿痛以及性交痛为主要症状。典型白带呈豆腐渣样或乳凝块样。
11. 开放性气胸伤侧胸腔压力等于大气压，肺受压萎陷，健侧胸膜仍为负压，使纵隔向健侧移位。同时由于健侧胸腔压力仍可随呼吸周期而增减，从而引起纵隔扑动。

12. 发生张力性气胸时，胸壁、肺、支气管或食管上的创口呈单向活瓣，与胸膜腔相通，吸气时活瓣开放，空气进入胸膜腔，呼气时活瓣关闭，空气不能从胸膜腔排出。因此随着呼吸，伤侧胸膜腔压力不断增高，以至超过大气压。
13. 细菌性痢疾患者由于痢疾杆菌对肠道的破坏作用，使得肠壁细胞坏死并出血，临床上出现**脓血黏液便**。**柏油样便**见于上消化道大量出血患者。
14. 深昏迷是指患者意识全部丧失，对外界各种刺激均无反应，**角膜反射、瞳孔反射、咳嗽反射、吞咽反射及腱反射均消失**，呼吸不规则，血压下降，全身肌肉松弛。
15. 共济失调型脑瘫亦称脑瘫，是指由于出生前、出生时、婴儿早期的某些原因造成的非进行性脑损伤所致的综合征，主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常，可伴有智能落后及惊厥发作、行为异常、感觉障碍及其他异常。共济失调型主要病变在小脑及其通路上，**多见于脑积水、颅脑外伤、脑炎或小脑肿瘤等疾病后遗症**。
16. 半卧位**有利于腹腔引流及血液循环**，并增加肺潮气量，可减轻腹部张力，使患者舒适，可使腹部渗血渗液流注盆腔以避免形成膈下脓肿。
17. **冠状动脉造影**目前被称为诊断冠心病的金标准。可明确病变范围、程度，并为选择治疗方法（手术、介入、药物）提供依据并可评估风险，同时可行左室造影确定左室收缩功能和有无室壁瘤。
18. 临产开始的标志为**有规律且逐渐增强的宫缩**，持续 30 秒或以上，间歇 5~6 分钟，同时**伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降**。
19. 膀胱结石典型症状为**排尿突然中断**，并感疼痛，放射至阴茎头部和远端尿道，**伴排尿困难和膀胱刺激症状**，**改变姿势后，能缓解和继续排尿**。
20. 急性感染性多发性神经根神经炎典型的**脑脊液检查为细胞数正常而蛋白质明显增高**，称蛋白细胞分离现象。
21. **AFP（甲胎蛋白）**的测定对诊断肝细胞癌及滋养叶细胞恶性肿瘤有重要的临床价值。
22. 热疗可促进**浅表炎症的消退和局限**；热疗可使**局部血管扩张，改善血液循环，增强新陈代谢和白细胞的吞噬作用**；在炎症后期用热疗可以促使白细胞释放出蛋白溶解酶，溶解坏死组织，使炎症局限。
23. “1、2、3”灌肠溶液的成份是：**50%硫酸镁 30ml、甘油 60ml、温开水 90ml**。各种成分的量不可混淆，否则达不到预期效果。
24. 朵贝儿溶液作用：为碱性溶液，有防腐、抗菌、消毒、收敛作用。可轻微抑菌，消除口臭。用途：急、慢性咽炎，扁桃体炎等，作清洁口腔作用。适用于口腔 pH 中性时。

25. 瞳孔直径大于 5mm 称为瞳孔散大。双侧瞳孔散大，常见于颅内压增高、颅脑损伤、颠茄类药物中毒及濒死状态；一侧瞳孔扩大、固定，常提示同侧颅内病变（如颅内血肿、脑肿瘤等）所致的小脑幕裂孔疝的发生。

26. 红外线灯头至照射部位斜上方或侧方，一般灯距为 30~50cm，以患者感觉温热为宜；每次照射时间为 20~30 分钟，如皮肤出现桃红色的均匀红斑，为合适；如皮肤出现紫红色，应立即停止照射，并涂凡士林以保护皮肤。

27. 马斯洛需求层次理论从低到高按层次分为五种，分别是：生理需要、安全需要、爱与归属的需要、自尊的需要和自我实现需要。一般情况下，生理性需要是最重要的，只有它得到满足之后，人才得以生存，然后才考虑其他的需要。

28. 脂溶性维生素包括维生素 A、D、E 和 K。

29. 主观资料即护理对象的主诉，是其对经历、感觉、思考及担心的内容进行的诉说。如“我感觉不舒服”“我担心自己的病治不好了”“我的头很疼”等。客观资料是护士通过观察、体检或借助诊断仪器和实验室检查获得的资料。如“患者体温 37.5℃”“血红蛋白 70g/L”“患者 1 周内体重下降 2kg”等。

30. 肌酐试验实验期为 3 天，前两天是准备期，最后 1 天为试验期，均选用无肌酐饮食，于第 3 天清晨空腹抽血。

31. 肌肉注射最常用的注射部位为臀大肌，其次为臀中肌、臀小肌、股外侧肌及三角肌。

32. 全麻术后最常见的不良反应为呕吐，呕吐的危险性在于引起误吸，造成呼吸道梗阻，甚至窒息，或麻醉后肺部并发症。为防止这一意外事故的发生，对全麻术后未清醒的患者，宜采取去枕平卧，头偏向一侧，这种体位既有利于呕吐物流出、避免误吸，也不影响患者的血压和呼吸。

33. 十二指肠溃疡最明显的症状是空腹或夜间时腹痛，进食后缓解，而胃溃疡是在饭后 2~3 小时内会疼痛。同时，胃会有勒紧的不适感及胸口闷烧等。溃疡恶化出血时，大便会呈黑色。胃出血时也会吐血，此时的血如同咖啡渣样的颜色。出血量多时，会导致贫血。

34. 鹅口疮又名雪口病、白念菌病，由真菌感染引起，是儿童口腔的一种常见疾病。在口腔黏膜表面形成白色斑膜，多见于婴幼儿。本病是白色念珠菌感染所引起。这种真菌有时也可在口腔中被发现，当婴儿营养不良或身体衰弱时可以发病。

35. 急性胰腺炎的疼痛处理：遵医嘱给予抗胰酶药物、阿托品或哌替啶等解痉药物。禁用吗啡，以免 Oddi 括约肌痉挛收缩。

36. 有机磷农药进入体内后迅速与体内的胆碱酯酶结合, 形成磷酸化胆碱酯酶, 使胆碱酯酶失去催化乙酰胆碱水解为胆碱和乙酰的能力, 造成乙酰胆碱在体内大量积聚, 使以乙酰胆碱为介质的胆碱能神经发生功能紊乱而出现一系列症状。**双瞳缩小, 呼吸困难, 满肺湿啰音是毒蕈碱样症状的表现**, 为乙酰胆碱兴奋 M 受体致平滑肌兴奋的结果。

37. ①先兆流产: 出血量要比平时少, 伴有或不伴有下腹痛或腰背痛, 检查中可见**宫颈口未开**, 子宫增大, 且与妊娠周数相符。②难免流产: 多由先兆流产发展而来。难免流产时, 阴道流血较先兆流产增多, 阵发性腹痛逐渐加剧, 或出现阴道流水 (胎膜破裂), 检查可见**宫颈口已扩张**, 有组织物堵塞或见胎膜囊膨出, 子宫与妊娠周数符合或较小。③不全流产: 难免流产排出物不完全; 检查可见**子宫口多较松弛**, 有时可见组织堵塞于子宫口, 子宫多小于妊娠周数, 流血时间过长可引发贫血、感染。④完全流产: 难免流产排出物完全, 检查可见**子宫口关闭**, 子宫接近正常大小。

38. **上腹部疼痛**是胃溃疡的主要症状。多位于上腹部, 也可出现在左上腹部或胸骨、剑突后。常呈隐痛、钝痛、胀痛、烧灼样痛。胃溃疡的疼痛多在餐后 1 小时内出现, 经 1~2 小时后逐渐缓解, 直至下餐进食后再复现上述节律。部分患者可无症状, 或以出血、穿孔等并发症作为首发症状。十二指肠溃疡以**空腹痛和夜间痛多见, 进食后疼痛缓解**。

39. 维生素 D 可由皮肤经日照产生, 如日照不足, 尤其在冬季, 需定期通过膳食补充。对于婴儿及儿童来说, 日光浴是使机体合成维生素 D 的重要途径。

40. 急性梗阻性化脓性胆管炎是由阻塞引起的急性化脓性胆道感染, 一般起病急骤, 突发**剑突下和 (或) 右上腹持续性疼痛**, 伴恶心呕吐, 继而出现**寒战、高热、黄疸等 Charcot 三联征**, 近半数患者出现神志淡漠、烦躁不安、意识障碍、血压下降等征象。

41. 胰头癌的主要症状包括中上腹饱胀不适、隐痛、钝痛、胀痛, 恶心、食欲不振, 体重减轻, 进行性、无痛性黄疸, 皮肤瘙痒、小便色黄, **大便色淡呈白陶土样**。

42. 流行性乙型脑炎是由乙脑病毒引起的脑实质炎症疾病, 春夏季多发, 主要**经蚊传播**。以**高热、意识障碍、抽搐以及脑膜刺激征**为主要症状。

43. 婴儿辅食添加需根据小儿营养需求和消化能力具体制订, 按照**由少到多、由稀到稠、由细到粗、由一种到多种的原则循序渐进地添加**。

44. 心脏的正常起搏点位于**窦房结**, 对其他心肌自律细胞具有抢先占领和驱动抑制的作用, 所以窦房结是心脏激动起源, 产生兴奋沿**结间束→房室结→房室束→左右束支→浦肯野纤维**依次向下传导, **兴奋广泛心肌细胞**。

45. 癫痫一次发作**超过 30 分钟**，或两次发作间歇期意识不能恢复者，称为癫痫持续状态。癫痫持续状态以持续、频繁的癫痫发作、全身抽搐和意识持续丧失为主要特征。

46. 胎盘早剥是指**妊娠 20 周后或分娩期**，正常位置的胎盘在胎儿娩出前，部分或全部从子宫壁剥离。以妊娠晚期孕妇突然发生的腹部持续性疼痛，**伴有或不伴有阴道流血**为主要特征。

47. 营养性缺铁性贫血是由于体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少而引起的一种小细胞低色素性贫血，以 6 个月至 2 岁的小儿多见，是小儿贫血中最常见的一种。**铁摄入不足**是导致小儿缺铁性贫血的主要原因。

48. 钾是细胞内液的主要阳离子；正常值为 **3.5~5.5mmol/L**。

49. **肝、脾、胰、肾**等实质性脏器损伤时，主要表现为腹腔内出血。

50. 组成胎盘的一条**静脉和两条动脉**是一条管腔较大、管壁较薄的脐静脉和两条管腔较小、管壁较厚的脐动脉。