

## 2021 年 7 月临床执业医师月度考试（第三单元）

- 1、（A1 型选择题）缺铁性贫血实验室检查不正确的是
- A.总铁结合力升高
  - B.细胞中央淡染区扩大
  - C.血清蛋白低于正常
  - D.红细胞内游离原卟啉下降
  - E.红细胞内游离原卟啉升高
- 2、（A1 型选择题）胎心率变异减速的特征不包括哪项
- A.胎心率恢复迅速
  - B.胎心率下降迅速
  - C.恢复缓慢
  - D.持续时间长短不一
  - E.发生与宫缩有固定关系
- 3、（A1 型选择题）哮喘患儿出现持续状态应采取的治疗措施
- A.脱敏疗法

B.去除诱导因素

C.口服免疫抑制剂

D.口服氨茶碱类药物

E.静脉应用糖皮质激素

4、（A1 型选择题）下列哪项不是中毒型细菌性痢疾的临床特征

A.多见于 2~7 岁儿童

B.迅速发生休克与呼吸衰竭

C.起病时肠道症状明显

D.急起高热，反复惊厥

E.部分患者有脑膜刺激征

5、（A1 型选择题）下列疾病中可出现幻觉、妄想症状的是

A.癔症

B.脑外伤

C.疑病症

D.轻度抑郁

E.神经衰弱

6、（A1 型选择题）肾病综合征最基本、重要病理生理机制是

- A.肾小管重吸收蛋白不足
- B.肝脏合成白蛋白不足
- C.血浆蛋白分解代谢增强
- D.大量蛋白从尿中丢失
- E.蛋白质摄入不足

7、（A1 型选择题）抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是

- A.出现低钾血症
- B.常规应用
- C.二氧化碳结合力 $<5.9\text{mmol/L}$  或血  $\text{pH}<7.1$
- D.出现严重心律失常
- E.合并严重感染

8、（A1 型选择题）下列哪项不是风湿热的主要表现

- A.发热
- B.游走性多发性关节炎
- C.心脏炎

D.环形红斑和皮下结节

E.舞蹈病

9、（A1 型选择题）判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是

A.白细胞高低

B.呼吸频率

C.感染菌群

D.胸片显示程度

E.有无累及其他系统

10、（A1 型选择题）4~5 个月婴儿不宜添加的食物是

A.菜泥

B.水果泥

C.配方奶

D.肉末

E.米粉

11、（A1 型选择题）婴幼儿时期，外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶的原因是

- A.神经元少
- B.树突、轴突少
- C.神经髓鞘形成和发育不完善
- D.神经元体积小
- E.树突轴突短

12、（A1 型选择题）室间隔缺损和动脉导管未闭患儿压迫喉返神经是由于

- A.肺动脉扩张
- B.主动脉扩张
- C.右心房扩张
- D.左心房扩张
- E.左右心房扩张

13、（A1 型选择题）子宫内膜癌的高危因素不包括

- A.肥胖
- B.不孕症
- C.糖尿病
- D.高血压

E.卵巢早衰

14、（A1 型选择题）卵巢动静脉通过的韧带是

A.圆韧带

B.主韧带

C.宫骶韧带

D.阔韧带

E.骨盆漏斗韧带

15、（A1 型选择题）子宫内膜癌的治疗，错误的是

A.严重并发症不能耐受手术的放疗

B. I 期患者腹水中有癌细胞的手术加放疗

C. I 期患者深肌层浸润的手术加放疗

D. I 期有浅肌层浸润者，术后常规应辅助放疗

E. II 期应行广泛子宫切除术及双侧盆腔淋巴结清除及腹主动脉旁淋巴结

取样术

16、（A1 型选择题）卵巢纤维瘤伴胸腹水形成称为

A.Meniere

B.Down

C.Meigs

D.Cushing

E.类癌综合征

17、（A1 型选择题）可能发生新生儿 ABO 溶血病的是

A.母亲为 AB 型，婴儿为 A 型

B.母亲为 AB 型，婴儿为 B 型

C.母亲为 AB 型，婴儿为 AB 型

D.母亲为 A 型，婴儿为 O 型

E.母亲为 O 型，婴儿为 A 或 B 型

18、（A1 型选择题）口服补液盐（ORS）使用范围是

A.轻中度脱水

B.中重度脱水

C.重度等渗性脱水

D.低渗性脱水

E.高渗性脱水

19、（A1 型选择题）子宫内膜异位症常见侵犯的部位是

- A.卵巢
- B.鼻腔
- C.膀胱
- D.肾
- E.肺

20、（A1 型选择题）最易引起子宫内膜增生卵巢肿瘤是

- A.畸胎瘤
- B.纤维瘤
- C.颗粒细胞瘤
- D.无性细胞瘤
- E.卵巢转移肿瘤

21、（A1 型选择题）确诊女性生殖道淋病奈瑟菌感染取分泌物部位是

- A.子宫腔
- B.宫颈管
- C.阴道口



D.阴道前壁

E.阴道前穹隆

22、（A1 型选择题）血管壁异常所致出血的特点是

A.内脏出血

B.迟发出血

C.皮肤黏膜出血

D.关节腔出血

E.肌肉出血

23、（A1 型选择题）小儿重度蛋白质能量营养不良饮食调整治疗每日约

A.80~100kcal/kg

B.60~80kcal/kg

C.40~60kcal/kg

D.20~40kcal/kg

E.10~20kcal/kg

24、（A1 型选择题）临床上最简便的用于确诊疟疾的实验室检查方法为

A.血和骨髓涂片检查

- B.间接荧光抗体检测
- C.间接红细胞凝集试验
- D.酶联免疫吸附试验
- E.外周血检查大单核细胞

25、（A1 型选择题）哪种乙类传染病必须采取甲类传染病的预防、控制措施

- A.病毒性肝炎
- B.细菌性痢疾
- C.流行性出血热
- D.流行性脑脊髓膜炎
- E.人感染高致病性禽流感

26、（A1 型选择题）对血吸虫病的诊断最具特异性的方法是

- A.血象检查了解嗜酸性粒细胞比例
- B.粪便检查虫卵
- C.B 超检查肝脾情况
- D.血清学方法检测抗体

E.肠镜观察肠黏膜改变

27、（A1 型选择题）流行性脑脊髓膜炎败血症期患者皮肤瘀点的主要病理基础是

- A.血管脆性增强
- B.播散性血管内凝血（DIC）
- C.血小板减少
- D.小血管炎致局部坏死及栓塞
- E.凝血功能障碍

28、（A1 型选择题）低渗性缺水引起体液容量的变化为

- A.血浆、组织间液都减少，以血浆减少为主
- B.只有血浆减少
- C.血浆、组织间液都减少，以组织间液减少为主
- D.只有组织间液减少
- E.以血液浓缩为主

29、（A1 型选择题）ARDS 最早期的症状是

- A.呼吸加快窘迫感

- B.明显的呼吸困难
- C.患者发绀
- D.呼吸道分泌物增多
- E.肺部听诊有啰音

30、（A1 型选择题）治疗小腿丹毒应首选

- A.土霉素
- B.红霉素
- C.庆大霉素
- D.氨苄西林
- E.青霉素

31、（A1 型选择题）十二指肠球部后壁溃疡并发大出血，血管多来自

- A.胃右动脉
- B.胃网膜右动脉
- C.腹腔动脉
- D.脾动脉的分支
- E.胰十二指肠上动脉

32、（A1 型选择题）胃迷走神经切断术的基本要求是术后

- A.神经性胃酸分泌完全消失
- B.胃蛋白酶分泌完全消失
- C.胃相所致的胃酸分泌消失
- D.非壁细胞的分泌完全消失
- E.肠相所致的胃酸分泌消失

33、（A1 型选择题）应激性溃疡出血时错误的治疗是

- A.使用 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂
- B.使用胃黏膜保护剂
- C.经胃管灌注止血药物
- D.内镜下止血治疗
- E.行胃壁切开电灼止血

34、（A1 型选择题）蹲踞现象见于以下哪种疾病

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.法洛四联症

D.动脉导管未闭

E.主动脉缩窄

35、（A1 型选择题）急性胰腺炎的基本病理改变是

A.纤维性变

B.萎缩，退化

C.假性囊肿

D.脓肿

E.水肿，出血，坏死

36、（A1 型选择题）下列前上纵隔肿瘤，最常见的是

A.胸腺瘤

B.畸胎瘤

C.淋巴类肿瘤

D.皮样囊肿

E.心包囊肿

37、（A1 型选择题）条件致病菌指的是

A.在某些特定条件下由正常菌群转变成的致病菌

- B. 入侵的病原菌
- C. 带菌者排出的病原菌
- D. 患者排出的病原菌
- E. 正常菌群中的细菌

38、（A1 型选择题）干燥综合征的标记性抗体是

- A. 抗组蛋白抗体
- B. 抗 SSB 抗体
- C. 抗 Sm 抗体
- D. 抗 Scl-70 抗体
- E. 抗 Jo-1 抗体

39、（A1 型选择题）胃癌最好发的部位是

- A. 幽门管
- B. 胃窦小弯侧
- C. 胃体大弯侧
- D. 胃窦大弯侧
- E. 贲门小弯侧

40、（A1 型选择题）压颈试验旨在检查

- A.小脑病变
- B.大脑病变
- C.脑干疾病
- D.周围神经疾病
- E.脊髓疾病有无椎管阻塞

41、（A1 型选择题）抢救经呼吸道吸入的急性中毒，首要采取的措施是

- A.清除尚未吸收的毒物
- B.排出已吸收的毒物
- C.使用解毒剂
- D.立即脱离现场及急救
- E.对症治疗

42、（A1 型选择题）恶性肿瘤分级的主要依据是

- A.肿瘤浸润的范围
- B.肿瘤细胞分化程度高低
- C.肿瘤对机体的危害程度



D.有无转移

E.肿瘤生长方式

43、（A1 型选择题）帕金森病患者的典型震颤是

A.意向性震颤

B.静止性震颤

C.姿态性震颤

D.扑翼样震颤

E.动作性震颤

44、（A1 型选择题）肛瘘手术中，最重要的是

A.麻醉充分

B.肛管括约肌松弛

C.找出外口

D.手术后呈 V 形创面

E.明确瘘管与括约肌关系

45、（A1 型选择题）要通过消化道传播的肝炎

A.自身免疫性肝炎

B.乙型肝炎

C.丙型肝炎

D.丁型肝炎

E.甲型肝炎

46、（A1 型选择题）预防破伤风最有效、最可靠的方法是

A.彻底清创+人工免疫

B.应用青霉素

C.注射 TAT

D.注射破伤风类毒素

E.注射人体破伤风免疫球蛋白

47、（A1 型选择题）十二指肠球部前壁溃疡最常发生的并发症是

A.幽门梗阻

B.穿孔

C.胆囊炎

D.胰腺炎

E.出血

48、（A1 型选择题）大便时和便后肛门剧痛并带少量鲜血的病有

- A.肛管直肠周围脓肿
- B.肛裂
- C.直肠息肉
- D.混合痔
- E.血栓性外痔

49、（A1 型选择题）艾滋病患者呼吸系统最常见机会性感染病原菌是

- A.肺孢子菌
- B.白色念珠菌
- C.疱疹病毒
- D.巨细胞病毒
- E.结核菌

50、（A1 型选择题）所谓有效循环血量是指

- A.在微循环内的总血量
- B.全身总血量
- C.在静脉内的血量

D.在动脉内的血量

E.单位时间内通过心血管系统进行循环的血量

51、（A1 型选择题）循环骤停进行复苏时最有效的药物是

A.间羟胺

B.异丙肾上腺素

C.去甲肾上腺素

D.肾上腺素

E.多巴胺

52、（A1 型选择题）胃切除术后呕吐的原因不包括

A.胃液排空延迟

B.输入段梗阻

C.吻合口梗阻

D.倾倒综合征

E.输出段梗阻

53、（A1 型选择题）疟疾的凶险发作主要见于

A.间日疟

- B.三日疟
- C.卵圆疟
- D.恶性疟
- E.输血疟疾

54、（A1 型选择题）重症肌无力的主要病理生理机制是

- A.乙酰胆碱受体数量增多
- B.乙酰胆碱释放量减少
- C.乙酰胆碱受体数量减少
- D.乙酰胆碱释放量增多
- E.乙酰胆碱抗体数量减少

55、（A1 型选择题）破伤风最先出现的症状是

- A.苦笑面容
- B.张口困难
- C.颈项强直
- D.角弓反张
- E.手足抽搐

56、（A1 型选择题）毕 I 式与毕 II 式胃大部切除术的主要区别是

- A. 切断十二指肠
- B. 胃肠吻合口的部位
- C. 切除胃的多少
- D. 近端空肠与胃小弯的关系
- E. 结肠前或结肠后胃肠吻合

57、（A1 型选择题）对眼猪囊尾蚴病患者首选的治疗是

- A. 阿苯达唑
- B. 吡喹酮
- C. 氯喹
- D. 手术
- E. 伯氨喹

58、（A1 型选择题）构成血吸虫病传播必须具备的条件不包括

- A. 钉螺寄生
- B. 蚊虫寄生
- C. 接触疫水

D.粪便入水

E.易感人群

59、（A1 型选择题）乳房 Paget 病是指

A.男性乳房肥大症

B.炎性乳腺癌

C.浆细胞性乳腺癌

D.乳腺结梭病

E.乳头湿疹样乳腺癌

60、（A1 型选择题）关于上消化道出血的定义，正确的是

A.贲门以上部位出血

B.空肠以上部位出血

C.Treitz 韧带以上部位出血

D.幽门以上部位出血

E.十二指肠乳头水平以上部位出血

61、（A1 型选择题）前列腺穿刺活检是诊断哪一种疾病最可靠的检查

A.前列腺炎

- B.前列腺癌
- C.前列腺增生
- D.前列腺囊肿
- E.前列腺结核

62、（A1 型选择题）乙脑患者最主要的治疗目的是

- A.抗病毒
- B.提高免疫力
- C.抗菌治疗，预防感染
- D.治疗并发症
- E.对症、支持治疗，降低死亡率，减少后遗症

63、（A1 型选择题）鉴别腹股沟斜疝与直疝最有意义的体征是

- A.疝块的形状
- B.疝块是否降入阴囊
- C.单侧或双侧
- D.回纳疝块后，压住内环，增加腹内压是否脱出
- E.是否易嵌顿



64、（A1 型选择题）胃十二指肠急性穿孔施行非手术疗法最关键的治疗措施为

- A. 胃肠减压
- B. 禁食
- C. 补液, 输血
- D. 针灸, 中药
- E. 选用抗生素

65、（A1 型选择题）贯通伤是指

- A. 创伤后深部体腔与外界相通
- B. 开放性创伤
- C. 可等同于穿透伤
- D. 一般是指开放性颅脑外伤
- E. 投射物击中人体, 造成一个入口和一个出口

66、（A1 型选择题）引起感染性休克的最常见病原体是

- A. 革兰阴性细菌
- B. 革兰阳性细菌

- C.病毒
- D.真菌
- E.钩端螺旋体

67、（A1 型选择题）下列哪项是乳癌出现表面橘皮征的机制

- A.癌肿侵犯 Cooper 韧带使其收缩
- B.癌肿侵入乳管使其收缩
- C.乳房皮下淋巴管被癌细胞堵塞
- D.癌细胞浸润大片皮肤
- E.以上都不是

68、（A1 型选择题）浅Ⅱ度烧伤的局部损害深度达

- A.表浅层，生发层健在
- B.真皮浅层，部分生发层存在
- C.真皮深层，有皮肤附属器残留
- D.皮肤全层
- E.皮肤下脂肪

69、（A1 型选择题）引起日本血吸虫病病理改变的主要是

A.毛蚴

B.虫卵

C.尾蚴

D.童虫

E.成虫

70、（A1 型选择题）急性乳房炎脓肿未形成前的主要治疗方法是

A.促使乳汁通畅排出

B.应用广谱抗生素

C.局部注射抗生素

D.切开引流

E.局部热敷

71、（A2 型选择题）男性，57 岁，吸烟 40 年。近 2 周痰中带血，伴发热，X 线胸片示右上肺以肺门为中心的炎症改变，应首先考虑

A.右上肺炎

B.右上肺结核

C.支气管腺瘤

D.支气管异物

E.右上肺中心型肺癌

72、（A2 型选择题）女，20 岁，2 天前有进不洁水果史，现出现发热 38.5℃，腹痛、腹泻，里急后重，大便次数逾 10 次/天，已用过氯霉素、卡那霉素未见效果，仍有脓血便。下列抗菌药物较有针对性的是

A.四环素

B.庆大霉素

C.喹诺酮类药物

D.加大卡那霉素剂量

E.红霉素

73、（A1 型选择题）女性，60 岁，近来咽第一口饭时常有哽噎感，首先应考虑

A.食管癌

B.食管息肉

C.食管炎

D.贲门失弛缓症

E.食管憩室

74、（A2 型选择题）女，66 岁，高血压史 10 余年，今晨发现，左皱额不能，左眼不能闭合，口角向右歪斜，左露齿、鼓腮动作均差，余神经系统检查均无异常，其病变部位在

- A.右侧内囊区
- B.左侧内囊区
- C.右侧面神经
- D.左侧眼神经
- E.左面神经

75、（A2 型选择题）女性，20 岁，左前胸刀刺伤半小时，血压 70/50mmHg，心音不清，两肺呼吸清，最可能为

- A.心脏压塞
- B.开放性气胸
- C.张力性气胸
- D.低血糖休克
- E.失血性休克

76、（A2 型选择题）女，30 岁，十二指肠残端瘘 20 天，目前进食少，全身乏力，直立时晕倒。血  $K^+$ 3mmol/L， $Na^+$ 125mmol/L。其水盐代谢失调应为

A.低钾血症，中度低渗性缺水

B.高钾血症，重度低渗性缺水

C.低钾血症，等渗性缺水

D.低钾血症，高渗性缺水

E.低渗性缺水

77、（A2型选择题）女性，35岁，搬重物后出现腰剧痛并向右下肢放射，咳嗽加剧。最可能的诊断是

A.急性腰扭伤

B.腰椎横突骨折

C.腰椎横突骨折

D.腰椎间盘突出症

E.梨状肌综合征

78、（A2型选择题）女，50岁，因上腹饱胀伴呕吐2周，吐出物有腐臭味，少量胆汁，吐后舒适，拟诊为胃癌。根据病史，该患者手术前准备最重要的是

A.禁食3日，补液

B.选择应用抗菌药物

- C.禁食 3 日，洗胃
- D.禁食 3 日，纠正水电解质平衡
- E.输全血及血浆

79、（A2 型选择题）男性，3 岁，行走时不慎摔倒，其母用力提拉该女孩左手，随后患儿哭闹，诉左肘痛，不愿活动。查体：前臂略旋前，肘外侧有压痛，X 线片未发现异常，其诊断首先考虑

- A.左肘部软组织损伤
- B.左桡骨头半脱位
- C.左腕关节脱位
- D.左肩关节脱位
- E.左肘关节脱位

80、（A2 型选择题）女性，36 岁，2 年来反复出现腹泻，粪便糊状。结肠镜检查发现病变主要位于回肠末端，表现为多发的纵行溃疡，溃疡间黏膜正常，最有可能的诊断是

- A.结肠癌
- B.肠结核
- C.细菌性痢疾

D.克罗恩病

E.溃疡性结肠炎

81、（A2 型选择题）女，22 岁。外伤致左肩关节前脱位，经手法复位后外固定，其肩关节应固定于

A.外展、内旋位、屈肘 90°

B.内收、内旋位、屈肘 90°

C.外展、外旋位、屈肘 90°

D.外展、外旋、伸肘位

E.内收、内旋、伸肘位

82、（A2 型选择题）女，36 岁，左下腹被拖拉机压伤后 4 天入院，入院时有弥散性腹膜炎、感染性休克。经积极抗休克治疗后，行剖腹探查术，术中见腹腔内有黄色脓液及粪便，降结肠下段有一 0.5cm 大小的穿孔，有粪便溢出。下列术式最妥当的是

A.降结肠修补

B.穿孔处修补、横结肠造口

C.降结肠穿孔处切除端端吻合

D.降结肠外置



E.左半结肠切除

83、（A2 型选择题）女，50 岁，心慌、乏力、记忆力不好，曾有癫痫样发作 4 次，晨起床后晕倒，神志模糊，经静脉输注葡萄糖溶液后症状消失，应考虑为

A.心血管疾病

B.胃泌素瘤

C.胰岛素瘤

D.癫痫发作

E.脑血管疾病

84、（A2 型选择题）女，50 岁，上腹部疼痛反复发作 5 年，近七天出现腹胀、呕吐。经 X 线钡餐检查诊断十二指肠溃疡伴幽门梗阻。最适宜的手术方法是

A.毕 II 式胃大部切除术

B.胃空肠吻合术

C.迷走神经干切断术

D.选择性胃迷走神经切断术

E.毕 I 式胃大部切除术

85、（A2 型选择题）女性，69 岁，间断上腹痛 20 余年，2 个月来加重伴饱胀，体重下降 6kg，Hb90g/L。最可能的诊断是

- A.胃癌
- B.慢性肝炎
- C.慢性胆囊炎
- D.消化性溃疡
- E.功能性消化不良

86、（A2 型选择题）56 岁，男性，雪地滑跌倒时右手掌撑地，当即感右腕剧痛、活动受限，拇、示中指掌侧麻木，查体侧面观像“餐叉”，最可能的诊断是

- A.腕关节脱位
- B.腕舟骨骨折
- C.屈曲型桡骨下端骨折
- D.Colles 骨折
- E.Smiths 骨折

87、（A2 型选择题）女性，22 岁，夏季喜食生冷水。昨下午突发剧烈腹泻、呕吐，6 小时共吐 10 余次，水样便 10 余次。无发热、腹痛。为尽快诊断应

进行下列哪项检查

- A. 粪便常规检查
- B. 血常规检查
- C. 粪便培养
- D. 呕吐物培养
- E. 粪便悬滴法检查和粪便常规检查

88、（A2 型选择题）男，55 岁，左下肢突然肿胀，压痛，浅静脉曲张，体温 38°C，经多普勒超声检查发现髂股静脉阻塞，拟采用 Fogarty 导管取栓术，此手术的时限为

- A. 发病后 48 小时以内
- B. 发病后 24 小时以内
- C. 发病后 12 小时以内
- D. 发病后 2 小时以内
- E. 发病后 3~5 天以内

89、（A2 型选择题）女，51 岁，急性胰腺炎留置中心静脉导管给予全胃肠外营养，突发寒战、高热，诊断考虑为

- A. 毒血症

- B.菌血症
- C.败血症
- D.胆道感染
- E.冷脓肿

90、（A2 型选择题）女，28 岁。半小时前从 5m 高处摔下，急诊摄片显示左第 10、11 肋骨骨折，留院观察，第 3 天出现剧烈腹痛伴休克。首先应考虑为

- A.肠穿孔
- B.延迟性脾破裂
- C.血胸加重
- D.肾破裂出血
- E.食管贲门黏膜撕裂

91、（A2 型选择题）女性，20 岁，左上臂摔伤造成上臂中下段畸形，腕关节不能主动背伸，拇指不能背伸，掌指关节不能伸直，手背桡侧感觉减退，初步诊断为

- A.肱骨干骨折合并肌皮神经损伤
- B.肱骨干骨折合并桡神经损伤
- C.肱骨干骨折合并尺神经损伤

D.肱骨干骨折合并正中神经损伤

E.肱骨干骨折合并桡神经及正中神经损伤

92、（A2 型选择题）女性，18 岁，突然四肢弛缓性瘫痪，双侧面瘫一周来院，无尿便失禁，无发热，腰穿：蛋白-细胞分离。病前有感染史，首先应想到的诊断是

A.脊髓灰质炎

B.吉兰-巴雷综合征

C.重症肌无力

D.周期性瘫痪

E.急性脊髓炎

93、（A2 型选择题）女性，70 岁，食后呕吐，全身情况差。有关检查提示瘢痕性幽门梗阻。该病例宜采取的处理措施是

A.迷走神经切断术

B.胃空肠吻合术

C.胃次全切除术

D.加强营养，改善全身情况

E.迷走神经切断加幽门成形术

94、（A2 型选择题）女，45 岁，因急性肠梗阻 3 天入院，患者诉口渴，全身乏力，不能坐起。查：脉搏 120 次/分，血压 75/60mmHg，眼窝凹陷，皮肤弹性差，尿比重 1.025，血清  $\text{Na}^+$ 136mmol/L。最可能的诊断是

- A.高渗性缺水
- B.低渗性缺水
- C.等渗性缺水
- D.缺钠性休克
- E.继发性缺水

95、（A2 型选择题）男，50 岁，近一个月来粪便中有黏液或脓血，每天大便 4~5 次，肛门坠胀感，此时最先要做的检查是

- A.直肠指诊
- B.B 超检查
- C.纤维结肠镜检查
- D.X 线钡灌肠造影
- E.大便常规及培养

96、（A2 型选择题）27 岁，女性，左乳房外上象限内直径 3cm 圆形光滑肿块已 8 个月，质韧，活动佳，可能为

A.早期乳腺癌

B.乳房囊性增生病

C.乳头湿疹样乳腺癌

D.纤维腺瘤

E.结核

97、（A2 型选择题）女，30 岁，因车祸腹部被汽车方向盘撞伤后腹痛 3 小时入院，伴有呕吐。查体：痛苦表情，血压 115/75mmHg,脉搏 98 次/分，腹平，腹肌紧张，全腹压痛及反跳痛明显。最可能的诊断是

A.肝破裂

B.肠系膜大血管损伤

C.胰腺损伤

D.腹膜后巨大血肿

E.腹内空腔脏器损伤

98、（A2 型选择题）6 岁，女孩，高热 1 天，腹泻 6~7 次，为黏液性脓血便，腹痛伴里急后重，反复惊厥，逐渐出现昏睡、神志不清，病前吃过未洗的黄瓜。初步诊断为

A.中毒型痢疾

B.腹泻脱水酸中毒

C.流行性乙型脑炎

D.痢疾

E.大肠杆菌肠炎

99、（A2 型选择题）测得孕妇坐骨结节间径 7cm，出口后矢状径 7cm，现妊娠 39 周，宫口开大 2cm,正确的分娩方式是

A.自然分娩

B.会阴侧切自然分娩

C.产钳术

D.剖宫产术

E.胎头吸引术

100、（A2 型选择题）女性，46 岁，突起寒战、高热，右上腹痛，体温 39~40℃，为弛张热，肝大，右上腹触痛伴肌紧张，白细胞数增高，核左移，胸腹部透视见右膈升高，运动受限，超声示液平，放射性核素扫描见肝占位病变，应首先考虑

A.肝癌

B.急性肝炎



C.细菌性肝脓肿

D.阿米巴性肝脓肿

E.胆道感染

101、（A1 型选择题）女性，40 岁，上腹胀痛 2 年，有暖气，无反酸，血清胃泌素 14pg/ml,胃镜见胃窦部萎缩性胃炎，病理结果为慢性黏膜炎症，伴重度不典型增生。最理想的治疗方法为

A.胰酶制剂

B.H2 受体阻滞剂

C.抗多巴胺受体阻滞剂

D.手术治疗

E.肾上腺皮质激素

102、（A2 型选择题）某年夏天，某工地 20 余名工人晚餐吃炒米饭后约 1~3 小时，其中有 10 多名工人出现恶心、剧烈呕吐、上腹痛、腹泻等，不发热，首先应考虑的诊断是

A.急性细菌性痢疾

B.细菌性食物中毒

C.伤寒

D.亚硝酸盐食物中毒

E.病毒感染性腹泻

103、（A2 型选择题）女，60 岁。上腹胀、隐痛 2 个月，伴食欲减退，乏力，消瘦，大便发黑。查体：消瘦，浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯黏膜紊乱，可见直径 3.5cm 不规则充盈缺损，胃壁僵直。其最常见的转移途径是

A.胃肠道内转移

B.直接浸润

C.淋巴转移

D.血行转移

E.腹腔内种植

104、（A2 型选择题）女性，15 岁，突发心窝部阵发性钻顶样疼痛 6 小时，疼痛时大汗淋漓，辗转不安，痛止时又平息如常，体检：剑突偏右方有深在压痛，无腹肌紧张及反跳痛，为明确诊断应采取简单安全的方法是

A.ERCP

B.右上腹 X 线平片

C.测定血清淀粉酶

D.十二指肠引流液检查

E.B 超

105、（A2 型选择题）女孩，6 岁，高热 1 天，第 2 天出疹，全身皮肤弥漫性充血发红，可见密集均匀的红色细小丘疹，面部潮红，唇周苍白，咽扁桃体充血水肿，舌乳头红肿突起。最可能的诊断是

A.风疹

B.麻疹

C.猩红热

D.幼儿急疹

E.水痘

106、（A2 型选择题）女，22 岁，既往体健。在使用煤气热水器洗澡过程中出现意识障碍，发现后立即抢救，复苏后患者出现缺氧性脑病，其中毒原因最大可能是

A.心源性卒中

B.脑梗死

C.溶解于水的食物中毒

D.由于煤气泄漏造成的 CO 中毒

### E.心源性猝死

107、（A2 型选择题）女，9 岁，2 小时前摔倒，左肘部着地，查体：左肘肿胀，半屈曲位畸形，压痛明显，前臂触诊张力高，手部皮肤发凉、感觉减退，桡动脉搏动微弱，测前臂组织压为 60mmHg，X 线检查结果为肱骨髁上骨折，明显移位。最佳的处理为

- A.手法复位
- B.患肢石膏固定
- C.尽快手术
- D.抬高患肢密切观察
- E.尺骨鹰嘴持续牵引

108、（A2 型选择题）男，60 岁，近半年来反复出现头痛，头晕，今晨在突然转头时感眩晕耳鸣，恶心呕吐，摔倒在地，2 分钟后缓解。既往曾类似发作 2 次，X 线片示颈 5~6 椎体后缘骨质增生，椎间孔明显缩小，最可能的诊断是

- A.神经根型颈椎病
- B.脊髓型颈椎病
- C.交感神经型颈椎病
- D.癫痫发作

### E.椎动脉型颈椎病

109、（A2 型选择题）男，30 岁，煤气中毒 1 天后转送医院，神志不清，瞳孔等大，光反应弱，体温、血压正常，心脏听诊无异常，两肺呼吸音粗，腹部（-），腱反射存在，病理反射（+）、血常规无异常。抢救措施中，最重要的应为

A.甘露醇输注

B.地塞米松输注

C.高能量补液

D.高压氧治疗

E.保护脑细胞

110、（A2 型选择题）60 岁，女性，原无恙，近消瘦，嗜睡，神态淡漠。胃镜，肠镜检查无阳性，肝/肾功能正常，心电图示房颤，该患者诊断最大可能是

A.冠心病房颤

B.抑郁症

C.淡漠型甲亢

D.甲状腺功能减退症

E.老年性痴呆症

111、（B1 型选择题）慢性肠痿，四肢无力

A.低渗性缺水

B.高渗性缺水

C.等渗性缺水

D.高钾血症

E.低钾血症

112、（B1 型选择题）高热大汗，患者诉口渴，烦躁

A.低渗性缺水

B.高渗性缺水

C.等渗性缺水

D.高钾血症

E.低钾血症

113、（B1 型选择题）急性大量丧失消化液后，脉搏细数，肢端湿冷，血压下降

A.低渗性缺水

- B.高渗性缺水
- C.等渗性缺水
- D.高钾血症
- E.低钾血症

114、（B1 型选择题）胆石症合并胆道感染时腹痛为

- A.常发生在进油腻食后
- B.过食、饮酒后发生
- C.腹痛在剧烈活动后发生
- D.转移性疼痛
- E.持续性腹痛阵发加重

115、（B1 型选择题）急性胆囊炎发病与饮食的关系是

- A.常发生在进油腻食后
- B.过食、饮酒后发生
- C.腹痛在剧烈活动后发生
- D.转移性疼痛
- E.持续性腹痛阵发加重

116、（B1 型选择题）急性胰腺炎发病与饮食的关系是

- A.常发生在进油腻食后
- B.过食、饮酒后发生
- C.腹痛在剧烈活动后发生
- D.转移性疼痛
- E.持续性腹痛阵发加重

117、（B1 型选择题）胫骨上 1/3 骨折易引起

- A.血管损伤
- B.骨折不愈合
- C.骨的缺血性坏死
- D.骨筋膜室综合征
- E.神经损伤

118、（B1 型选择题）腓骨头、胫骨折易引起

- A.血管损伤
- B.骨折不愈合
- C.骨的缺血性坏死



D. 骨筋膜室综合征

E. 神经损伤

119、（B1 型选择题）Pratt 试验可检查

A. 深静脉功能

B. 浅静脉功能

C. 下肢功能

D. 交通支静脉瓣膜功能

E. 大隐静脉瓣、小隐静脉瓣、交通支静脉瓣功能

120、（B1 型选择题）Perthes 试验可检查

A. 深静脉功能

B. 浅静脉功能

C. 下肢功能

D. 交通支静脉瓣膜功能

E. 大隐静脉瓣、小隐静脉瓣、交通支静脉瓣功能

121、（B1 型选择题）Trendelenburg 试验可检查

A. 深静脉功能

B.浅静脉功能

C.下肢功能

D.交通支静脉瓣膜功能

E.大隐静脉瓣、小隐静脉瓣、交通支静脉瓣功能

122、（B1 型选择题）伤寒病可有

A.玫瑰疹

B.少尿

C.淋巴结肿大

D.关节痛

E.皮肤瘀点、瘀斑

123、（B1 型选择题）流行性脑脊髓膜炎可有

A.玫瑰疹

B.少尿

C.淋巴结肿大

D.关节痛

E.皮肤瘀点、瘀斑

124、（B1 型选择题）大多数可经非手术治疗好转的是

- A. 瘢痕性幽门梗阻
- B. 胃十二指肠溃疡急性穿孔
- C. 胃十二指肠溃疡大出血
- D. 十二指肠溃疡并球部变形
- E. 穿透性十二指肠溃疡

125、（B1 型选择题）胃十二指肠溃疡手术的绝对适应证是

- A. 瘢痕性幽门梗阻
- B. 胃十二指肠溃疡急性穿孔
- C. 胃十二指肠溃疡大出血
- D. 十二指肠溃疡并球部变形
- E. 穿透性十二指肠溃疡

126、（B1 型选择题）检查肩关节脱位的特殊试验是

- A. Allen 试验
- B. Mills 征
- C. Tinel 征

D.Dugas 征

E.Finkelstein 试验

127、（B1 型选择题）检查桡骨茎突狭窄性腱鞘炎的特殊试验是

A.Allen 试验

B.Mills 征

C.Tinel 征

D.Dugas 征

E.Finkelstein 试验

128、（B1 型选择题）Murphy 征见于

A.急性胆囊炎

B.胆囊结石

C.胆总管结石

D.急性出血坏死性胰腺炎

E.急性梗阻化脓性胆管炎

129、（B1 型选择题）Charcot 三联征见于

A.急性胆囊炎

- B.胆囊结石
- C.胆总管结石
- D.急性出血坏死性胰腺炎
- E.急性梗阻化脓性胆管炎

130、（B1 型选择题）Reynolds 五联征见于

- A.急性胆囊炎
- B.胆囊结石
- C.胆总管结石
- D.急性出血坏死性胰腺炎
- E.急性梗阻化脓性胆管炎

131、（A3/A4 型选择题）女性，20 岁，工作时从 10m 高处坠落，40 分钟后送到医院。查：神清、腹痛、右大腿畸形，疼痛。医生应首先进行的检查是

- A.右股骨有无异常活动、骨擦音或骨擦感
- B.右足感觉、运动是否正常
- C.诊断性腹腔穿刺
- D.生命体征的检查

E. 摄右股骨正侧位 X 线片

132、（A3/A4 型选择题）女性，20 岁，工作时从 10m 高处坠落，40 分钟后送到医院。查：神清、腹痛、右大腿畸形，疼痛。下列处理最妥的是

- A. 立即行股骨内固定手术
- B. 密切观察患者腹部情况及全身情况变化
- C. 立即行剖腹探查术
- D. 髌人字石膏固定
- E. 密切观察病情的同时对右下肢进行简单的外固定

133、（A3/A4 型选择题）男，50 岁，近期体检发现空腹血糖 9.0mmol/L，过去无糖尿病病史，就诊于某医院后行 OGTT 检查空腹血糖 9.2mmol/L，餐后两小时血糖 14.0mmol/L。给患者的治疗建议是

- A. 胰岛素
- B. 双胍类降血糖药
- C. 磺脲类降血糖药
- D.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- E. 饮食及运动治疗

134、（A3/A4 型选择题）男，50 岁，近期体检发现空腹血糖 9.0mmol/L，

过去无糖尿病病史，就诊于某医院后行 OGTT 检查空腹血糖 9.2mmol/L，餐后两小时血糖 14.0mmol/L。按以上建议治疗 3 个月后空腹血糖 163mg/dl

(8.6mmol/L)，餐后血糖 225mg/dl (12.5mmol/L)，进一步治疗建议

A. 氯磺丙脲

B. 二甲双胍

C. 格列齐特

D. 阿卡波糖

E. 正规胰岛素

135、(A3/A4 型选择题) 男，50 岁，近期体检发现空腹血糖 9.0mmol/L，过去无糖尿病病史，就诊于某医院后行 OGTT 检查空腹血糖 9.2mmol/L，餐后两小时血糖 14.0mmol/L。3 年后该患者被发现有浸润型肺结核，降血糖治疗应

A. 原降血糖药每加剂量

B. 胰岛素治疗

C. 增加一种口服降血糖药

D. 双胍类、磺脲类、 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂联合使用

E. 改用降血糖作用更强的口服降血糖药

136、(A3/A4 型选择题) 女，30 岁，城市居民，夏季去血吸虫病疫区河中

游泳后出现发热、皮疹、腹痛、腹泻及肝脾肿大。最可能的诊断是

- A.慢性血吸虫病
- B.急性血吸虫病
- C.伤寒
- D.钩端螺旋体病
- E.过敏性反应

137、（A3/A4 型选择题）女，30 岁，城市居民，夏季去血吸虫病疫区河中游泳后出现发热、皮疹、腹痛、腹泻及肝脾肿大。确诊的首选方法是

- A.免疫学试验（环卵沉淀试验）
- B.骨髓穿刺
- C.肥达反应
- D.血培养
- E.周围血象、嗜酸性粒细胞绝对计数

138、（A3/A4 型选择题）女，30 岁，城市居民，夏季去血吸虫病疫区河中游泳后出现发热、皮疹、腹痛、腹泻及肝脾肿大。首选的药物治疗措施是

- A.阿苯达唑



B.吡喹酮

C.硝硫氰胺

D.酒石酸锑钾

E.呋喃妥因

139、（A3/A4 型选择题）10 岁，女孩，右肘部摔伤 3 小时。查体：右肘关节半屈位，活动受限，明显肿胀及压痛，肘后三角关系正常，桡动脉搏动消失。最可能的诊断是

A.肘关节前脱位

B.肘关节后脱位

C.桡骨小头半脱位

D.尺骨鹰嘴骨折

E.肱骨髁上骨折

140、（A3/A4 型选择题）10 岁，女孩，右肘部摔伤 3 小时。查体：右肘关节半屈位，活动受限，明显肿胀及压痛，肘后三角关系正常，桡动脉搏动消失。治疗应采取

A.持续牵引

B.立即手法复位

C.立即手术复位，同时探查血管

D.立即手术探查血管

E.立即切开减压

141、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，车祸 45 分钟，胸憋，极度呼吸困难，颈胸部皮下气肿，右侧胸部叩鼓，呼吸音消失。最可能的诊断是

A.心脏压塞

B.张力性气胸

C.闭合性气胸

D.进行性血胸

E.连枷胸

142、（A3/A4 型选择题）女性，30 岁，车祸 45 分钟，胸憋，极度呼吸困难，颈胸部皮下气肿，右侧胸部叩鼓，呼吸音消失。紧急处理应

A.面罩吸氧

B.气管插管

C.右胸腔排气

D.开胸探查

E.胶布固定

143、（A3/A4 型选择题）女性，20 岁，腹部闭合性损伤 2 小时，血压 120/80mmHg，脉搏 96 次/分，全腹压痛，反跳痛,肌紧张，移动性浊音不明显，肠音消失，尿无异常。应诊断为

A.腹腔内脏空腔器损伤

B.腹腔内实质脏器损伤

C.泌尿系损伤

D.胰腺损伤

E.肝破裂

144、（A3/A4 型选择题）女性，20 岁，腹部闭合性损伤 2 小时，血压 120/80mmHg，脉搏 96 次/分，全腹压痛，反跳痛,肌紧张，移动性浊音不明显，肠音消失，尿无异常。应如何处置

A.观察 12 小时后手术

B.立即手术

C.非手术治疗

D.抗炎，补液，如血压脉搏异常则手术

E.补液 2000ml 后手术

145、（A3/A4 型选择题）女性，32 岁，间歇性吞咽困难 5 年，消瘦。应首先考虑

- A.食管癌
- B.食管平滑肌瘤
- C.食管良性狭窄
- D.食管憩室
- E.贲门失弛缓症

146、（A3/A4 型选择题）女性，32 岁，间歇性吞咽困难 5 年，消瘦。检查首选

- A.食管带网气囊脱落细胞检查
- B.食管镜检查
- C.食管超声检查
- D.食管染色检查
- E.食管吞钡造影

147、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁。双侧耻骨支骨折，伤后 6 小时无尿，血压、脉搏正常。应考虑的原因是

- A.血容量不足

- B.尿道断裂
- C.急性肾衰
- D.输尿管损伤
- E.直肠损伤

148、（A3/A4 型选择题）男性，30 岁。双侧耻骨支骨折，伤后 6 小时无尿，血压、脉搏正常。首选的处理是

- A.导尿
- B.补充血容量
- C.利尿药
- D.膀胱镜检查
- E.逆行输尿管造影

149、（A3/A4 型选择题）女，41 岁，间断头痛 1 年，有时呕吐，伴双眼视力下降，查体发现双眼视乳头边缘模糊，隆起且有散在点状出血，余（-）。对此患者的初步印象是

- A.视神经炎
- B.垂体瘤
- C.重症高血压

D.颅内压增高

E.神经性头痛

150、（A3/A4 型选择题）女，41 岁，间断头痛 1 年，有时呕吐，伴双眼视力下降，查体发现双眼视乳头边缘模糊，隆起且有散在点状出血，余（-）。为查找病因，首选的辅助检查是

A.MRI

B.头颅 CT 扫描

C.头颅 X 线摄片

D.腰穿

E.脑血管造影

1、正确答案：D

答案解析：解析：营养性缺铁性贫血的实验室检查：血清铁降低， $< 10.7\mu\text{mol/L}$ ；血清铁蛋白是诊断缺铁最灵敏的指标，放射免疫法测定 $< 16\mu\text{g}$ ；骨髓细胞总数增加，幼红细胞增生活跃，以中幼、晚幼红细胞增生明显，各期

红细胞均较正常小，胞浆少，染色偏蓝，白细胞系和巨核细胞一般正常；红细胞内游离原卟啉值增高， $>0.9\mu\text{mol/L}$ 。

2、正确答案：E

答案解析：解析：胎心变异减速特点是胎心率减速与宫缩无固定关系。一旦出现变异减速，下降迅速且下降幅度大，持续时间长短不一，恢复也迅速。变异减速一般认为系子宫收缩时脐带受压兴奋迷走神经所致。

3、正确答案：E

答案解析：解析：本题考核哮喘持续状态的治疗。一旦确诊患者为重症哮喘，就应在应用支气管扩张剂的同时，及时足量从静脉快速给予糖皮质激素，常用琥珀酸氢化可的松每天 200~400mg 稀释后静脉注射，或甲泼尼龙每天 100~300mg，也可用地塞米松 5~10mg 静脉注射，每 6 小时可重复一次，待病情控制和缓解后再逐渐减量。

4、正确答案：C

答案解析：解析：考点：细菌性痢疾的临床表现。中毒型的特点为：①儿童多见，以严重毒血症状，休克和(或)中毒性脑病为主要表现。②胃肠道症状轻微甚至无腹痛、腹泻。③应及时取便送检。④粪便镜检确诊培养痢疾杆菌。

5、正确答案：A

答案解析：

6、正确答案：D

答案解析：解析：肾病综合征主要原因是肾小球毛细血管壁通透性增强，大量的白蛋白从尿中丢失。

7、正确答案：C

答案解析：解析：糖尿病酮症酸中毒的治疗主要通过补液、小剂量持续静脉点滴胰岛素，一般血酮体水平下降后，酸中毒也随之纠正，因此对于DKA的酸中毒关键是治疗原发病，一般不积极的补碱，严重酸中毒者如二氧化碳结合力 $<5.9\text{mmol/L}$ 或血 $\text{pH}<7.1$ ，可少量补充碳酸氢钠。故本题选C。

8、正确答案：A

答案解析：解析：风湿热的主要表现包括心脏炎、多发性关节炎、舞蹈病、环形红斑和皮下结节，而发热是风湿热的次要表现。

9、正确答案：E

答案解析：解析：有无累及其他系统是判断是否重症肺炎的标准。

10、正确答案：D

答案解析：

11、正确答案：C

答案解析：解析：神经髓鞘形成和发育不完善使外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶。



12、正确答案：A

答案解析：解析：室间隔缺损患儿有时出现声音嘶哑原因是扩张的肺动脉压迫喉返神经。

13、正确答案：E

答案解析：子宫内膜癌是最常见的女性生殖系统肿瘤之一。其发病原因目前尚未完全清楚，多数患者伴有肥胖、高血压、糖尿病、绝经延迟、不孕症等高危因素。

14、正确答案：E

答案解析：解析：阔韧带外 1/3 移行为骨盆漏斗韧带或称为卵巢悬韧带，卵巢动静脉由此穿行。

15、正确答案：D

答案解析：【解析】：I 期有浅肌层浸润者应行子宫切除术加双侧附件区切除术，根据侵犯肌层深度行盆腔及腹主动脉旁淋巴结清扫术。

16、正确答案：C

答案解析：解析：卵巢纤维瘤患者出现胸腔积液或腹腔积液，称为梅格斯 (Meigs) 综合征。答案为 C。Meniere 综合征是指内耳迷路病变导致的眩晕、耳鸣、耳聋等症状。Down 综合征又称先天愚型、21-三体综合征，是小儿最常见的由常染色体畸变所致的先天性疾病。Cushing 综合征为各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素所致疾病的总称。类癌综合征是胃肠道类癌引起的以发作

性皮肤潮红和腹泻为主要临床表现的综合征。

17、正确答案：E

答案解析：新生儿 ABO 溶血病常发生于母亲血型为“O”型、婴儿血型为“A”或“B”型这一特定人群中。

18、正确答案：A

答案解析：解析:口服补液盐(ORS)一般适用于轻度或中度脱水无严重呕吐者。

19、正确答案：A

答案解析：解析：子宫内膜异位症容易出现侵犯，并且具有浸润性生长，破坏周围组织和远处转移等类似恶性肿瘤的特点，最常见侵犯的部位为卵巢，其次为盆腔腹膜，韧带，子宫，可引起盆腔和腹腔部疼痛，造成不孕不育。

20、正确答案：C

答案解析：解析：颗粒细胞瘤为低度恶性肿瘤，可以分泌雌激素，生育年龄可以出现月经紊乱，绝经后则有不规则阴道出血；常合并子宫内膜增生症，甚至发生腺癌。

21、正确答案：B

答案解析：解析:淋病诊断分泌物取宫颈管或尿道口脓性分泌物。

22、正确答案：C

答案解析：因血管壁功能异常引起的出血特点为皮肤黏膜的瘀点、瘀斑

23、正确答案：C

答案解析：解析:轻度营养不良每日从 60-80Kcal/kg;中重度从 40-60Kcal/kg 开始。

24、正确答案：A

答案解析：解析：疟疾确诊有赖于血涂片，吉姆萨染色后直接镜检，可发现疟原虫，简便而且准确。血涂片中未找到疟原虫者可行骨髓涂片检查，可增加敏感度。间接荧光抗体测定等其他选项多无特异性。

25、正确答案：E

答案解析：解析：非典、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感这三种传染病虽然只被纳入乙类，但由于其传染性强、危害大，如果先要报批、公布才能实施，难免贻误时机，导致严重后果。因此法律特别授权，这三种乙类传染病可以直接采取甲类传染病的预防、控制措施。

26、正确答案：B

答案解析：

27、正确答案：D

答案解析：解析：流行性脑脊髓膜炎简称流脑，是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。临床表现为发热，头痛，呕吐，皮肤、黏膜瘀点、瘀斑及颈项

强直等脑膜刺激征。流行性脑脊髓膜炎败血症期时，细菌侵及血管内皮细胞，并释放内毒素，作用于小血管和毛细血管，引起局部出血、坏死、细胞浸润和栓塞，临床出现皮肤瘀点。

28、正确答案：C

答案解析：解析：低渗性缺水时，水和钠同时缺失，但缺水少于缺钠，尿量增多，细胞外液量减少。组织间液进入血循环，使组织间液的减少超过血浆的减少。而当等渗性缺水时，水和钠成比例地丧失，细胞外液减少，细胞内液量变化不大，血液浓缩表现明显。所以低渗性缺水时的变化为 C，等渗性缺水时的变化为 E。

29、正确答案：A

答案解析：【解析】：急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是大多数于原发病起病后 5 天内发生。除原发病的相应症状和体征外，最早出现的症状是呼吸增快，并呈进行性加重的呼吸困难、发绀，常伴有烦躁、焦虑、出汗等。早期体征可无异常，或仅在双肺闻及少量细湿啰音；后期多可闻及水泡音，可有管状呼吸音。

30、正确答案：E

答案解析：；解析:下肢急性丹毒致病菌常是溶血性链球菌,对青霉素敏感。

31、正确答案：E

答案解析：

32、正确答案：A

答案解析：

33、正确答案：E

答案解析：

34、正确答案：C

答案解析：解析：蹲踞现象是一种特殊的强迫体位，多见于先心法洛四联症的患儿。表现为患儿行走或游戏时候，出现双腿屈曲、蹲下片刻的特殊体位，后又恢复正常行走，蹲踞反复出现。

35、正确答案：E

答案解析：

36、正确答案：A

答案解析：解析：前上纵隔常见的肿瘤从提供的备选项看是胸骨后甲状腺肿。此外，胸腺瘤也位于前上纵隔。

37、正确答案：A

答案解析：解析：通常条件下对人不致病，在某种特定条件下可致病的细菌，称为条件致病菌。条件致病菌是人体的正常菌群，当其寄生部位改变、机体抵抗力降低或菌群失调时则可致病。

38、正确答案：B

答案解析：解析：抗 ds - DNA 是系统性红斑狼疮的标志抗体；抗 RNP 阳性是混合性结缔组织组织病的诊断标准之一；抗 CCP 是类风湿关节炎的常规检测指标；抗 SSA 和 SSB 是干燥综合症的标志抗体；抗 Jo -1 抗体是多发性肌炎/皮肌炎的标志抗体。

39、正确答案：B

答案解析：记忆

40、正确答案：E

答案解析：压颈试验，即腰穿时压迫颈部观察脑脊液的压力变化，了解椎管内有无阻塞。用手指压迫颈静脉 10~15 秒后放松，观察压力变化或将血压计轻缚于患者颈部，测定初压，迅速充气至 20mmHg、40mmHg、60mmHg，记录压力变化直至压力不再上升，迅速放气，记录压力值至不再下降为止。

41、正确答案：D

答案解析：解析：出现急性中毒，应立即停止毒物接触，毒物由呼吸道或皮肤侵入时，要立即将患者撤离中毒现场，转到空气新鲜的地方。

42、正确答案：B

答案解析：解析：恶性肿瘤是根据其分化程度的高低、异型性的大小及核分裂像的多少来确定恶性程度的级别。

43、正确答案：B

答案解析：解析：帕金森病的四项主征为静止性震颤、肌强直、运动迟缓、姿势步态异常。

44、正确答案：E

答案解析：解析：肛瘘手术时，手术的关键是尽量减少肛管括约肌损伤，防止肛门失禁，同时避免瘘的复发。肛管直肠环是由肛管内括约肌、直肠壁纵肌下部、肛管外括约肌的浅部、深部及肛提肌的耻骨直肠肌纤维共同组成的肌环，是括约肛管的重要结构，手术中不慎完全切断将引起大便失禁。直肠肛管肌受自主神经支配，无括约肛门功能，切断后不引起大便失禁。

45、正确答案：E

答案解析：解析：通过消化道传染的肝病主要是甲肝

46、正确答案：D

答案解析：

47、正确答案：B

答案解析：十二指肠球部前壁溃疡最常发生的并发症是穿孔；

48、正确答案：B

答案解析：解析：痔以出血为主，肛裂以疼痛为主，而且会出现便时便后两次疼痛。

49、正确答案：A

答案解析：艾滋病患者的机会性感染最常出现在呼吸系统、消化系统、皮肤和神经系统，有时也可出现机会性肿瘤。在呼吸系统中，以结核病和卡氏肺孢子虫肺炎最为常见，这两种机会性感染占整个肺部感染的绝大部分。

50、正确答案：E

答案解析：【解析】有效循环血容量是单位时间内通过心血管系统进行循环的血容量，并不包括贮存于肝、脾和淋巴血窦中，或停滞于毛细血管中的血容量。有效循环血量依赖于血容量、心搏出量及周围血管张力三个因素。

51、正确答案：D

答案解析：循环骤停进行复苏时最有效的药物是肾上腺素。

52、正确答案：A

答案解析：解析：排除法，输出空肠袢梗阻：主要表现为呕吐，呕吐物为食物和胆汁。确诊应借助于钡餐检查，以示梗阻的部位。症状严重而持续应手术治疗以解除梗阻。吻合口梗阻：发生率约为1~5%，主要表现为进食后上腹胀痛、呕吐、呕吐物为食物，多无胆汁。输入空肠袢梗阻 输入空肠段内液体潴留到一定量时，强烈的肠蠕动克服了一时性的梗阻，将其潴留物大量排入残胃内，引起恶心、呕吐。临床表现为食后约15~30分钟左右，上腹饱胀，轻者恶心，重者呕吐，呕吐物主要是胆汁，一般不含食物，呕吐后患者感觉症状减轻而舒适。早期倾倒综合症：表现为进食后上腹胀闷、心悸、出汗、



头晕、呕吐及肠鸣腹泻等。患者面色苍白，脉搏加速、血压稍高。上述症状经平卧 30~45 分钟即可自行好转消失，如患者平卧位进食则往往不发生倾倒症状；晚期倾倒综合症：性质与早期综合症不同，一般都发生在手术后半年左右，而多在食后 2~3 小时发作，表现为无力、出汗、饥饿感、嗜睡、眩晕等。发生的原因由于食物过快地进入空肠内，葡萄糖迅速被吸收，血糖过度增高，刺激胰腺产生过多胰岛素，而继发生低血糖现象，故又称低血糖综合症。

53、正确答案：D

答案解析：疟疾的凶险发作主要是指脑型疟疾及过高热型,其中脑型疟疾最为严重,主要发生于恶性疟疾,偶见间日疟和三日疟。

54、正确答案：C

答案解析：解析：重症肌无力系因体内对横纹肌上的乙酰胆碱受体产生自身免疫反应所致，是一种神经—肌肉接头部位因乙酰胆碱受体减少而出现传递障碍的自身免疫性疾病。

55、正确答案：B

答案解析：解析：破伤风典型症状是在肌紧张性收缩的基础上，阵发性强烈痉挛，通常最先受影响的肌群是咀嚼肌，随后顺序为面部表情肌、颈、背、腹、四肢肌，最后为膈肌。因此，最早出现的征象为张口困难（牙关紧闭）、皱眉、口角下缩、咧嘴、苦笑。

56、正确答案：B

答案解析：【解析】毕 I 式胃大部切除后，远端胃与十二指肠吻合，更符合生理，但是十二指肠比较固定，如果胃切除过多可能导致吻合口张力大，易发生吻合口漏。毕 II 式胃大部切除后，胃与空肠吻合，空肠游离，不影响吻合口张力，但是十二指肠液可能通过吻合口返流入胃，造成返流性胃炎。一般做毕 II 式吻合同时做 Roux-en-y 吻合。

57、正确答案：D

答案解析：解析：对眼猪囊尾蚴病患者首选的治疗是手术。不宜药物治疗以免囊虫扩散。故选 D。

58、正确答案：B

答案解析：

59、正确答案：E

答案解析：

60、正确答案：C

答案解析：【解析】：Treitz 韧带以上部位出血称为上消化道出血。

61、正确答案：B

答案解析：解析：前列腺癌确诊依赖于组织的病理学检查，前列腺穿刺活检是前列腺癌诊断的重要方法，穿刺途径多采用经会阴或经直肠前列腺穿刺法，穿刺手法又分为手指引导及超声引导下穿刺活检法。

62、正确答案：E

答案解析：

63、正确答案：D

答案解析：解析:根据腹股沟直疝与斜疝发生机制,直疝由直疝三角突出,而斜疝是从腹股沟内环突出,因此内环压迫试验可以区别 ;。

64、正确答案：A

答案解析：解析：胃十二指肠溃疡急性穿孔施行非手术疗法最关键的治疗措施是维持有效的胃肠减压，防止胃肠内容物继续流入腹腔，以免加重感染 。

65、正确答案：E

答案解析：通俗点就是东西扎进人体从另一边又出来了,这样的伤口就是贯通伤。

66、正确答案：A

答案解析：解析：细菌多是能释放内毒素的革兰氏阴性菌属和能产生外毒素的革兰氏阳性菌，其中最常见的是革兰氏阴性杆菌和球菌，例如志贺氏痢疾菌属、大肠杆菌、脑膜炎双球菌等；

67、正确答案：C

答案解析：记忆，与 A 选项鉴别，常考。

68、正确答案：B

答案解析：解析：浅Ⅱ度烧伤的局部损害深度达真皮浅层,部分生发层存在,表面有大水疱,剧痛,基底潮红,水肿明显。2周内可愈,愈后不留瘢痕。多数有色素沉着。

69、正确答案：B

答案解析：【解析】日本血吸虫病是由皮肤接触含日本血吸虫尾蚴的疫水而感染，由日本血吸虫寄生在人体门静脉系统而发病，但主要病理变化为肝与结肠由虫卵引起的肉芽肿。因此答案是B项。

70、正确答案：B

答案解析：解析：在急性乳腺炎未形成脓肿之前，应用抗生素能够取得较好的效果，因主要病原菌为金黄色葡萄球菌，可直接应用耐青霉素酶的新青霉素。故答案应选B。

71、正确答案：E

答案解析：

72、正确答案：C

答案解析：

73、正确答案：A

答案解析：餐后哽噎感首先考虑食管癌。

74、正确答案：E

答案解析：

75、正确答案：A

答案解析：

76、正确答案：A

答案解析：

77、正确答案：D

答案解析：

78、正确答案：D

答案解析：

79、正确答案：B

答案解析：

80、正确答案：D

答案解析：解析:回肠末端多发的纵形溃疡,溃疡间黏膜正常,病变呈阶段性分布,均提示克罗恩病。

81、正确答案：B

答案解析：

82、正确答案：B

答案解析：

83、正确答案：C

答案解析：

Whipple 三联征是一种临床表现。由多种原因引起的血糖浓度低于正常的综合征，且以交感神经兴奋和中枢神经系统功能障碍为突出表现，其典型临床表现称为 Whipple 三联征。①自发性周期性发作低血糖症状、昏迷及其精神神经症状，每天空腹或劳动后发作者；②发作时血糖低于 2.8mmol/L；③口服或静脉注射葡萄糖后，症状可立即消失。Whipple 三联征为典型的胰岛素瘤表现。

84、正确答案：A

答案解析：

85、正确答案：A

答案解析：【解析】老年男性,进行性消瘦,考虑恶病质,患者有饱胀、腹痛病史,故最可能诊断为胃癌。

86、正确答案：D

答案解析：Colles 骨折的典型表现

87、正确答案：E

答案解析：

88、正确答案：E

答案解析：记忆题

89、正确答案：B

答案解析：

90、正确答案：B

答案解析：

91、正确答案：B

答案解析：

92、正确答案：B

答案解析：

93、正确答案：C

答案解析：

94、正确答案：C

答案解析：

95、正确答案：A

答案解析：解析：该患者 1 个月来粪便中有黏液或脓血，不能排除结直肠肿瘤可能，所以应常规首要进行直肠指检。70%的直肠癌通过直肠指诊时被发现，因此在临床上对初诊患者及可疑患者都应做直肠指诊检查，决不可忽视这一重要的检查方法，以免延误直肠癌等重要疾病的早期诊断及手术时机。肠镜检查为确诊手段。

96、正确答案：D

答案解析：解析：纤维腺瘤好发年龄为 20~25 岁，病程较长，无疼痛，多为单个肿块，边界清楚，移动佳。早期乳癌多见患侧无痛、单发小肿块，质硬表面不光滑，不易推动。乳头湿疹样乳腺癌乳头有瘙痒、烧灼感，后出现乳头和乳晕的皮肤粗糙糜烂如湿疹样，进而溃疡。乳房囊性增生病多见于中年妇女，特点是乳房胀痛，肿块呈周期性，与月经有关。

97、正确答案：E

答案解析：解析：根据患者受伤部位，考虑为腹部脏器损伤，肝脏破裂、血管损伤时一般出血量较大，伴有血压的变化，腹腔内空腔脏器的损伤几率较大，且临床表现基本相同，胰腺损伤也可出现类似症状，但发生几率较低。

98、正确答案：A

答案解析：解析：根据临床表现及饮食，可以诊断为中毒型痢疾。

99、正确答案：D

答案解析：解析：该产妇坐骨结节间径(7cm)+出口后矢状径(7cm)<15cm，



提示骨盆出口平面狭窄。骨盆出口狭窄的产妇，不应进行试产，而应行剖宫产术结束分娩。

100、正确答案：C

答案解析：解析：[考点]细菌性肝脓肿的诊断。本例患者起病急，寒战、高热，白细胞升高，核左移，肝区疼痛、肝大，为细菌性肝脓肿的典型临床表现，结合超声及同位素扫描结果，应首先考虑细菌性肝脓肿。

101、正确答案：D

答案解析：不典型增生为癌前病变，应尽快手术治疗。

102、正确答案：B

答案解析：

103、正确答案：C

答案解析：解析：患者食欲减退，消瘦，黑便，上消化道造影示胃粘膜紊乱，胃壁僵硬，故诊断为胃癌，最常见的转移途径为淋巴转移。

104、正确答案：E

答案解析：解析：B超可清楚地显示胆囊胆总管、肝管、肝外胆管、胰腺、肾上腺、前列腺等。B超检查能检出有否占位性病变，尤其对积液与囊肿的物理定性和数量、体积等相当准确。对各种管腔内结石的检出率高出传统的检查法。故本题选E。

105、正确答案：C

答案解析：【解析】：根据患儿的临床表现：高热 1 天，第 2 天出疹，全身皮肤弥漫性充血发红，可见密集、均匀的红色细小丘疹，面部潮红，唇周苍白，咽、扁桃体充血、水肿，舌乳头红肿、突起。尤其是患儿出疹的时间，是在发热后的第二天，典型皮疹、帕氏线、草莓舌等是诊断猩红热的主要依据，再结合其他症状，此患儿可能是猩红热。故选 C。

106、正确答案：D

答案解析：根据经历及临床表现，患者极有可能是由于煤气泄漏造成的 CO 中毒。

107、正确答案：C

答案解析：

108、正确答案：E

答案解析：【解析】：根据题干：今晨在突然转头时感眩晕耳鸣，恶心呕吐，摔倒在地，2 分钟后缓解，可以考虑为：椎动脉型颈椎病。椎动脉型颈椎病是颈椎病证型之一。椎动脉型颈椎病属于椎-基底动脉缺血综合征，指由于各种原因导致的椎-基底动脉系统血流不足，导致该动脉供血区一脑及脊髓生理功能不全而产生的一系列症候群。

109、正确答案：D

答案解析：

110、正确答案：C

答案解析：

111、正确答案：E

答案解析：

112、正确答案：B

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：E

答案解析：

115、正确答案：A

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：A

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：D

答案解析：

120、正确答案：A

答案解析：

121、正确答案：E

答案解析：

122、正确答案：A

答案解析：

123、正确答案：E

答案解析：

124、正确答案：C

答案解析：

125、正确答案：A

答案解析：

126、正确答案：D

答案解析：

127、正确答案：E

答案解析：

128、正确答案：A

答案解析：

129、正确答案：C

答案解析：

130、正确答案：E

答案解析：

131、正确答案：D

答案解析：

132、正确答案：E

答案解析：

133、正确答案：E

答案解析：

134、正确答案：B

答案解析：

135、正确答案：A

答案解析：

136、正确答案：B

答案解析：

137、正确答案：A

答案解析：

138、正确答案：B

答案解析：

139、正确答案：E

答案解析：

140、正确答案：C

答案解析：

141、正确答案：B

答案解析：

142、正确答案：C

答案解析：

143、正确答案：A

答案解析：

144、正确答案：B

答案解析：

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：E

答案解析：

147、正确答案：B

答案解析：

148、正确答案：A

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：B

答案解析：

