

金英杰直播学院

中医专业

中医外科学 1

直播笔记

整理教辅:白芷

2021年3月6日

第一章 医外科疾病病因病机（助理不考）

第一节 致病因素

考点一 外感六淫致病

1. 风 其肿宣浮，患部皮色或红或不变，**痛无定处**，**走注甚速**，多为阳证，多侵犯人体上部，发病迅速
2. 寒 色紫青暗，不红不热，肿势散漫，**痛有定处**，得暖则减，化脓迟缓，多为**阴证**，多侵犯人体筋骨关节
3. 暑 患部燃红、肿胀、灼热，糜烂流脓、水，痒、痛，遇冷则减，阳证
4. 湿 发于身体**下部**者多与湿邪有关，**流水**
5. 燥 燥邪易伤人体阴液，侵犯皮肤，致患部干燥、枯槁、被裂、脱屑等
6. 火发病速，来势急猛，频红灼热，肿势皮薄光亮，疼痛剧烈，容易化脓腐烂，或有皮下瘀斑

外科疾病的发生尤以“**热毒**”“**火毒**”最为常见，

考点二 情志内伤致病

大多发生在**乳房**、**胸胁**、**颈的两侧**等**肝经**循行部位，多夹**郁**夹**痰**。

第二章 中医外科疾病辨证（助理不考）

纲目二 阴阳辨证

阴阳是八纲辨证的总纲，也是一切外科疾病辨证的总纲。

考点一 以局部症状辨别阴阳

1. 发病缓急 急性发病的病属阳，慢性发作的病属阴，
2. 病位深浅 病发于皮肉的属阳，发于筋骨的属阴，
3. 皮肤颜色 红活掀赤的属阳，紫暗或皮色不变的属阴，

4. 皮肤温度 灼热的属阳，不热或微热的属阴，
5. 肿形高度 肿胀形势高起的属阳，平坦下陷的属阴，
6. 肿胀范围 肿胀局限，根脚收束的属阳，肿胀范围不局限，根脚散漫的属阴
7. 肿块硬度 肿块**软硬适度**，溃后渐消的**属阳**，**坚硬如石**，或**柔软如棉**的属阴
8. 疼痛感觉 疼痛比较剧烈的属阳，不痛、隐痛、不痛或抽痛的属阴
9. 脓液稀稠 溃脓液稠厚的属阳，稀薄或纯血水的属阴
10. 病程长短 阳证的病程比较短，阴证的病程比较长
11. 全身症状 阳证初起常伴有形寒发热、口渴、纳呆、大便秘结、小便短赤，溃后症状渐次消失，阴证初起一般无明显症状，酿脓期常有骨蒸潮热、颧红，或面色白、神疲自汗、盗汗等症状，溃后尤甚

第三节 部位辨证

发于**上部**的疾病，病因特点**风温、风热**

发于**中部**的疾病，病因特点**气郁、火郁**

发于**下部**的疾病，病因特点**寒湿、湿热**

纲目五 要点一 辨肿的性质

风肿发病**急骤**，**漫肿**宣浮，或**游走**无定，不红微热，或轻微疼痛。见于**疔腮、大头瘟**等。

痰肿肿势**软如棉**，或**硬如馒**，大小不一，形态各异，无处不生，不红不热，皮色不变。见于**瘰疬、脂瘤**等。

化脓痛痛势**急胀**，痛无止时，如同**鸡啄**，按之中**软**应指见于**疮疡成脓期**。

要点四 辨痒

1. **风胜**: **走窜**无定，遍体作痒，抓破血溢，随破随收，不致化腐，多为干性。见

于牛皮癣、白疔、癰疹等。

2. **湿胜**: 浸淫四窜, 黄水淋漓, 最易沿表皮蚀烂, 越腐越痒, 多为湿性。见于急性湿疮;或有传染性, 如脓疱疮。

3. **热胜**: 焮红灼热作痒, 甚则糜烂滋水淋漓, 结痂成片, 常不传染。见于接触性皮炎。

4. **虫淫**: 浸淫蔓延, 黄水频流, 状如虫行皮中, 其痒尤甚, 最易传染。见于手足癣、疥疮等。

5. **血虚**: 皮肤变厚、干燥、脱屑, 很少糜烂流滋水。见于牛皮癣、慢性湿疮。

要点五 辨脓

确认成脓的方法

接触法---波动感

透光法---手电筒, 蛇头疔脓液在骨膜部, 沿指骨的行程有增强的阴影, 而周围清晰;在骨部的, 沿着骨有黑色遮暗, 并在感染区有明显的轮廓

点压法---局限性的剧痛点, 即为可疑脓肿。

穿刺法

B超

辨溃疡形态

1. 化脓性溃疡: 口大底小

2. 压迫性溃疡(缺血性溃疡): 初期皮肤暗紫, 很快变黑并坏死, 流滋水, 腐烂, 脓液有臭味。多见于褥疮。

3. 疮疡性溃疡: 凹陷或潜行空洞瘰管, 脓水清稀, 夹有败絮状物

4. 岩性溃疡: 翻花如岩, 珍珠样结节

5. 梅毒性溃疡: 边缘整齐, 多呈半月形, 坚硬削直如凿, 口多大底多大。

考点七 辨出血

主要辨别出血的部位、性状、原因,

主要分:

1. 便血——上消化道出血一般呈柏油样黑便, 为远血; 直肠、肛门的便血血色鲜红, 为近血。
2. 尿血——一般以无痛为“尿血”; 有痛称“血淋”

温馨提醒: 总结规律非常重要, 辨肿、痛、脓等都有相通之处, 寒热看温度, 风看游走不定字眼, 湿看渗出肿胀水疱字眼, 痰看软如棉, 硬如馒, 气看喜怒消长字眼, 瘀血看色暗疼痛字样, 脓有很多考点: 化脓的鉴别、辨脓的方法、化脓的疼痛软硬程度。

第三章 中医外科疾病治法

第一节 内治法

消、托、补三个总的治疗原则。

1. 消法, 适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病以及各种皮肤疾病。
2. 托法, 是用补益气血和透脓的药物扶助正气、托毒外出。适用于外疡中期, 即成脓期或机体正气虚弱者。补托法用于正虚毒盛, 透托法用于毒气虽盛而正气未衰者。
3. 补法, 用于溃疡后期, 毒邪未尽, 切不可用补法。

第二节 外治法

手术疗法常用的有切开法、砭镰法。其他疗法有引流法、垫棉法。

考点一 膏药、油膏的临床应用(助理不考)

1. 膏药: 现称**硬膏**。

太乙膏、**干捶膏**均可用于红肿热痛明显之**阳证疮疡**。太乙膏功能为消肿、清火、解毒、生肌。干捶膏功能为消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛。

阳和解凝膏用于**阴证疮疡**未溃者, 功能为温经和阳、祛风散寒、调气活血、化痰通络。

咬头膏功能蚀破疮头, 适用于**肿疡脓成不能自破**, 以及患者不愿接受手术切开排脓者。

2. 油膏: 现称**软膏**。适用于肿疡、溃疡、皮肤病糜烂结痂渗液不多者以及肛门门病等。

金黄膏、**玉露膏**适用于**疮疡阳证**。**金黄膏**长于除湿化痰, 对肿而有结块, 尤其是急性炎症控制后形成的慢性迁延性炎症更为适宜。**玉露膏**性偏寒凉, 对掀红灼热明显、肿势散漫者效果较佳;

冲和膏有活血止痛、疏风祛寒、消肿软坚的作用, 适用于半阴半阳证;

回阳玉龙膏有温经散寒、活血化瘀的作用, 适用于阴证。

阳证疮疡——太多的千金玉石; 阴证疮疡——回阳、阳和

溃疡期可选用**生肌玉红膏**、**红油膏**、**生肌白玉膏**。

生肌玉红膏功能活血祛腐、解毒止痛、润肤生肌收口, 适用于一切**溃疡腐肉未脱、新肉未生**之时, 或日久不能收口者;

红油膏功能防腐生肌, 适用于**一切溃疡**;

生肌白玉膏功能润肤生肌收敛, 适用于**溃疡腐肉已净、疮口不敛者**, 以及**乳头皲裂、肛裂**等病;

疯油膏功能润燥杀虫止痒, 适用于**牛皮癣、慢性湿疮、皲裂**等;

青黛散油膏收湿止痒、清热解毒，适用于蛇串疮及急、慢性湿疮等皮肤焮红痒痛、渗液不多之症，亦可用于疔腮以及对各种油膏过敏者。

考点二 掺药(助理不考)

掺药，将各种不同的药物研成粉末，用时掺布于膏药或油膏上，或直接掺布于病变部位，谓之掺药古称散剂，现称粉剂。

1. 消散药

阳毒内消散、红灵丹，适用于一切阳证

阴毒内消散、桂麝散、黑退消，适用于一切阴证

2. 提脓祛腐药：九一丹、八二丹、七三丹、五五丹、九黄丹、黑虎丹

3. 腐蚀药——白降丹——溃疡疮口太小、脓腐难去 白浆?败酱草?

4. 祛腐生肌药

回阳玉龙散——用于腐肉难脱，肉芽暗红，或腐肉已脱，肉芽灰白，新肉不长者---阴证

月白珍珠散——用于腐肉脱而未尽，新肉不生，久不收口者---阳证

拔毒生肌散——用于腐肉未脱，常流毒水，疮口下陷，久不生肌者---阴证

黄芪六一散、回阳生肌散——用于溃疡虚证，脓水清稀，久不收口---虚证

生肌散、八宝丹——生肌收口，溃疡腐肉已脱、脓水将尽

切口选择

以便于引流为原则，选择脓腔最低点或最薄弱处进刀;

一般疮疡宜循经直切;

乳房部应以乳头为中心放射状切开，免伤乳络;

面部脓肿应尽量沿皮肤的自然纹理切开;

手指脓肿应从**侧方切开**;

关节区附近的脓肿切口尽量**避免越过关节**;

若为关节区脓肿，一般施行**横切口、弧形切口**或“S”形切口;

肛旁低位脓肿应以**肛管为中心做放射状**切开;

砭镰法——飞针，三棱针浅刺放血，适用于急性**阳证**疮疡，下肢丹毒、红丝疔及疔、疮、痈肿初起、外伤瘀血肿痛、痔疮肿痛。

第四章 疮疡

	部位	范围	特点	分类
疔	浅表部位	3CM	浅，易脓易溃易敛	有头疔、无头疔、蜈蚣疔
疔		3-6CM	深，坚硬，如钉	颜面疔、手足疔、红丝疔
痈	体表皮肉之间	6-9CM	易肿易脓易溃易敛	颈痈
发		范围比痈大	蔓延成片， 边界不清 ，灼热疼痛	锁喉痈、臀痈、手发背、足发背
丹毒			突然红成片， 边界清楚 ，色如涂丹	内发丹毒、报头火丹、流火、赤游丹毒
有头疽	肌肤间，深部	9-12CM	粟粒样脓头，红肿热痛，溃后蜂窝状	
流注	肌肉深部		局部漫肿疼痛，皮色如常，容易走窜	

第一节 疔

疔的定义与特点:

急性化脓性疾病，**3cm**，浅，色红、灼热疼痛，**易脓、易溃、易敛**。

临床表现: 1. 有头疔突起根浅，中心有一脓头，出脓即愈。

2. 无头疔无脓头。

3. 蜈蚣疔多发于**儿童头部**

疔病部位: **项后发际、背部、臀部**

疔的治疗: **清热解毒**

疔: 3cm; 疔: 3- 6cm; 痈: 6- 9cm; 疽: 9-12cm

疔			
热毒蕴结	项后发际、背部、臀部。散发全身，簇集一处，此愈彼起。苔黄，脉数	清热解毒	五味消毒饮、黄连解毒汤
暑热浸淫	夏秋季节，小儿及产妇多见。发热，口干，便秘，溲赤。苔薄腻，脉滑数	清暑化湿解毒	清暑汤加减
体虚毒恋 阴虚内热	疔肿常此愈彼起，或散发全身各处，常伴口干唇燥，舌红苔薄，脉细数	养阴清热 解毒	仙方活命饮 +增液汤加减
体虚毒恋 脾胃虚弱	成脓、收口时间均较长，脓水稀薄。伴面黄，乏力，便溏	健脾和胃 清化湿热	五神汤合 参苓白术散

蜈蚣疔外治: 十字形剪开 借黄五仙液请午餐

第二节 疔

疔是多发于**颜面和手足**等处。其特点是根深如钉，病情变化迅速，容易造成毒邪走散。发于**颜面部**的疔疮很容易**走黄**而有**生命危险**;发于**手足部**的疔疮则易**损筋伤骨**;红丝疔容易走黄。3-6cm 大小。

蛇眼疔，**指甲一侧边缘**的近端处; 炎黄

蛇头疔，**指端**，**指掌面一侧**做纵形切口，不可在指掌面正中切开;

蛇肚疔，**指腹**，**手指侧面**做纵形切口;

托盘疔，**整掌**，**沿掌横纹**切开;

红丝疔，急性淋巴管炎，患肢**内侧**，**红丝**一条或数条，迅速向躯干方向**走窜**。

砭镰法，寸寸挑断

疔内治法原则: **清热解毒**

JINYINGJIE.COM JIN YING JIE .COM		疔		
颜面疔	热毒蕴结	红肿高突，根脚收束，发热头痛。舌红，苔黄，脉数。	清热解毒	五味消毒饮 黄连解毒汤
	火毒炽盛	疮形平塌，皮色紫暗，掀热疼痛。伴高热，头痛肿势散漫，烦渴，呕恶，溲赤。舌红，苔黄腻，脉洪数。	凉血清热解毒	犀角地黄汤 黄连解毒汤 五味消毒饮
红丝疔	火毒入络	患肢红丝较细，红肿疼痛。全身症状较轻。苔薄黄，脉濡数	清热解毒	五味消毒饮
	火毒入营	患肢红丝粗肿明显，迅速向近端蔓延，并伴臀核肿大作痛，全身寒战高热，头痛，口渴。苔黄腻，脉洪数。	凉血清营解毒散结	犀角地黄汤 黄连解毒汤 五味消毒饮

第三节 痈

考点一 痈的概念与特点

痈：指发生于**体表皮肉之间的急性化脓性疾病**。

特点：光软无头，红肿疼痛，**6~9 cm**，发病**迅速**，**易肿、易脓、易溃、易敛**。

JINYINGJIE.COM JIN YING JIE .COM		痈	
火毒凝结	局部突然肿胀，光软无头，迅速结块，皮肤 焮红 ，少数病例皮色不变，到酿脓时才转为红色， 灼热疼痛 。日后逐渐扩大，变成高肿发硬。重者可有恶寒发热，头痛，泛恶，口渴，舌苔黄腻，脉弦滑或洪数等症状	清热解毒 行瘀活血	仙方活命饮
热胜肉腐	红肿明显，肿势 高突 ， 痛如鸡啄 ， 溃后脓出痛止 ，舌红，苔黄，脉数	和营清热 透脓托毒	仙方活命饮+ 五味消毒饮
气血两虚	脓水稀薄，疮面新肉不生，色淡红，伴面色 无华 ，神疲 乏力 ，纳少。舌质淡胖，苔少，脉沉细无力	益气养血 托毒生肌	托里消毒散 加减

外治法：初起用**金黄膏**或**金黄散** **用仙方仙味托里毒**

颈痈：多见于儿童，冬春季易发。多生于**颈旁**两侧，也可发生于**耳后、项后、颌下、颌下**。

辨证论治——风热痰毒证

证候：颈旁结块，初起色白濡肿，形如鸡卵，灼热疼痛。

方剂：**牛蒡解肌汤**或**银翘散**加减。

第四节 发

考点一 发的含义与特点

发是病变范围**比疔大**的一种急性化脓性疾病。相当于**西医的蜂窝组织炎**。其特点是初起无头，红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，**边界不清**，灼热疼痛，有的3~5日后中央色褐腐溃，周围湿烂，全身症状明显。

生于**结喉处**的**锁喉痛**

生于**臀部的****臀痛**

生于**手背部的****手发背**

生于**足背的****足发背**

锁喉痛，有脓切开			
痰热蕴结	结喉处红肿绕喉，坚硬灼热疼痛，肿势蔓延；壮热，口渴，头痛颈强，吞咽困难；舌红绛，苔 黄腻 ，脉弦 滑数 或 洪数	散风清热，化痰解毒	普济 消 毒饮
热胜肉腐	肿势局限，按之中软应指，脓出黄稠，热退肿减；舌红，苔 黄 ，脉 数	清热化痰和营托毒	仙方活 命饮
热伤胃阴	溃后脓出稀薄，疮口有空壳，或内溃脓从咽喉部流出，疮口暗红，疮口难敛；伴低热不退， 口干少津 ，纳谷不香；舌光红，脉细	清养胃阴	益胃汤

锁喉用一小线

臀 痛——由肌肉注射引起者，俗称针毒结块			
气血两虚	溃后腐肉大块脱落，疮口较深，形成空腔，收口缓慢；面色萎黄，神 疲乏力 ，纳谷不香；舌质 淡红 ，苔 薄白 ，脉 细	调补气血	八珍汤
湿火蕴结	臀部红肿热痛，或湿烂溃脓；恶寒发热，头身疼痛，纳食欠佳；舌质红，苔 黄 或 黄腻 脉 数	清热解毒和营化湿	黄连解毒汤+ 仙方活命饮
湿痰凝滞	漫肿不红，结块坚实，进展缓慢，一般无全身症状。舌质淡红，苔 薄白 ，脉 缓	和营活血利湿化痰	桃红四物汤+ 仙方活命饮

吞八黄桃

第五节 有头疽(助理不考)

有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病。相当于西医的疔。其特点是初起皮肤上即有粟粒样脓头，掀热红肿疼痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、蜂窝，范围常超过 9~12 cm,大者可在 30 cm 以上。

好发于项后、背部等皮肤厚韧之处，多见于中老年人及消渴病患者，并且容易发生内陷。

有限?炎黄?

颜面疔——走黄?手足疔伤及筋骨?

初期: 局部红肿结块，肿块上有粟粒状脓头，作痒作痛，逐渐向周围和深部扩散，脓头增多，色红、灼热、疼痛。

溃脓期: 疮面腐烂形似蜂窝，肿势范围大小不一，常超过 10cm,甚至大逾盈尺;伴高热口渴，便秘溲赤。

收口期: 脓腐渐尽，新肉生长，肉色红活，逐渐收口而愈。

合并内陷: 神昏谵语、气息急促、恶心呕吐、腰痛、尿少、尿赤、发斑等严重全身症状者。

有头疽			
火毒凝结	壮年正实邪盛者。局部红肿高突，灼热疼痛，根脚收束，迅速化脓脱腐，脓出黄稠。伴发热，口渴，尿赤。舌苔黄，脉数有力	清热泻火和营托毒	黄连解毒汤+仙方活命饮
湿热壅滞	局部症状与火毒凝结相同。伴全身壮热，朝轻暮重，胸闷呕恶。舌苔白腻或黄腻，脉濡数	清热化湿和营托毒	仙方活命饮
阴虚火炽	多见于消渴患者。肿势平塌，根脚散漫，皮色紫滞，脓腐难化，脓水稀少或带血水，疼痛剧烈。伴发热烦躁，口干唇燥，饮食少思，大便燥结，小便短赤。舌质红，苔黄燥，脉细弦数	滋阴生津清热托毒	竹叶黄芪汤
气虚毒滞	多见于年迈体虚、气血不足患者。肿势平塌，根脚散漫，皮色灰暗不泽，化脓迟缓，腐肉难脱，脓液稀少，色带灰绿，闷肿胀痛，容易形成空腔。面色少华。舌质淡红，苔白或微黄，脉数无力	扶正托毒	八珍汤+仙方活命饮

2. 外治

初起未溃，属火毒凝结证或湿热壅滞证，用**金黄膏**或**干捶膏**外敷；阴虚火炽证或气虚毒滞证用**冲和膏**外敷。

酿脓期，若疮肿有波动感，采用手术扩创排毒，做“+”或“++”字形切开。

收口期，疮面脓腐已净，新肉渐生，以**生肌散**掺疮口，外敷**白玉膏**。若疮口有空腔，皮肤与新肉一时不能粘合者，可用垫棉法加压包扎。**蜈蚣疔切法？**

第六节 流注(助理不考)

1. 特点

流注是以发生在肌肉深部的转移性、多发性脓肿为表现的全身感染性疾病。其特点是**漫肿疼痛**，**皮色正常**，好发于**四肢、躯干肌肉丰厚之深处**，并有此处未愈他处又起的特点。相当于**西医的脓血症、肌肉深部脓肿**。

金英杰医学 JINYINGJIE.COM		流注	
余毒攻窜	发病前有疔疮、疖、疖等 病史 。四肢或躯干有一处或数处肌肉疼痛，肿胀焮热，肿块色白或微红；伴高热，口渴，甚则神昏谵语，大便秘结，小便黄赤；舌质 红 ，苔 黄 ，脉 洪数	清热解 毒凉血 通络	黄连解 毒汤+ 犀角地 黄汤
暑湿交阻	多发于夏秋之间。初起恶寒发热，胸闷呕吐，头痛头晕，四肢关节酸痛；胸部可布白，大便秘结或溏泻，小便黄赤；舌质红，苔 白腻 ，脉 滑数	清暑解 毒化湿	清暑汤 加减
瘀血凝滞	发作多次，新肉难生，隐痛，神疲，舌红，脉细弱。劳伤筋脉诱发者，多发于四肢内侧；跌打损伤者，发于伤处。局部 青紫 ，脓中夹 瘀血块 。妇女产后恶露停滞而成者，多发于小腹及大腿，舌苔薄白或黄腻，脉 涩 或数	和营活 血祛瘀 通络	活血散 瘀汤

刘柱吸毒火邪轻

第七节 丹毒

丹毒是指患部皮肤**突然发红成片、色如涂丹**的急性感染性疾病。特点是病起突然，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，**焮热肿胀**，**边界清楚**，迅

速扩大，数日内可逐渐痊愈，但容易复。

发生于躯干部者，称**内发丹毒**

发于头面部，**抱头火丹(大头瘟)**

发于小腿足部，称**流火**；

新生儿**臀部**，称**赤游丹毒**

丹毒			
风热毒蕴	发于 头面部 ，皮肤 焮红灼热 ，眼胞 肿胀难睁 。伴 恶寒 ， 发热 ， 头痛 ， 舌红苔薄黄 ， 脉浮数 。 (抱头火丹-大头瘟)	疏风清热解毒	普济消毒饮
肝脾湿火	发于 胸腹腰胯部 ，皮肤 红肿蔓延 ，摸之 灼手 ， 肿胀疼痛 ，伴 口干且苦 ， 舌红苔黄腻 ， 脉弦滑数	清肝泻火利湿	柴胡清肝汤 、 龙胆泻肝汤 、 化斑解毒汤
湿热毒蕴	发于 下肢 ，局部 红赤肿胀 ， 灼热疼痛 ，或见 水疱 、 紫斑 ，甚至 结毒化脓 或 皮肤坏死 。舌 红苔黄腻 ， 脉滑数 (流火)	利湿清热	五神汤 + 萆薢渗湿汤
胎火蕴毒	发于 新生儿 ，多见于 臀部 ，局部 红肿灼热 ，呈 游走性 ，伴 壮热烦躁 ， 神昏谵语 ， 恶心呕吐 (赤游丹)	凉血清热解毒	犀角地黄汤 + 黄连解毒汤

2.外治

(1)外敷法用**玉露散**或**金黄散**，以冷开水或鲜丝瓜叶捣汁或金银花露调敷。或鲜荷花叶、鲜蒲公英、鲜地丁全草、鲜马齿苋、鲜冬青树叶等捣烂湿敷。

(2)**砭镰法**用七星针或三棱针叩刺患部皮肤，**放血泄毒**。此法只**适用于下肢复发性丹毒**，**禁用于赤游丹毒、抱头火丹患者**。

(3)若流火结毒成脓者，可在坏死部分作小切口引流，掺**九一丹**，外敷**红油膏**。

第八节 走黄与内陷(助理不考)

走黄与内陷为疮疡阳证疾病过程中因火毒炽盛，或正气不足，导致**毒邪走散**，**内攻脏腑**的危险证候。相当于西医的**全身性急性化脓性疾病**。继发于**疔疮**的常称为**走黄**；**因疽毒或除疔以外的其他疮疡引起者称为内陷**。

走黄(颜面\红丝疔)发生在于火毒炽盛, 毒入营血, 内攻脏腑

内陷(有头疽)发生的根本原因在于正气内虚, 火毒炽盛

考点二 内陷的分类

内陷证发生原因, 正气内虚, 火毒炽盛, 加之失治或不当, 以致正不胜邪, 反陷入里, 客于营血, 内犯脏腑---三陷变局---有头疽

1. 火陷: 阴液不足, 火毒炽盛, 复因挤压疮口, 或治疗不当或失时, 以致正不胜邪, 毒邪客于营血, 内犯脏腑---有头疽---毒盛期
2. 干陷: 气血两亏, 正不胜邪, 不能酿化为脓, 载毒外泄, 以致正愈虚, 毒愈盛, 形成内闭外脱---有头疽---溃脓期
3. 虚陷: 毒邪虽已衰退, 而气血大伤, 脾气不复, 肾阳亦衰, 导致生化乏源, 阴阳两竭, 余邪走窜入营---有头疽---收口期



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲30号金码大厦1层22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

