



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

金英杰直播学院

临床重点学科消化系统

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- 1、食管癌多发于中老年，以进行性吞咽困难为其临床特征；**
- 2、食管癌发病与饮食中亚硝胺类化合物含量和真菌毒素有关；**
- 3、食管癌部位以中段居多；组织类型以鳞癌多见；主要淋巴转移首先转至粘膜下，晚期转至左锁骨上淋巴结**
- 4、早期食管癌：病变位于粘膜层和粘膜下浅层，无淋巴结转移。分为四型 ①充血型（原位癌）；②糜烂型；③斑块型（最多见）；④乳头型**
- 5、食管癌首选检查内镜，确诊内镜+活检，普查首选拉网**
- 6、早期食管癌=进食哽噎+内镜+活检/X线食管粘膜增粗、迂曲、中断**

晚期食管癌=进行性吞咽困难+内镜+活检

/X线食管管腔狭窄、管壁僵硬

7、急性胃炎以应激+呕血、黑便为其临床特征

8、诊断公式:急性胃炎=应激/药物/大量饮酒/感染/外伤等+呕血、黑便

9、幽门螺杆菌(HP)感染(最常见)——导致慢性胃炎(B型萎缩性胃炎)

10、自身免疫——导致自身免疫性胃炎(A型萎缩性胃炎)

11、消化性溃疡包括胃溃疡和十二指肠溃疡两种疾病，主要病因是幽门螺杆菌(HP)感染(占90%以上)，其次是非甾体抗炎药(NSAID)等

12、消化性溃疡病变部位

- 1.胃溃疡(GU)——胃小弯
- 2.十二指肠溃疡(Du)——球部前壁
- 13、消化性溃疡表现：规律性上腹部疼痛——
——肠前胃后
- 14、穿孔首选检查：立位 X 线→膈下游离
气体
- 15、十二指肠溃疡不发生癌变
- 16、早期倾倒综合征出现在进食后半小时，
表现为心悸、恶心、呕吐、乏力、出汗、腹
泻等
- 17、晚期倾倒综合征又称低血糖综合征，发
生在进食后 2~4 小时，主要表现为头晕、
面色苍白、出冷汗等
- 18、残胃癌：因良性疾病行胃大部切除术后
5 年以上，残胃出现原发癌

19、胃癌以腺癌最多见，胃腺癌的最好发部位为胃窦，淋巴转移是胃癌的主要转移途径

20、早期无特异症状，或有乏力、纳差、饱胀等。疼痛和体重减轻是进展期胃癌最常见的症状。典型表现：中老年 + 腹部疼痛、肿块 + 进行性消瘦

21、早期胃癌：是指病灶仅限于黏膜或黏膜下层，不论病灶大小或有无淋巴结转移。癌直径小于 10mm 为小胃癌，小于 5mm 为微小胃癌

22、进展期胃癌：浸润深度超过黏膜下层。其中已侵入肌层者称中期；侵及浆膜或浆膜外者称晚期胃癌。

23、临床病理分期：T 原发肿瘤浸润胃壁的深度；N 局部淋巴结的转移；M 肿瘤远处转

移情况





金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训领导品牌

致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



北京金英杰医考课程

金英杰直播，让学习更容易

全国免费咨询热线：**400-900-9392** 客服及投诉电话：**400-606-1615**

地址：北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层