中医执业(含助理)医师资格考试 实践技能模拟考官评分手册

金英杰医学教育研究院 编

编写说明

本书由北京金英杰医考名师团队权威打造,我们在结合新版技能考试大纲和历年考题的基础上,参照评分标准,浓缩考官手册内容,编写了此书,力求简洁精确。在编写内容时,以新版考试大纲为参考,纳入2021年的高频考点和考题,模拟考官评分标准,对试题采分点进行剖析,让考生充分了解命题思路、操作得分要领,最终达到步骤不混乱,细节不丢分,得分要领全掌握的目的,轻松应对2022年实践技能考试。

特别说明

本书在参照历年考题的基础上做出了相关的修改和变动,不保证 2022 年使用本书的全国考生考场遇到的考题一模一样,如有原题,纯属巧合。

目 录

第一站	病案(例)分析	1
第二站	中医操作、病史采集、中医临床答辩	52
第三站	体格检查、西医操作、西医临床答辩 10	00



第一站 病案(例)分析

辨证论治标准考试题库

本站辨证论治涵盖以下考试类别和级别

类别	级别
日大坝之类正的中医	具有规定学历的中医执业医师
具有规定学历的中医	具有规定学历的中医执业助理医师
而至式 <u>碎</u> 去去儿去!	师承或确有专长的中医执业医师
师承或确有专业专长	师承或确有专长的中医执业助理医师





考试级别:140/240/340/440

试题编号:001

病案摘要1:

汪某,女,33岁,已婚,教师。2018年7月3日初诊。

现症:身热,微恶风,汗少,肢体酸重,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴,口中黏腻,渴不多饮, 胸闷脘痞,便溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。

请与时行感冒相鉴别

项目	评分标准	分值
 中医疾病诊断 	感冒	3
中医证候诊断	常人感冒-暑湿感冒	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以身热,微恶风,汗少为主症,诊断为感冒。 肢体酸重,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴,口中黏腻, 渴不多饮,胸闷脘痞,便溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。辨证 为暑湿感冒。 暑湿遏表,湿热伤中,表卫不和,肺气不清	4
中医类证鉴别	时行感冒病情较重,发病急,全身症状显著,可以发生传变,而化热人里,继发或合并他病,具有广泛的传染性、流行性。普通感冒病情较轻,全身症状不显著,很少有传变和流行性	3
中医治法	清暑祛湿解表	2
方剂名称	新加香薷饮加减	2
药物组成、剂量及煎服法	金银花 12g 连翘 12g 香薷 15g 藿香 12g 鲜荷叶 15g 鲜芦根 15g 厚朴 9g 扁豆 10g 防风 12g 甘草 5g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:002

病案(例)摘要1:

方某,男,43岁,已婚,工人。2018年9月29日初诊。

患者2天前出差,次日出现干咳,连声作呛,喉痒,咽喉干痛,唇鼻干燥,痰少而黏,不易咯出,口干,伴恶风,发热,舌质红干而少津,苔薄白,脉浮数。

请与喘证相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	咳嗽	3
中医证候诊断	外感咳嗽-风燥伤肺证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以咳嗽为主症,诊断为咳嗽。因感受外邪所致,且病程短,故为外感咳嗽。发病季节为9月,干咳,连声作呛,喉痒,咽喉干痛,唇鼻干燥,痰少而黏,不易咯出,口干,伴恶风,发热,舌质红干而少津,苔薄白,脉浮数,辨证为风燥伤肺证。(2分)风燥伤肺,肺失清润而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	咳嗽仅以气逆有声,咳吐痰液为主要临床表现,不兼气喘;喘证则以呼吸困难,甚则不能平卧为主症,可兼有咳嗽、咳痰	3
中医治法	疏风清肺,润燥止咳	2
方剂名称	桑杏汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	桑叶 12 g 薄荷 6 g 淡豆豉 9 g 杏仁 15 g 前胡 12 g 牛蒡子 12 g 沙参 12 g 浙贝母 10 g 天花粉 15 g 芦根 15 g 甘草 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:003

病案(例)摘要1:

王某,男,58岁,己婚,干部。2016年11月10日初诊。

患者有哮喘病史 20 年。3 天前因受寒出现痰鸣气喘。现症:喉中哮鸣有声,胸膈烦闷,呼吸急促,喘咳气逆,咳痰不爽,痰黏色黄,烦躁,口干欲饮,大便偏干,发热,恶寒,无汗,身痛。舌边尖红,苔白腻微黄,脉弦紧。

请与喘证相鉴别

项目	评分标准	分值
 中医疾病诊断 	哮病	3
中医证候诊断	发作期-寒包热哮证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以发作性痰鸣气喘,喉中哮鸣有声为主症,诊断为哮病。喉中哮鸣,胸膈烦闷,呼吸急促,喘咳气逆,咳痰不爽,痰黏色黄,烦躁,口干欲饮,恶寒,发热,无汗,身痛,大便偏干,舌边尖红,苔白腻微黄,脉弦紧,辨为寒包热哮证。(2分) 因痰热壅肺,外感风寒,客寒包火,肺失宣降,肺气上逆而致哮病发作(2分)	4
中医类证鉴别	哮指声响而言,喉中哮鸣有声,是一种反复发作的独立性疾病;喘指气息而言,为呼吸气促困难,是多种肺系急慢性疾病的一个症状。 哮病和喘证都有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘,但喘未必兼哮, 可资鉴别	3
中医治法	解表散寒,清化痰热	2
方剂名称	小青龙加石膏汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	 炙麻黄 12 g 桂枝 9 g 生石膏 20 g^(先煎) 白芍 12 g 生甘草 6 g 生姜 12 g 细辛 3 g 半夏 9 g 五味子 6 g 杏仁 12 g 厚朴 12 g 全瓜蒌 18 g 3 剂, 氷煎服。每日 1 剂, 早晚分服 	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:004

病案(例)摘要1:

赵某,女,70岁,已婚,退休。2016年12月9日初诊。

患者反复咳嗽多年,冬季为重,平时体质较差,1周前受凉后,咳喘又作,自服咳嗽药未控制,遂来就诊。 现症:喘而胸满闷塞,咳嗽,痰多黏腻色白,咯吐不利。恶心欲呕,纳呆,口黏不渴,舌苔白腻,脉滑。 请与哮病相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	喘证	3
中医证候诊断	实喘-痰浊阻肺证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以喘而胸满闷塞为主症,诊断为喘证。喘而胸满闷塞,咳嗽,痰多黏腻色白,咳吐不利,恶心欲呕,纳呆,口黏不渴,舌苔白腻,脉滑,辨证为实喘痰浊阻肺证。(2分) 久病体虚,中阳不运,积湿生痰,复因受寒,引动伏痰,痰浊壅肺,肺失肃降,发为本病(2分)	4
中医类证鉴别	哮指声响而言,喉中哮鸣有声,是一种反复发作的独立性疾病;喘指气息而言,为呼吸气促困难,是多种肺系急慢性疾病的一个症状。 哮病和喘证都有呼吸急促、困难的表现。哮必兼喘,但喘未必兼哮, 可资鉴别	3
中医治法	祛痰降逆,宣肺平喘	2
方剂名称	二陈汤合三子养亲汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	陈皮 12 g 半夏 9 g 茯苓 15 g 生甘草 6 g 苏子 9 g 白芥子 9 g 莱菔子 12 g 杏仁 12 g 紫菀 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3
322277		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:005

病案(例)摘要1:

朱某,男,37岁,已婚,工人。2016年7月21日初诊。

患者经某医院诊断为"肺结核"后,进行抗痨治疗。近1月来呛咳气急,痰少质黏,午后骨蒸潮热,五心烦热,急躁易怒,夜寐盗汗,时时咯血,血色鲜红,口渴,心烦失眠,舌干而红,苔薄黄而剥,脉细数。

请与肺痿相鉴别

项目	评分标准	分值
 中医疾病诊断 	肺痨	3
 中医证候诊断 	虚火灼肺证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以咳嗽,咯血,潮热,盗汗为主症,诊断为肺痨。呛咳气急,痰少质黏,咯血鲜红,午后骨蒸潮热,五心烦热,急躁易怒,口渴,盗汗,心烦失眠,舌干而红,苔薄黄而剥,脉细数,辨证为虚火灼肺证。(2分)感受痨虫,肺肾阴伤,水亏火旺,燥热内灼,络损血溢,而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	两者病位均在肺,但肺痿是肺部多种慢性疾患后期转归而成,如肺痈、肺痨、久嗽等导致肺叶痿弱不用,俱可成痿。肺痨后期可以转成肺痿,但必须明确肺痨并不等于肺痿,两者因果轻重不同。肺痿是以咳吐浊唾涎沫为特征,肺痨是以咳嗽、咳血、潮热、盗汗为特征	3
中医治法	滋阴降火	2
方剂名称	百合固金汤合秦艽鳖甲散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	百合 15 g 生地黄 15 g 麦门冬 15 g 沙参 15 g 玄参 15 g 知母 9 g 百部 15 g 秦艽 10 g 玉竹 12 g 五味子 9 g 鳖甲 18 g 白及 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:006

病案摘要1:

胡某,女,32岁,已婚,公司职员。2018年6月12日初诊。

现症:心悸不安,胸闷气短,动则尤甚,面色苍白,形寒肢冷,舌淡苔白,脉沉细无力。

请与奔豚相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	心悸	3
中医证候诊断	心阳不振证	3
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	患者以心悸不安为主症,诊断为心悸。 胸闷气短,动则尤甚,面色苍白,形寒肢冷,舌淡苔白,脉沉细无力。 辨证为心阳不振证。 心阳虚衰,无以温养心神	4
中医类证鉴别	奔豚发作之时,亦觉心胸躁动不安。与心悸的鉴别要点为:心悸为心中剧烈跳动,发自于心;而奔豚乃上下冲逆,发自少腹	3
中医治法	温补心阳,安神定悸	2
方剂名称	桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	桂枝 12 g 附片 9 g ^(先蔵) 人参 9 g ^(另蔵) 黄芪 15g 麦冬 12g 枸杞 12g 龙骨 15g ^(先蔵) 牡蛎 15g ^(先蔵) 生姜 9 g 大枣 6 g 甘草 5g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:007

病案(例)摘要1:

郑某,男,58岁,已婚,干部。2016年5月5日初诊。

患者吸烟史 10 年,血脂偏高史 3 年。半年来经常在快步行走或持重登坡等劳累中出现胸骨后憋闷疼痛,严重时向颈部或左肩放射,停止行走可缓解,一般持续 5 分钟左右。间断服用丹参片、麝香保心丸等药物,症状时轻时重。现症:心胸隐痛,时作时休,伴心悸气短,倦怠乏力,声音低微,动则易汗。舌体胖,质淡红,边有齿痕,苔薄白,脉虚细。

请与真心痛相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	胸痹	3
中医证候诊断	气阴两虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以胸部闷痛为主症,诊断为胸痹。心胸隐痛,时作时休,心悸气短, 倦怠乏力,声音低微,动则易汗,舌体胖,质淡红,边有齿痕,苔薄白, 脉虚细,辨证为气阴两虚证。(2分) 心气不足,阴血亏耗,血行瘀滞,而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	真心痛乃胸痹的进一步发展,症见心痛剧烈,甚则持续不解,伴有汗出、肢冷、面白、唇紫、手足青至节,脉微或结代等危重证候	3
中医治法	益气养阴,活血通脉	2
方剂名称	生脉散合人参养荣汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	人参 10 g ^(另煎) 黄芪 30 g 麦门冬 12 g 五味子 6 g 炙甘草 6 g 肉桂 6 g 丹参 18 g 当归 12 g 玉竹 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:008


病案(例)摘要1:

庞某,女,68岁,己婚,退休工人。2016年9月23日初诊。

患者平素胆小怕事,寐而不酣间作6年,近1个月受惊吓后,症状加重。现症:虚烦不寐,有时彻夜难寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴气短自汗,倦怠乏力,舌淡,脉弦细。

请与一时性失眠相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	不寐	3
中医证候诊断	心胆气虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以寐而不酣,有时彻夜难寐为主症,诊断为不寐。虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴气短自汗,倦怠乏力,舌淡,脉弦细,辨证为心胆气虚证。(2分)胆小怕事,复受惊吓,心胆虚怯,心神失养,神魂不安,而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	不寐是指单纯以失眠为主症,表现为持续的、严重的睡眠困难。若因一时性情志影响或生活环境改变引起的暂时性失眠不属病态	3
中医治法	益气镇惊,安神定志	2
方剂名称	安神定志丸合酸枣仁汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	党参 12 g 茯苓 12 g 炙甘草 9 g 远志 9 g 酸枣仁 15 g 石菖蒲 9 g 川芎 9 g 龙齿 15 g ^(先煎) 知母 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:009

病案(例)摘要1:

乔某,男,25岁,未婚,工人。2016年12月25日初诊。

患者3小时前因饮酒过量,出现胃脘部疼痛,痛势急迫,脘闷灼热,口干口苦,纳呆恶心,舌红,苔黄腻,脉滑数。

请与胁痛相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	胃痛	3
中医证候诊断	湿热中阻证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以胃脘部疼痛为主症,诊断为胃痛。胃痛急迫,脘闷灼热,口干口苦,纳呆恶心,舌红,苔黄腻,脉滑数,辨证为湿热中阻证(2分)饮酒过度,湿热蕴结,胃气痞阻,不通则痛,而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	胁痛是以胁部疼痛为主症,可伴发热恶寒,或目黄肤黄,或胸闷太息。胃痛以胃脘部疼痛为主,偶见攻痛连胁,可资鉴别	3
中医治法	清化湿热,理气和胃	2
方剂名称	清中汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄连6g 栀子9g 半夏9g 茯苓12g 陈皮6g 黄芩9g 厚朴10g 草豆蔻6g 神曲12g 3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:010

病案(例)摘要1:

赵某,女,44岁,已婚,教师。2016年10月23日初诊。

患者平素情绪不畅,常感胃脘不适,咽喉部有梗阻感,但进食顺畅。3天前与人争执后,症状复作,并出现呕吐。现症:呕吐吞酸,嗳气频繁,胸胁胀痛,纳欲欠佳,舌质红,苔薄腻,脉弦。

请与噎膈相鉴别

X4. [MHZ.2](X, MHZ.2)				
项目	评分标准			
中医疾病诊断	呕吐			
中医证候诊断	肝气犯胃证	3		
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	以呕吐吞酸为主症,诊断为呕吐。嗳气频繁,胸胁胀痛,纳欲欠佳, 舌质红,苔薄腻,脉弦,辨证为肝气犯胃证。(2分) 情志不遂,肝气不疏,横逆犯胃,胃失和降,引发本病(2分)			
中医类证鉴别	呕吐与噎膈,皆有呕吐的症状。然呕吐之病,进食顺畅,吐无定时。 噎膈之病,进食哽噎不顺或食不得人,或食人即吐,甚则因噎废食。 呕吐大多病情较轻,病程较短,预后尚好。而噎膈多因内伤所致,病 情深重,病程较长,预后欠佳			
中医治法	疏肝理气,和胃降逆	2		
方剂名称	四七汤加减	2		
药物组成、剂量及煎服法	苏叶 12 g 厚朴 15 g 半夏 9 g 茯苓 12 g 香附 9 g 栀子 6 g 生姜 9 g 大枣 6 g 甘草 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:011

病案(例)摘要1:

张某,男,32岁,未婚,农民。2016年5月2日初诊。

患者1天前因淋雨受凉而出现腹部疼痛,现症:腹部拘急疼痛,遇寒痛甚,得温痛减,口淡不渴,形寒肢冷,小便清长,大便清稀,舌质淡,苔白腻,脉沉紧。

请与外科腹痛相鉴别

项目	评分标准			
中医疾病诊断	腹痛			
中医症候诊断	寒邪内阻证			
中医病辨证依据(含病因 病机分析)	以腹部疼痛为主症,诊断为腹痛。腹部拘急疼痛,遇寒痛甚,得温痛减,口淡不渴,形寒肢冷,小便清长,大便清稀,舌质淡,苔白腻,脉沉紧,辨证为寒邪内阻证。(2分) 淋雨受凉,寒邪凝滞,中阳被遏,脉络痹阻,而引发本病(2分)			
中医类证鉴别	内科腹痛先发热后腹痛,疼痛一般不剧,痛无定处,压痛不显;外科 腹痛多先腹痛后发热,腹痛剧烈,痛有定处,压痛明显,见腹痛拒按, 腹肌紧张			
中医治法	散寒温里,理气止痛	2		
方剂名称	良附丸合正气天香散加减	2		
药物组成、剂量及煎服法	高良姜 6 g 干姜 6 g 苏叶 9 g 乌药 12 g 香附 9 g 陈皮 9 g 小茴香 6 g 半夏 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:012

病案(例)摘要1:

闫某,男,46岁,干部。2016年7月20日初诊。

患者大便稀溏1年余,病情时轻时重,每因抑郁恼怒而加重。现症:泄泻,腹部攻窜作痛,大便稀溏,每日3次,伴见体倦乏力,胸胁胀闷,嗳气食少,脘腹胀满,舌淡红,苔薄白,脉弦。

请与痢疾相鉴别

项目	评分标准	分值			
中医疾病诊断	泄泻	3			
中医证候诊断	肝气乘脾证				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以便次增多,大便稀溏为主症诊断为泄泻。泄泻腹部攻窜作痛,体倦乏力,胸胁胀闷,嗳气食少,脘腹胀满,每因抑郁恼怒而加重,舌淡红,苔薄白,脉弦,辨证为肝气乘脾证(2分) 肝气不舒,横逆犯脾,脾失健运,而引发本病(2分)	4			
中医类证鉴别	两者均为大便次数增多、便质稀薄的病证,泄泻以大便次数增加,便 质稀溏,甚则如水样,或完谷不化为主症,大便不带脓血,也无里急 后重,或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。	3			
中医治法	抑肝扶脾	2			
方剂名称	痛泻要方加减	2			
药物组成、剂量及煎服法	陈皮9g 白芍9g 白术12g 防风9g 柴胡9g 木香6g 香附9g 茯苓12g 鸡内金9g 焦山楂9g 白扁豆12g 3剂,水煎服,每日1剂,早晚分服	3			



考试级别:140/240/340/440

试题编号:013

病案(例)摘要1:

曾某,男,35岁,已婚,工人。2016年7月3日初诊。

患者 3 天前于路边饭馆就餐后即感腹部不适,随后出现发热腹痛,腹泻 10 余次,夹有赤白脓血。现症:腹部疼痛,里急后重,泻下赤白脓血,黏稠如胶冻,腥臭,肛门灼热,舌苔黄腻,脉滑数。

请与泄泻相鉴别

项目	评分标准	分值		
中医疾病诊断	痢疾	3		
中医证候诊断	湿热痢			
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	以腹痛泄泻,泻下赤白脓血,里急后重为主症,诊断为痢疾。腹部疼痛,里急后重,泻下赤白脓血,黏稠如胶冻,腥臭,肛门灼热,舌苔黄腻,脉滑数,辨证为湿热痢。(2分)饮食不洁,湿热蕴结,熏灼肠道,气血壅滞,脉络伤损,而引发本病(2分)			
中医类证鉴别	两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加, 粪质稀溏,甚则如水样,或完谷不化为主症,大便不带脓血,也无里 急后重,或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征	3		
中医治法	清肠化湿,调气和血	2		
方剂名称	芍药汤加减	2		
药物组成、剂量及煎服法	黄芪 12 g 黄连 10 g 白芍 15 g 当归 12 g 炙甘草 6 g 槟榔 10 g 木香 6 g 大黄 3 g 肉桂 3 g 金银花 15 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:014

病案摘要1:

薛某,女,58岁,已婚,退休。2018年9月23日初诊。

现症:大便干,排出困难,小便清长,面色胱白,四肢不温,腹中冷痛,伴腰膝酸冷,舌淡苔白,脉沉迟。请与肠结相鉴别

项目	评分标准				
中医疾病诊断	便秘	3			
中医证候诊断	虚秘-阳虚秘				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以大便干,排出困难为主症,诊断为便秘。 小便清长,面色脱白,四肢不温,腹中冷痛,伴腰膝酸冷,舌淡苔白,脉沉迟。辨证为阳虚秘。 阳气虚衰,阴寒凝结,大肠传导失常,气机不畅	4			
中医类证鉴别	便秘与肠结两者皆为大便秘结不通。但肠结多为急病,因大肠通降受阻所致,表现为腹部疼痛拒按,大便完全不通,且无矢气和肠鸣音,严重者可吐出粪便。而便秘多为慢性久病,因大肠传导失常所致,表现为腹部胀满,大便干结艰行,可有矢气和肠鸣音,或有恶心欲吐,食纳减少	3			
中医治法	温阳通便	2			
方剂名称	济川煎加减	2			
药物组成、剂量及煎服法	肉苁蓉 15g 牛膝 12g 附片 9 g ^(先煎) 火麻仁 12g 当归 10g 升麻 12g 泽泻 12g 枳壳 12g 木香 6g 麦冬 12g 枸杞 12 g 生姜 9 g 大枣 6 g 甘草 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3			



考试级别:140/240/340/440

试题编号:015

病案(例)摘要1:

寿某,男,29岁,己婚,职员。2016年5月15日初诊。

患者1年来时有右胁胀痛,走窜不定,时轻时重,与情志相关,胸闷腹胀,嗳气频作,舌苔薄白,脉弦。请与胃脘痛相鉴别

	2 12/2//4 17 17 17	
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	胁痛	3
中医证候诊断	肝郁气滞证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以右胁疼痛为主症,诊断为胁痛。右胁胀痛,走窜不定,与情志相关,胸闷腹胀,嗳气频作,舌苔薄白,脉弦,辨证为肝郁气滞证。(2分)情志不畅,肝失条达,气机郁滞,络脉失和,而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	胁痛与胃脘痛的病证中皆有肝郁的病机。但胃脘痛病位在胃脘,兼 有嗳气频作、吞酸嘈杂等胃失和降的症状。而胁痛病位在胁肋部, 伴有目眩、口苦、胸闷、喜太息的症状	
中医治法	疏肝理气	2
方剂名称	柴胡疏肝散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	柴胡9g 枳壳12g 陈皮9g 川芎9g 佛手9g 白芍12g 制香附9g 炙甘草6g 郁金9g 3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:016

病案(例)摘要1:

蒋某,女,51岁,己婚,公务员。2016年11月6日初诊。

患者3年来反复皮肤、目睛发黄,2个月前皮肤、目睛发黄再次出现,且经久不退。现症:身目俱黄,黄色晦暗,脘腹痞胀,纳谷减少,大便不实,神疲畏寒,口淡不渴,舌淡苔腻,脉濡缓。

请与萎黄相鉴别

3. V						
项目	评分标准	分值				
中医疾病诊断	黄疸					
中医证候诊断	阴黄-寒湿阻遏证					
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以皮肤、目睛黄染为主症,诊断为黄疸。身目俱黄,黄色晦暗,脘腹痞胀,纳谷减少,大便不实,神疲畏寒,口淡不渴,舌淡苔腻,脉濡缓,辨证为阴黄寒湿阻遏证。(2分) 久病迁延,中阳不振,寒湿滞留,肝胆失于疏泄,而引发本病(2分)					
中医类证鉴别	黄疸发病与感受外邪、饮食劳倦或病后有关;其病机为湿滞脾胃,肝 胆失疏,胆汁外溢;其主症为身黄、目黄、小便黄。萎黄之病因与饥 饱劳倦、食滞虫积或病后失血有关;其病机为脾胃虚弱,气血不足, 肌肤失养;其主症为肌肤萎黄不泽,目睛及小便不黄,常伴头昏倦 怠,心悸少寐,纳少便溏等症状	3				
中医治法	温中化湿,健脾和胃	2				
方剂名称	茵陈术附汤加减	2				
药物组成、剂量及煎服法	茵陈 15 g 白术 12 g 干姜 6 g 制附子 10 g ^(先煎) 泽泻 12 g 茯苓 15 g 炙甘草 6 g 猪苓 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3				
222277						



考试级别:140/240/340/440

试题编号:017

病案(例)摘要1:

傅某,男,48岁,已婚,工人。2017年1月19日初诊。

患者平素性情急躁易怒。3天前与家人吵架后,出现头部胀痛,无呕吐,无意识障碍,遂来就诊。现症:头昏胀痛,两侧为重,面红口苦,心烦易怒,夜寐不宁,舌红苔黄,脉弦数。请与眩晕相鉴别

· 文尔· 依加工是两支,由日本	1/2 / 1/2// (1/2/)			
项目	评分标准			
中医疾病诊断	头痛			
中医证候诊断	内伤头痛-肝阳头痛			
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	以头痛为主症,诊断为头痛。平素性情急躁易怒,与家人吵架后出现头昏胀痛,两侧为重,面红口苦,心烦易怒,夜寐不宁,舌红苔黄,脉弦数,辨证为内伤头痛之肝阳头痛。(2分)恼怒伤肝,肝失条达,气郁化火,阳亢风动,而引发本病(2分)			
中医类证鉴别	头痛与眩晕可单独出现,也可同时出现。头痛之因常有外感或内伤两个方面,眩晕则以内伤为主。临床表现,头痛以疼痛为主,实证较多;而眩晕则以昏眩为主,虚证较多			
中医治法	平肝潜阳息风	2		
方剂名称	天麻钩藤饮加减	2		
药物组成、剂量及煎服法	天麻 9 g 钩藤 $12\mathrm{g^{(far)}}$ 石决明 $30\mathrm{g}$ 怀牛膝 $15\mathrm{g}$ 桑寄生 $15\mathrm{g}$ 白芍 $12\mathrm{g}$ 杜仲 $15\mathrm{g}$ 栀子 $9\mathrm{g}$ 黄芩 $9\mathrm{g}$ 夜交藤 $30\mathrm{g}$ 益母草 $15\mathrm{g}$ 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:018

病案(例)摘要1:

周某,女,42岁,已婚,演员。2016年7月25日初诊。

患者平素演出繁忙,进食不定时。3天前过于劳累后出现头晕昏蒙,视物旋转,不敢睁眼,几次差点晕倒, 胸闷恶心,嗜卧多寐,舌苔白腻,脉濡滑。

请与中风相鉴别

人马····································	(4), 成加工是两条,在自己下工作从中面分析			
项目	评分标准	分值		
中医疾病诊断	眩晕			
中医证候诊断	痰浊上蒙证	3		
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以头晕昏蒙,视物旋转为主症,诊断为眩晕。头晕昏蒙,胸闷恶心, 嗜卧多寐,舌苔白腻,脉濡滑,辨证为痰湿中阻证(2分) 饮食不节,损伤脾胃,痰浊中阻,上蒙清窍,清阳不升,而引发本病(2 分)	4		
中医类证鉴别	中风以猝然昏仆,不省人事,口舌歪斜,半身不遂,失语或不经昏仆,仅以半身不遂为特征。眩晕之甚者亦可仆倒,但无半身不遂及不省人事、口舌歪斜诸症	3		
中医治法	化痰祛湿,健脾和胃	2		
方剂名称	半夏白术天麻汤加减	2		
药物组成、剂量及煎服法	半夏 12 g 白术 12 g 天麻 9 g 砂仁 3 g ^(后下) 陈皮 6 g 茯苓 15 g 泽泻 15 g 甘草 3 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3		



考试级别:140/240/340/440

试题编号:019

病案(例)摘要1:

郑某,男,86岁,已婚,退休工人。2016年12月29日初诊。

患者头晕反复出现 10 余年,未系统诊治。今日突然昏仆,不省人事,目合口张,鼻鼾息微,手撒肢冷,汗 多,大小便自遗,肢体软瘫。急来就诊。舌痿,脉细弱。

请与痉证相鉴别

项目	评分标准	分值
 中医疾病诊断 	中风	3
 中医证候诊断 	中脏腑-脱证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以突然昏仆,不省人事,半身不遂为主症,诊断为中风。突然昏仆,不省人事,目合口张,鼻鼾息微,手撒肢冷,汗多,大小便自遗,肢体软瘫,舌痿,脉细弱,辨证为中脏腑脱证(阴竭阳亡)。(2分)正气亏耗,正不胜邪,元气衰微,阴阳欲绝而引发本病(2分)	4
中医类证鉴别	痉证以四肢抽搐、项背强直,甚至角弓反张为主症,发病时也可伴有神昏,需与中风闭证相鉴别。但痉证之神昏多出现在抽搐之后,而中风患者多在起病时即有神昏,而后可以出现抽搐。痉证抽搐时间长,中风抽搐时间短。痉证患者无半身不遂、口眼歪斜等症状	3
中医治法	回阳救阴,益气固脱	2
方剂名称	参附汤合生脉散加味	2
药物组成、剂量及煎服法	人参 12 g ^(另煎) 制附子 10 g ^(先煎) 干姜 12 g 麦门冬 15 g 五味子 9 g 山萸肉 15 g 甘草 9 g 大枣 3 枚 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:020

病案(例)摘要1:

刘某,男,58岁,已婚,公务员。2018年6月23日初诊。

患者身肿3年,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳减便溏,面色不华,神疲乏力,四肢倦怠,小便短少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓。

请与鼓胀相鉴别

文林· 成州工之前文,在日本下工九州(中四))					
项目	评分标准				
中医疾病诊断	水肿	3			
中医证候诊断	阴水-脾阳虚衰证				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以身肿为主症,诊断为水肿。身肿 3 年,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳减便溏,面色不华,神疲乏力,四肢倦怠,小便短少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓,辨证为阴水,脾阳虚衰证。(2分) 久病体虚,脾阳不振,运化无力,土不制水,而引发本病(2分)	4			
中医类证鉴别	水肿与鼓胀均可见肢体水肿,腹部膨隆。鼓胀的主症是单腹胀大, 皮色苍黄,腹壁青筋暴露,四肢多不肿,反见瘦削,后期或可伴见轻 度肢体浮肿。而水肿则头面或下肢先肿,继及全身,腹壁无青筋暴 露。鼓胀是由于肝、脾、肾功能失调,导致气滞、血瘀、水湿聚于腹 中。水肿乃肺、脾、肾三脏气化失调,而导致水液泛滥肌肤				
中医治法	健脾温阳利水	2			
方剂名称	实脾饮加减	2			
药物组成、剂量及煎服法	制附子9 g ^(先煎) 草果6 g 大腹皮15 g 厚朴6 g 白术12 g 茯苓15 g 泽泻12 g 木瓜12 g 黄芪15 g 干姜6 g 桂枝9 g 党参12 g 3 剂,水煎服。每日1 剂,早晚分服	3			



考试级别:140/240/340/440

试题编号:021

病案(例)摘要1

吴某,男,60岁,退休工人。2019年3月18日就诊。患者反复心胸憋闷疼痛3年,4天前因劳累、生气而心胸闷痛发作,同时伴有心悸,盗汗,心烦,不寐,腰膝酸软,头晕耳鸣,口干便秘,舌红少津,苔少,脉细数。

请与胃脘痛相鉴别

要求:根据_	上述摘要.	,在答题卡_	上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	胸痹	3
中医证候诊断	心肾阴虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以反复心胸憋闷疼痛为主症,辨病为胸痹。现症见心胸闷痛发作,同时伴有心悸,盗汗,心烦,不寐,腰膝酸软,头晕耳鸣,口干便秘,舌红少津,苔少,脉细数,辨证为心肾阴虚证。水不济火,虚热内灼,心失所养,血脉不畅	4
中医类证鉴别	胸痹之不典型者,其疼痛可在胃脘部,极易混淆。但胸痹以闷痛为主,为时极短,虽与饮食有关,但休息、服药常可缓解。胃脘痛与饮食相关,以胀痛为主,局部有压痛,持续时间较长,常伴有泛酸、嘈杂、嗳气、呃逆等胃部症状	3
中医治法	滋阴清火,养心和络	2
方剂名称	天王补心丹合炙甘草汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	生地 15 g 玄参 12 g 天冬 9 g 麦冬 9 g 人参 6 g ^(別煎) 炙甘草 10 g 茯苓 9 g 柏子仁 9 g 酸枣仁 9 g 五味子 6 g 远志 9 g 丹参 12 g 当归 9 g 芍药 9 g 阿胶 6 g ^(烊化) 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:022

病案(例)摘要1:

邱某,女,32岁,已婚,公务员。2019年7月3日初诊。患者近几天出现腹部疼痛,今日前来就诊。现症:腹痛绵绵,时作时止,喜温喜按,形寒肢冷,神疲乏力,气短懒言,胃纳不佳,面色无华,大便溏薄,舌淡,苔薄白,脉沉细。

请与胃痛相鉴别

更录.	根据	上米培更	在炫斯卡	上完成书面分析
マハ:	11以11占。	1. 北川山安	. 任. 令 赵 卜	1.75,00,77 00,77 01

2.1.1K/11 _ 2.16/2, E 1/4		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	腹痛	3
中医证候诊断	中虚脏寒证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以腹部疼痛为主症,辨病为腹痛。以腹痛绵绵,喜温喜按,形寒肢冷,神疲乏力,气短懒言,胃纳不佳,面色无华,大便溏薄,舌淡,苔薄白,脉沉细辨证为中虚脏寒证。病机为中阳不振,气血不足,失于温养	4
中医类证鉴别	胃痛部位在心下胃脘之处,常伴有恶心、嗳气等胃病见症,腹痛部位在胃脘以下,耻骨联合以上的部位,上述症状在腹痛中较少见	3
中医治法	温中补虚,缓急止痛	2
方剂名称	小建中汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	桂枝9g 干姜9g 党参12g 白术9g 饴糖 30 g ^(烊化) 附子9 g ^(先煎) 芍药 18 g 炙甘草 6 g 大枣6枚 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:023

病案(例)摘要2

张某,女,49岁,已婚,教师。2018年5月18日初诊。患者月经紊乱1年,经量多,色暗,有块,面色晦暗,精神萎靡,形寒肢冷,烘热汗出,腰膝酸冷,纳呆腹胀,大便溏薄,面浮肢肿,夜尿多,带下清稀,舌胖嫩,边有齿痕,苔薄白,脉沉细无力。

请与癥瘕相鉴别

更ポ	坦坦	上米培更	在答题卡	上字成土]	面分析
女/():	11以1)占	1、火厂11向一女。	. 11. 合政ト	1.75,08,77	LELL (7.1.471

久		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	绝经前后诸证	3
中医证候诊断	肾阳虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以月经紊乱及伴随症状为主症,辨病为绝经前后诸证。现症见经量多,色暗,有块,面色晦暗,精神萎靡,形寒肢冷,烘热汗出,腰膝酸冷,纳呆腹胀,大便溏薄,面浮肢肿,夜尿多,带下清稀,舌胖嫩,边有齿痕,苔薄白,脉沉细无力,辨证为肾阳虚证。命门火衰,冲任失调,脏腑失于温煦	4
中医类证鉴别	癥瘕可能出现月经过多或经断复来,或有下腹疼痛,浮肿,或带下五色,气味臭秽,或身体骤然明显消瘦等症状	3
中医治法	温肾扶阳,佐以温中健脾	2
方剂名称	右归丸合理中丸加減	2
药物组成、剂量及煎服法	制附子 6 g ^(先煎) 熟地黄 20 g 山药 12 g 山茱萸 9 g 枸杞子 12 g 菟丝子 12 g 鹿角胶 12 g 杜仲 12 g 肉桂 6 g 当归 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:024

病案(例)摘要1

郑某,女,35岁,已婚,教师。2019年3月23日初诊。患者近来脾气暴躁,易怒。1周前出现咳嗽、咳痰。 现症:咳嗽呈阵发性,表现为上气咳逆阵作,咳时面赤,痰滞咽喉而咯之难出,量少质黏,胸胁胀痛,症状 可随情绪波动而增减,舌红,舌苔薄黄少津,脉弦数。

请与喘证相鉴别

更求. 根据	上米培更	左炫斯卡	上完成书面分析
マン (・ / 1)と 7店	1. 火厂1向一女。	. 任. 令 赵 卜	1.75,08,77 ш 7,1471

> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	咳嗽	3
中医证候诊断	内伤咳嗽-肝火犯肺证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以咳嗽、咳痰为主症,辨病为咳嗽。现症见咳嗽呈阵发性,表现为上气咳逆阵作,咳时面赤,痰滞咽喉而咯之难出,量少质黏,胸胁胀痛,症状可随情绪波动而增减,舌红,舌苔薄黄少津,脉弦数,辨证为肝火犯肺证。肝郁化火,上逆侮肺	4
中医类证鉴别	咳嗽与喘证均为肺气上逆之病证,临床上也常见咳、喘并见,但咳嗽以气逆有声,咯吐痰液为主,喘证以呼吸困难,甚则不能平卧为临床 特征	3
中医治法	清肺泻肝,顺气降火	2
方剂名称	黛蛤散合黄芩泻白散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	桑白皮 12 g 地骨皮 12 g 黄芩 10 g 栀子 9 g 丹皮 9 g 青黛 6 g 海蛤壳 30 g ^(先演) 粳米 15 g 苏子 12 g 竹茹 12 g 枇杷叶 12 g 甘草 3 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:025

病案(例)摘要1

刘某,男,29岁,未婚,职员。2018年3月18日初诊。

患者胃痛病史2年,近一周出现大便血色红,黏稠,大便稀溏,有腹痛,口苦,舌红,苔黄腻,脉濡数. 请与痔疾相鉴别

更求,	根据	上沭塘更	在炫顯卡	上完成书面分析
Z/\.	4112 1744	1 1/1/11/11/12	. 1 T. 167 M/S D	1 /1 /1X 13 HT /1 /1/1

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	血证-便血	3
中医证候诊断	肠道湿热证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以大便血色红为主症辨病为便血。以便血色红,黏稠,大便稀溏,有腹痛,口苦,舌红,苔黄腻,脉濡数,辨证为肠道湿热证。病机为湿热蕴结,脉络受损,血溢肠道	4
中医类证鉴别	痔疮属外科疾病,其大便下血特点为便时或便后出血,常伴有肛门 异物感或疼痛,做肛门直肠检查时,可发现内痔或外痔,与内科所论 之便血不难鉴别	3
中医治法	清化湿热,凉血止血	2
方剂名称	地榆散合槐角丸加减	2
药物组成、剂量及煎服法	地榆 15 g 茜草 12 g 槐角 12 g 栀子 9 g 黄芩 9 g	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:026

病案(例)摘要1

吕某,男,46岁,已婚,工人。2017年6月11日初诊。患者1周前曾出差外地,3天前突发高热,次日出现皮肤,目睛发黄。现症:身目俱黄,黄色如金,皮肤瘙痒,高热口渴,胁痛腹满,烦躁齿衄,抽搐,皮肤瘀斑,舌质红绛,苔燥,脉弦滑数。

请与萎黄相鉴别

更求 相捏	上米培更	左炫斯丰	上完成书面分析
女术 化化沥	1 1/11间安	, 住, 台, 以 卜	

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	黄疸	3
中医证候诊断	阳黄-疫毒炽盛证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以皮肤,目睛发黄为主症,辨病为黄疸。现症见身目俱黄,黄色如金,皮肤瘙痒,高热口渴,胁痛腹满,烦躁抽搐,齿衄,皮肤瘀斑,舌质红绛,苔燥,脉弦滑数,辨证为疫毒炽盛证。疫毒炽盛,深入营血,内陷心肝	4
中医类证鉴别	两者均可出现身黄,但黄疸发病与感受外邪、饮食劳倦或病后有关; 其病机为湿滞脾胃,肝胆失疏,胆汁外溢;其主症为身黄、目黄、小便 黄。萎黄之病因与饥饱劳倦、食滞虫积或病后失血有关;其病机为 脾胃虚弱,气血不足,肌肤失养;其主症为肌肤萎黄不泽,目睛及小 便不黄,常伴头昏倦怠、心悸少寐、纳少便溏等症状	3
中医治法	清热解毒,凉血开窍	2
方剂名称	千金犀角散加味	2
药物组成、剂量及煎服法	水牛角 30 g ^(先順) 黄连 30 g 栀子 30 g 大黄 15 g ^(后下) 板蓝根 15 g 生地 15 g 玄参 15 g 丹皮 15 g 茵陈 15 g 土茯苓 15 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:027

病案(例)摘要1

吴某,女,53岁,已婚,干部。2017年12月18日初诊。患者近1年来,口渴引饮,能食与便溏并见,精神不振,四肢乏力,形体逐渐消瘦,舌质淡红,苔白而干,脉弱。

请与瘿病相鉴别

要求:根据上述摘要,在答品	题卡上完成书面分析	11
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	消渴	3
中医证候诊断	中消-气阴亏虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以口渴引饮,能食与便溏并见为主症,辨病为消渴。现症见精神不振,四肢乏力,形体逐渐消瘦,舌质淡红,苔白而干,脉弱,辨证为气阴亏虚证。气阴不足,脾失健运	4
中医类证鉴别	两者都可见多食易饥,消瘦症状。瘿病中气郁化火、阴虚火旺的类型,以情绪激动,多食易饥,形体日渐消瘦,心悸,眼突,颈部一侧或两侧肿大为特征。其中的多食易饥、消瘦,类似消渴病的中消,但眼球突出,颈前瘿肿有形则与消渴有别,且无消渴病的多饮、多尿、尿甜等症	3
中医治法	益气健脾,生津止渴	2
方剂名称	七味白术散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄芪 15 g 党参 12 g 白术 12 g 茯苓 12 g 怀山药 15 g 木香 6 g 藿香 12 g 葛根 15 g 天冬 6 g 麦冬 6 g 甘草 3 g	3

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服





考试级别:140/240/340/440

试题编号:028

病案摘要1:

孙某,男,47岁,已婚,工人。2019年7月24日初诊。近1个月腰痛如刺,痛有定处,痛处拒按,日轻夜重,轻则俯仰不便,重则不能转侧,舌质暗紫,有瘀斑,脉涩。患者曾有跌仆闪挫病史。请与肾痹相鉴别

要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析				
项目	评分标准	分值		
中医疾病诊断	腰痛	3		
中医证候诊断	瘀血腰痛	3		
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以腰部疼痛为主症,辨病为腰痛。以腰痛如刺,痛有定处,痛处拒按,日轻夜重,轻者俯仰不便,重则不能转侧,舌质暗紫,有瘀斑,脉涩,辨证为瘀血腰痛。病机是瘀血阻滞,经脉痹阻,不通则痛	4		
中医类证鉴别	腰痛以腰部疼痛为主。肾痹是指腰背强直弯曲,不能屈伸,行动困难而言,多由骨痹日久发展而来	3		
中医治法	活血化瘀,通络止痛	2		
方剂名称	身痛逐瘀汤加减	2		
	秦艽 12g 川芎 12g 桃仁 9g 红花 6g			

香附 9g 牛膝 12g

五灵脂 9g^(包煎)

3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服

当归 12g

地龙 6g

鸡血藤 9g

没药 6g



药物组成、剂量及煎服法

3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:029

病案(例)摘要1

何某,男,50岁,已婚,工人。2016年7月20日初诊。患者有肾病史10年。2月前自觉发热,体温并不升高。现症:午后潮热,或夜间发热,不欲近衣,手足心热,烦躁,少寐多梦,盗汗,口干咽燥,舌质红,有裂纹,苔少,脉细数。

请与外感发热相鉴别

亜ポ	相坦	上米培更	左炫斯上	上完成书面分析
女/(・	11尺1/石	1 1/11间安。	, 任, 合政 卜	

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	内伤发热	3
中医证候诊断	阴虚发热证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以自觉发热,体温并不升高为主症,辨病为内伤发热。现症见午后潮热,或夜间发热,不欲近衣,手足心热,烦躁,少寐多梦,盗汗口干咽燥,舌质红,或有裂纹,苔少甚至无苔,脉细数,辨证为阴虚发热证。阴虚阳盛,虚火内炽	4
中医类证鉴别	外感发热表现的特点是:因感受外邪而起,起病较急,病程较短,发热初期大多伴有恶寒,其恶寒得衣被而不减。发热的热度大多较高,发热的类型随病种的不同而有所差异。初起常兼有头身疼痛、鼻塞、流涕、咳嗽、脉浮等表证。外感发热多属实证	3
中医治法	滋阴清热	2
方剂名称	清骨散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	银柴胡 10 g 知母 15 g 胡黄连 10 g 地骨皮 15 g 青蒿 15 g 秦艽 15 g 鳖甲 15 g ^(先煎) 麦冬 10 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:030

病案(例)摘要1

王某,女,55岁,已婚,农民。2016年8月18日初诊。患者2天前受惊后出现自觉心中悸动不安,心搏异常,伴胸闷不舒。现症:心悸时发时止,受惊易作,胸闷烦躁,失眠多梦,口干苦,大便秘结,小便短赤,舌红,苔黄腻,脉弦滑。

请与奔豚相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	心悸	3
中医证候诊断	痰火扰心证	3
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	以心中悸动不安,心搏异常,伴胸闷不舒为主症,辨病为心悸。现症见心悸时发时止,受惊易作,胸闷烦躁,失眠多梦,口干苦,大便秘结,小便短赤,舌红,苔黄腻,脉弦滑,辨证为痰火扰心证。痰浊停聚,郁久化火,痰火扰心,心神不安	4
中医类证鉴别	奔豚发作之时,亦觉心胸躁动不安。本病与心悸的鉴别要点为:心悸为心中剧烈跳动,发自于心;奔豚乃上下冲逆,发自少腹	3
中医治法	清热化痰,宁心安神	2
方剂名称	黄连温胆汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄连9g 栀子9g 竹茹12g 半夏6g 胆南星9g 全瓜蒌15g 陈皮9g 枳实6g 远志6g 石菖蒲6g 酸枣仁15g 生龙骨30g ^(先煎) 生牡蛎30g ^(先煎) 生姜2片 3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:031

病案(例)摘要1

刘某,男,74岁,已婚,农民。2016年12月10日初诊。患者6个月前晨起后发现左侧肢体活动不利,伴饮水呛咳,于当地医院治疗。现症:左侧半身不遂,肢软无力,面色萎黄,口舌歪斜,口角流涎,舌质淡紫,有瘀斑,苔薄白,脉细涩。

请与口僻相鉴别

女小: 依加工起洞女, 在有点		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	中风	3
中医证候诊断	恢复期和后遗症期-气虚络瘀证	3
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	以半身不遂、肢软无力、口舌歪斜为主症,辨病为中风。现症见左侧半身不遂,肢软无力,面色萎黄,口舌歪斜,口角流涎,舌质淡紫,有瘀斑,苔薄白,脉细涩,辨证为气虚络瘀证。气虚血瘀,脉阻络痹	4
中医类证鉴别	口僻俗称吊线风,主要症状是口眼歪斜,但常伴耳后疼痛,口角流涎,言语不清,而无半身不遂或神志障碍等表现,多因正气不足,风邪入脉络,气血痹阻所致,不同年龄均可罹患	3
中医治法	益气养血,化瘀通络	2
方剂名称	补阳还五汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄芪 15 g 桃仁 6 g 红花 6 g 赤芍 9 g 归尾 9 g 川芎 9 g 地龙 9 g 牛膝 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:032

病案(例)摘要2

患者,徐某,男,42岁,已婚,干部。2017年9月8日初诊。患者72小时前出现右下腹痛,逐渐加重。现腹痛剧烈,高热不退,时时汗出,烦渴,恶心呕吐,腹胀,大便似痢不爽。查体:腹平坦,无胃肠型,全腹压痛,反跳痛,腹肌紧张,未触及包块,肠鸣音弱。舌红绛而干,苔黄厚干燥,脉洪数。

请与胃、十二指肠溃疡穿孔相鉴别

更录.	根据	上米培更	在炫斯卡	上完成书面分析
マハ:	11以11占。	1. 北川山安	. 任. 合. 区. 区	1.75,00,77 00,77 01

X 1. (Kall-2-1/1X) [F-1/2] [F-1/2]		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	肠痈	3
中医证候诊断	热毒证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以右下腹痛,逐渐加重为主症,辨病为肠痈。现症见腹痛剧烈, 高热不退,时时汗出,烦渴,恶心呕吐,腹胀,大便似痢不爽。查体: 腹平坦,无胃肠型,全腹压痛,反跳痛,腹肌紧张,未触及包块,肠鸣 音弱。舌红绛而干,苔黄厚干燥,脉洪数,辨证为热毒证。肠内痞 塞,气机不畅,食积痰凝,瘀结化热,热毒炽盛,渐入血分	4
中医类证鉴别	胃、十二指肠溃疡穿孔后,溢液可沿升结肠旁沟流至右下腹部,很似急性阑尾炎的转移性腹痛。但病人既往多有溃疡病史,突发上腹剧痛,迅速蔓延至全腹,除右下腹压痛外,上腹仍具疼痛和压痛,腹肌板状强直,肠鸣音消失,可出现休克。多有肝浊音界消失,X线透视或摄片多有腹腔游离气体	3
中医治法	通腑排脓,养阴清热	2
方剂名称	大黄牡丹汤合透脓散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	大黄 12 g ^(后下) 牡丹皮 10 g 桃仁 10 g 冬瓜仁 30 g 芒硝 10g ^(冲服) 当归 10 g 皂角刺 6 g 穿山甲 6 g 川芎 9 g 黄芪 15 g 生甘草 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:033

病案(例)摘要2

王某,女,38岁,干部。2017年4月6日初诊。患者半年前热水洗手后突发皮肤剧痒,后遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍反复发作。伴有口干不欲饮,纳差,腹胀。查体:皮损色暗,粗糙肥厚,对称分布。舌淡,苔白,脉弦细,月经史无异常。

请与牛皮癣相鉴别

女小: 似加工起胸女, 但有两	图下工儿风 1面升机	
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	湿疮	3
中医证候诊断	血虚风燥证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以皮肤剧痒,遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍为主症,辨病为湿疮。现症见口干不欲饮,纳差,腹胀。查体:皮损色暗,粗糙肥厚,对称分布。舌淡,苔白,脉弦细,辨证为血虚风燥证。病久耗伤阴血,血虚风燥	4
中医类证鉴别	牛皮癣好发于颈侧、肘、尾骶部,常不对称,有典型的苔藓样变,皮损倾向干燥,无多形性损害	3
中医治法	养血润肤,祛风止痒	2
方剂名称	当归饮子加减	2
药物组成、剂量及煎服法	当归 30 g 白芍 30 g 川芎 30 g 生地黄 30 g 白蒺藜 30 g 防风 12 g 荆芥穗 12 g 制首乌 30 g 白鲜皮 12 g 黄芪 30 g 蝉蜕 6 g 丹参 10 g 鸡血藤 15 g 乌梢蛇 10 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:034

病案摘要 2:

王某,女,28岁,已婚。2019年3月21日初诊。患者平素月经正常,近半年来,经前小腹疼痛而拒按,有灼热感,伴腰骶胀痛,平时少腹时痛,经来疼痛加剧,低热起伏,经色黯红,质稠有块,带下黄稠,小便短黄。末次月经:2019年3月11日,来诊室月经已净,舌红苔黄腻,脉濡数。

请与异位妊娠相鉴别

更求. 根据	上米培更	左炫斯卡	上完成书面分析
マン (・ / 1)と 7店	1. 火厂1向一女。	. 任. 合. 区. 区	1.75,08,77 ш/7,1/1/1

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	痛经	3
中医证候诊断	湿热瘀阻证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以经前小腹疼痛而拒按为主证辨病为痛经。以经前小腹疼痛而拒按,有灼热感,伴腰骶胀痛,平时少腹时痛,经来疼痛加剧,低热起伏,经色黯红,质稠有块,带下黄稠,小便短黄,舌红苔黄腻,脉濡数辨证为湿热瘀阻证。病机为外感或内蕴湿热,流注冲任,阻滞气血,经行不畅,故经来腹痛;热扰冲任,则量多色红有块;热灼津液,则经水质稠;湿热下注,伤及任带,则平日带下色黄或有秽臭。舌脉均为湿热内盛之象	4
中医类证鉴别	异位妊娠破裂多有停经史和早孕反应,妊娠试验阳性;妇科检查时,宫颈有抬举痛,腹腔内出血较多时,子宫有漂浮感;盆腔 B 超检查常可见子宫腔以外有孕囊或包块存在;后穹隆穿刺或腹腔穿刺阳性;内出血严重时,患者可出现休克表现,血红蛋白下降。痛经虽可出现剧烈的小腹痛,但无妊娠征象	3
中医治法	清热除湿,化瘀止痛	2
方剂名称	清热调血汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	当归 15 g 川芎 12 g 白芍药 9 g 生地黄 12 g 黄连 9 g 香附 9 g 败酱草 9 g 薏苡仁 9 g 延胡索 9 g 牡丹皮 9 g 莪术 6 g 红藤 6 g 桃仁 6 g 红花 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:035

病案(例)摘要2

黄某,女,19岁,未婚,学生。2017年4月6日初诊。

患者 13 岁月经初潮,初潮后月经基本正常。近 1 年来,月经紊乱,经来无期,时而出血量多,时而淋沥不尽,色淡质清,畏寒肢冷,面色晦暗,腰腿酸软,小便清长,末次月经 2017 年 3 月 21 日,至今未尽,舌质淡,苔薄白,脉沉细。

请与经期延长相鉴别

更少	坦坦	上米培更	左炫斯丰	上完成书面分析
Z/\(\(\frac{1}{2}\)	1121店	1 1/11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	. 1生合欢 ト	

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	崩漏	3
中医证候诊断	肾虚证肾阳虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以末次月经2017年3月21日,至今未尽为主症,辨病为崩漏。现症 见月经紊乱,经来无期,时而出血量多,时而淋沥不尽,色淡质清,畏 寒肢冷,面色晦暗,腰腿酸软,小便清长,舌质淡,苔薄白,脉沉细,辨 证为肾阳虚证。肾阳虚衰,阳不摄阴,封藏失司,冲任不固	4
中医类证鉴别	经期延长仅为经期的延长,月经周期和经量无明显异常表现,而崩漏不仅月经淋沥不尽,且经量、月经周期皆出现异常表现	3
中医治法	温肾固冲,止血调经	2
方剂名称	右归丸加黄芪、党参、三七	2
药物组成、剂量及煎服法	熟地黄 20 g 山药 12 g 山茱萸 9 g 枸杞子 12 g 菟丝子 12 g 鹿角胶 12 g ^(焊化) 杜仲 12 g 当归 9 g 制附子 6 g ^(先煎) 黄芪 15 g 党参 15 g 三七 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:036

病案(例)摘要2

曾某,女,3岁。2017年9月4日初诊。患儿腹泻6天。大便日行10余次,水样便。现症:精神不振,啼 哭少泪,口渴多饮,无呕吐,目眶轻度凹陷,皮肤干燥,四肢尚温,小便短少,口唇干,舌红少津,苔少,脉细数。

请与痢疾相鉴别

要求:根据上述摘要,在答题	题卡上完成书面分析	,
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	小儿泄泻	3
中医证候诊断	变证-气阴两伤证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以大便日行10余次,水样便为主症,辨病为小儿泄泻。现症见精神不振,啼哭少泪,口渴多饮,无呕吐,目眶轻度凹陷,皮肤干燥,四肢尚温,小便短少,口唇干,舌红少津,苔少,脉细数,辨证为气阴两伤证。泻下过度,伤阴耗气	4
中医类证鉴别	痢疾(细菌性痢疾)急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。 大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;大便培养有痢疾 杆菌生长	3
中医治法	益气养阴	2
方剂名称	人参乌梅汤加减	2
	人参3g(另煎) 乌梅6g 木瓜3g 山药6g 莲子6g 茯苓6g	

太子参3g 茯苓6g 生地黄6g 麦冬6g 甘草3g



药物组成、剂量及煎服法

3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:037

病案(例)摘要2

王某,女,28岁,已婚,公务员。2017年8月18日初诊。患者右下腹痛36小时,伴发热12小时。纳呆,恶心,呕吐一次,为胃内容物,二便正常,月经史无异常,末次月经8月2日。查体:体温38.4℃,右下腹压痛、反跳痛、腹皮挛急。舌红,苔黄腻,脉滑数。血常规:WBC:15×10°/L,中性粒细胞85%,尿常规正常。请与宫外孕破裂相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	肠痈	3
中医证候诊断	湿热证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以右下腹痛、发热、纳呆、恶心、呕吐一次,为胃内容物为主症,辨病为肠痈。现症见二便正常,月经史无异常,末次月经8月2日。查体:体温38.4℃,右下腹压痛、反跳痛、腹皮挛急。舌红,苔黄腻,脉滑数。血常规:WBC:15×10°/L,中性粒细胞85%,尿常规正常,辨证为湿热证。糟粕积滞,积结肠道,湿热内结,蕴酿成脓	4
中医类证鉴别	宫外孕破裂常有急性失血症状和下腹疼痛症状,有停经史,妇科检查阴道内有血液,阴道后穹隆穿刺有血等	3
中医治法	通腑泄热,解毒利湿透脓	2
方剂名称	复方大柴胡汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	柴胡 15 g 黄芩 9 g 枳壳 9 g 川楝子 6 g 大黄 9 g (^{后下)} 延胡索 9 g 白芍 9 g 蒲公英 12 g 木香 6 g 丹参 6 g 甘草 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:038

病案(例)摘要2

何某,男,42岁,已婚,干部。2017年9月10日初诊。患者便血1个月,平时嗜食辛辣。便血色鲜,量较多,血便不相混,便时痔核脱出肛门外,便后可自行回纳,肛门灼热,重坠不适。查体;肛门指检于截石位3、7、11点见光滑的团块,质软无压痛。舌苔黄腻,脉弦数。

请与肛裂相鉴别

要求:根据上述摘要	,在答题卡上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	痔-内痔	3
中医证候诊断	湿热下注证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以便血色鲜,量较多,血便不相混,便时痔核脱出肛门外,便后可自行回纳,肛门灼热,重坠不适为主症,辨病为痔。现症见肛门指检于截石位3、7、11点见光滑的团块,质软无压痛。舌苔黄腻,脉弦数,辨证为湿热下注证。脾失运化,湿自内生,湿与热结,热迫血络	4
中医类证鉴别	肛裂主要症状为便鲜血,量较少,肛门疼痛剧烈,呈周期性,多伴有便秘,局部检查可见6点或12点处肛管有梭形裂口	3
中医治法	清热利湿止血	2
方剂名称	脏连丸加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄连 12 g 生地 18 g 当归 9 g 川芎 6 g 白芍 6 g 赤芍 9 g 槐角 9 g 槐米 6 g 穿山甲 6 g 猪大肠 1 段 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:039

病案(例)摘要2

患儿,女,5岁。2017年11月3日初诊。患儿腹泻3周,病初每日泻10余次,经治疗好转。但近日大便仍清稀,色淡不臭,每日4~5次,常于食后作泻,时轻时重,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白,脉缓弱。

请与痢疾相鉴别

更录.	根据	上米培更	左炫斯卡	上完成书面分析
マハ:	TIXTIM	上上上门的一天,		1 . 71 . 11X . 13 IBI 7.1 /171

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	小儿泄泻	3
中医证候诊断	脾虚泻证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以腹泻 3 周,每日泻 10 余次为主症,辨病为小儿泄泻。现症见大便仍清稀,色淡不臭,每日 4~5 次,常于食后作泻,时轻时重,面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白,脉缓弱,辨证为脾虚泻证。脾虚湿蕴,清浊不分	4
中医类证鉴别	痢疾大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重。大便常规检查有脓细胞、 红细胞和吞噬细胞;大便培养有痢疾杆菌生长	3
中医治法	健脾益气,助运止泻	2
方剂名称	参苓白术散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	人参6 g ^(另煎) 白术9 g 茯苓9 g 山药9 g 莲子肉9 g 扁豆9 g 炒薏苡仁9 g 砂仁3 g ^(后下) 桔梗3 g 甘草3 g 3 剂,水煎服。每日1 剂,早晚分服	3





考试级别:140/240/340/440

试题编号:040

病案(例)摘要2:

李某,女,46岁,己婚。

患者近2年来月经紊乱,周期不规则,经期延长10余天,量多如崩,或少则淋漓,有时延续至下月月经来潮。诊断性刮宫病理报告是单纯性内膜增生,诊断为"功血"。平素月经正常,14岁初潮,5/34天,量适中,色红。末次月经,量少,色红,质稀,未净。伴头晕,乏力,腰酸腿软,耳鸣,寐差,形体消瘦,面色苍白。舌边有齿痕,苔薄色润,脉沉细。

请与经期延长相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	崩漏	3
中医证候诊断	肾虚证-肾气虚证	3
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	本患者主要表现为月经紊乱,经期延长,淋沥难净,本次 40 天未净,故诊断为崩漏。患者七七之年,肾气渐衰。封藏失司,冲任不固,不能制约经血,则或崩或漏,日久气血亏损,不能上荣则头晕、乏力、寐差。腰为肾之腑,肾虚则腰酸腿软。舌边有齿痕,苔薄色润,脉沉细均为肾气虚之象	4
中医类证鉴如	崩漏为月经的周期、经期及经量发生严重紊乱的疾病,表现为周期、 经期紊乱,或暴下不止,或淋沥不断。经期延长仅为经期的延长,月 经周期和经量无明显异常表现	3
中医治法	补肾益气,固冲止血	2
方剂名称	加减苁蓉菟丝子丸化裁	2
药物组成、剂量及煎服法	人参 12 g ^(另煎) 黄芪 15 g 阿胶 10 g ^(烊化) 肉苁蓉 15 g 菟丝子 15 g 覆盆子 15 g 桑寄生 15 g 熟地 20 g 枸杞子 15 g 女贞子 15 g 旱莲草 15 g 益母草 15 g 贯众炭 15 g 艾叶炭 15 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



病案(例)摘要2:

胡某,女,29岁,已婚。

患者2年前行人工流产手术,术后有正常性生活且男方精液正常,至今未孕。平素月经或先或后,经量多少不一,经前烦躁易怒,胸胁乳房胀痛,善太息,纳可,寐欠安,多梦,大便偏干。舌暗红边有瘀斑,脉弦细。

请与暗产相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	不孕症	3
中医证候诊断	肝气郁结证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者,人流术后2年,有正常性生活,且男方精液正常,至今未孕,故诊断为不孕症,且为继发性不孕。肝气郁结,气机不畅,疏泄失司,血海蓄溢失常,故月经或先或后,经量多少不一;肝失调达,气血失调,冲任不能相资,故日久不孕;肝郁气滞,血行不畅,不通则痛,故胸胁乳房胀痛,输卵管通而不畅;经前烦躁易怒,舌暗红边有瘀斑,脉弦细均为肝气郁结之证	4
中医类证鉴别	不孕症与暗产的鉴别:暗产是指早早怀孕,胚胎初结而自然流产者。此时孕妇尚无明显的妊娠反应,一般不易被觉察而误认为不孕。通过 B 超、早孕试验及病理学检查可明确诊断	3
中医治法	疏肝解郁,理血调经	2
方剂名称	开郁种玉汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	当归 15 g 白芍 12 g 茯苓 10 g 白术 10 g 丹皮 10 g 香附 10 g 天花粉 6 g 柴胡 10 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/340 试题编号:042

病案(例)摘要2:

刘某,女,30岁,已婚。

患者 25 天前行第二次剖宫产,13 天前开始恶寒、恶风、低热持续不退,体温 37 ℃~38 ℃,伴头晕、头痛、心慌、食欲差,两侧少腹绵绵作痛,曾先后使用西药抗感染和中药清热解毒治疗,疗效不显,阴道仍有少量血性分泌物,色淡质稀。舌质淡,苔薄白,脉细数。

请与蒸乳发热相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	产后发热	3
中医证候诊断	血虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者产后低热持续不退,且伴有头晕、头痛、心慌、食欲差,两侧少腹绵绵作痛,等症状,当属于产后发热。患者因产后失血伤津,阴血骤虚,阴不敛阳,虚阳外浮,故低热持续不退;血虚胞脉失养故两侧少腹绵绵作痛;阴血亏虚,清窍失养则头晕、头痛;血不养心,则心慌,气随血耗,冲任不固,则阴道仍有少量血性分泌物,色淡质稀。舌质淡,苔薄白,脉细数均为血虚之象	4
中医类证鉴别	产后发热与蒸乳发热的鉴别;二者都可以见到低热。区别在于,蒸 乳发热是产后3~4天泌乳期低热,可自然消失,俗称"蒸乳",不属于 病理范畴。产后发热是指产褥期内,出现发热持续不退,或突然高 热寒战,并伴有其他症状者;称"产后发热"	3
中医治法	补益气血	2
方剂名称	八珍汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	黄芪 15 g 人参 10 g ^(另煎) 白术 10 g 茯苓 12 g 当归 15 g 芍药 12 g 熟地黄 15 g 甘草 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:043

病案(例)摘要2:

杨某,男,25岁,已婚。

患者近两周工作繁忙,饮食不规律。昨日路边小吃铺吃饭,今晨6点觉脐部上方隐痛不适,继而脐周窜痛。现症见:疼痛固定于右下腹伴恶心,轻度发热,腹泻。无腹胀。舌质淡红,苔白腻,脉弦紧。

请与胃、十二指肠溃疡穿孔相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	肠痈	3
中医证候诊	瘀滞证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者有饮食不洁史,腹痛部位依次为上腹部,最后固定于右下腹,伴有腹泻,轻度发热,故诊断为肠痈。患者疲劳过度,饮食失节,不归正化,阻滞脾胃气机而致肠腑气滞血瘀。脾胃气机受邪干扰,运行失常,故见恶心,邪郁于肠腑,故见轻度发热。舌质淡红,苔白腻,脉弦紧均为气血瘀滞之象	4
中医类证鉴别	肠痈与胃、十二指肠溃疡穿孔的鉴别:后者病人既往有消化性溃疡病史,突发上腹剧痛,迅速蔓延至全腹,腹肌板状僵直和肠鸣音消失等腹膜刺激征象明显,X线摄片多有膈下游离气体,如诊断有困难,可行诊断性腹腔穿刺。而肠痈的临床特点是转移性右下腹疼痛,右下腹局限性压痛或拒按,伴发热等全身症状。西医的急、慢性阑尾炎,克罗恩病,溃疡性结肠炎等均属于肠痈范畴。尤以急、慢性阑尾炎最为常见	3
中医治法	行气活血,通腑泄热	2
方剂名称	大黄牡丹汤合红藤煎剂加减	21
药物组成、剂量及煎服法	生大黄 10 g 牡丹皮 12 g 桃仁 10 g 冬瓜仁 10 g 芒硝 10 g ^(神服) 败酱草 15 g 红藤 6 g 金银花 10 g 连翘 10 g 竹茹 12 g 甘草 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:044

病案(例)摘要2:

吴某,女,31岁,已婚。

患者于半年前无明显诱因出现带下增多,阴道灼热、疼痛,诊为"带下病",经治疗后症状好转。近半年来,症状反复,带下量多,色淡黄,质稀,有异味,阴痒,无阴道流血,面色比白,神疲乏力,纳少便溏,小便正常。舌淡胖,苔白,脉细滑。

请与白浊相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	带下过多	3
中医证候诊断	脾虚证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以反复白带量多伴阴痒半年余,诊为带下病。脾气虚弱,运化失司,湿邪下注,损任带,使任脉不固,带脉失约而为带下过多;脾虚气弱,中阳不振,则面色胱白,神疲乏力;脾虚失运,则纳少便溏;舌淡胖,苔白,脉细滑均为脾虚湿聚之象	4
中医类证鉴别	白浊是指尿道流出混浊如脓之物的一种疾患,而带下出自于阴道	3
中医治法	健脾益气,升阳除湿	2
方剂名称	完带汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	白术 15 g 陈皮 6 g 党参 20 g 甘草 6 g 怀山药 20 g 车前子 15 g ^(包煎) 柴胡 10 g 白芍 12 g 黑荆芥 10 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:045

病案(例)摘要2:

周某,男,2岁。

患者 13 天前开始发热,初起发热恶风,咳嗽,继则高热持续不退,最高时达 40 ℃,周身无汗,咳而微烦,面 色红赤,便干尿黄,听诊肺水泡音较密集。舌质微红,苔黄,脉数。

请与咳嗽变异型哮喘相鉴别

女小:依加工起洞女,压有风		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	肺炎喘嗽	3
中医证候诊断	风热闭肺证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者发热 13 日之久,高热不退,周身无汗,咳而微烦,听诊肺水泡音较密集,故诊断为肺炎喘嗽。此为表邪未解,肺卫不宣,病邪束表,热不得越。风寒久羁,肺气郁闭,故见咳而微烦热,热郁于内,故见面色红赤,便干尿黄。舌质微红,苔黄脉数均为风热闭肺之象。	4
中医类证鉴别	咳嗽变异型哮喘是以咳嗽为主症,咳嗽持续1个月以上,常在夜间和(或)清晨及运动后发作或加重,以干咳为主。肺部听诊无啰音。 抗生素治疗无效	3
中医治法	辛凉宣肺,化痰止咳	2
方剂名称	麻杏石甘汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	麻黄 6 g 杏仁 3 g 石膏 3 g ^(先煎) 甘草 3 g 桔梗 3 g 桔梗 3 g 淡豆豉 12 g 薄荷 6 g ^(后下) 淡竹叶 6 g 牛蒡子 5 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:046

病案(例)摘要2:

孙某,女,47岁,已婚。

患者近2月心慌,烦躁,烘热汗出,伴见乏力嗜睡。末次月经6月3日,经量较前明显减少,2天即净,经 色红,无血块。五心烦热,腰膝酸痛,口干便秘,尿少色黄。舌红少苔,脉细数。

请与癥瘕相鉴别

AN, INHERINA, ILLIAN DINAM		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	绝经前后诸证	
中医证候诊断	肾阴虚证	3
中医辨病辨证依据(舍病 因病机分析)	患者,年近半百,时近绝经前期,月经紊乱,量少,心慌,烦躁,烘热汗出等,可诊断为绝经前后诸证:绝经前后,肾阴虚冲任失调,则月经提前或先后不定。肾阴日衰,阴虚不能上荣于头目脑髓,故嗜睡;虚阳上越,故烘热汗出,五心烦热;腰为肾之府,阴虚腰失所养,故见腰膝酸痛;阴虚生内热,故见口干便秘,尿少色黄。舌红少苔,脉细数均为肾阴虚之象。	4
中医类证鉴别	绝经前后诸证与癥瘕的鉴别:二者都可以见到经量多少不定或经断 复来。区别在于,癥瘕的好发之期是经断前后的年龄,如出现月经 过多或经断复来,或有下腹疼痛,浮肿,或带下五色,气味臭秽,或身体骤然明显消瘦等症状	3
中医治法	滋养肾阴,佐以潜阳	2
方剂名称	左归饮加减	2
药物组成、剂量及煎服法	山药 15 g 熟地 12 g 山茱萸 10 g 枸杞 10 g 菟丝子 10 g 女贞子 10 g 旱莲草 10 g 制首乌 10 g 龟甲 15 g ^(先煎) 鳖甲 15 g ^(先煎) 炙甘草 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:047

病案(例)摘要2:

陈某,女,35岁,已婚。

患者 1 年前出现右侧乳房间断胀痛,可触及乳房肿块。在当地医院 B 超提示"乳腺囊性增生"。平素善郁易怒,时有胸闷、胁胀,眠不实。纳谷不香。二便尚可。舌质淡红,苔薄白,脉弦细。

请与乳岩相鉴别

女术: 依加工是洞女, 压音	医下工儿风 中国刀게	
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	乳癖	3
中医证候诊断	肝郁痰凝证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者双侧乳房均出现肿块,伴疼痛,与情绪相关,故诊断为乳癖。情志不舒,肝郁气滞,脾失健运,痰浊内生,气血瘀滞,痰凝瘀血阻于乳络,故致乳房肿块,疼痛;肝郁不舒,故胸闷胁胀,善郁易怒,眠不实;肝郁克土,脾失健运,故见纳谷不香。舌质淡红,苔薄白微腻,脉弦细均为肝郁痰阻之象	4
中医类证鉴别	乳癖与乳岩的鉴别:二者都可以见到乳房肿块。区别在于,乳岩多发生于40-60岁中老年妇女,多无疼痛,逐渐长大,肿块质地坚硬如石,表面凹凸不平,边缘不清,活动度差,后期破溃如菜花样,预后较差。乳癖是以乳房有形状大小不一的肿块,疼痛,与月经周期相关为主要表现的病证,一般预后较好	3
中医治法	疏肝解郁,化痰散结	2
方剂名称	逍遥蒌贝散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	柴胡 10 g 白芍 12 g 当归 20 g 白术 9 g 瓜蒌 20 g 贝母 10 g 法半夏 6 g 胆南星 6 g 生牡蛎 30 g ^(先煎) 茯苓 12 g 山慈菇 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:048

病案(例)摘要2:

纪某,男,4岁。

患儿身热 3 天,起病前有水痘接触史,现头角发际皆有高粱米大小之水痘,胸背部较多,大者如黄豆,小如粱米,四肢散在,微现,咳嗽,食少,肢倦无力。舌尖微红,苔薄黄,脉滑数。

请与脓疱疮相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	水痘	3
中医证候诊断	常证-邪伤肺卫证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患儿身热 3 天,起病前有水痘接触史,颜面、躯干发现水痘,符合水痘诊断。水痘时邪从口鼻而入,蕴郁于肺卫,肺卫为邪所伤,宣降失常,故见咳嗽;内藴湿热,兼感时邪,郁闭肌表,时邪夹湿透发于肌表,致水痘布露。正盛邪轻,则水痘胸背较多,四肢散在,微现,全身症状不重。结合舌脉症,辨证为邪伤肺卫证	4
中医类证鉴别	水痘与脓疱疮的鉴别:二者都可以见到疱疹。区别在于,脓疱疮多发生于炎热夏季,以头面部及肢体暴露部位多见,初起为疱疹,很快成为脓疱,疱液浑浊,疱液可培养出细菌。水痘是感受水痘时邪(水痘-带状疱疹病毒)引起的一种急性出疹性传染病,临床以发热,皮肤黏膜分批出现、同时存在瘙痒性斑丘疹、疱疹及结痂为特征,疱疹内液清亮如水,疹形椭圆如豆	3
中医治法	疏风清热,利湿解毒	2
方剂名称	银翘散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	金银花 10 g 连翘 10 g 竹叶 10 g 牛蒡子 6 g 淡豆豉 6 g 黄连 2 g 蒲公英 6 g 板蓝根 6 g 蝉衣 3 g 赤芍 6 g 六一散 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:049

病案(例)摘要2:

高某,女,25岁,己婚。

患者末次月经7月28日。9月8日患者因腹痛就诊,诊断为"胃肠炎"未作特殊处理。因患者腹痛未止,9月19日又见阴道出血,遂再次就诊。现症见阴道少量流血,色鲜红,无血块,小腹痛,头晕,精神疲倦,恶心,口干苦,胃纳少,睡眠欠佳,腰酸,无发热,二便调。查尿妊娠试验:阳性。查B超:宫内妊娠6周,先兆流产征象。舌质略红,苔微黄干,脉细滑。

请与妊娠腹痛相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	胎动不安	3
中医证候诊断	血热证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	该患者停经后先出现小腹痛,继而见阴道出血,伴腰酸。尿妊娠实验及B超提示宫内妊娠,符合胎动不安诊断。患者阴道少量流血,色鲜红,质稠,口干苦,心烦不安睡眠欠佳,证属血热。热邪侵犯冲任,内扰胎元,胎元不固,热迫血行,故妊娠期阴道下血;血为热灼,故血色鲜红;热邪内扰,胎气不安,胎系于肾,故见腰酸。口干苦,心烦不安,舌质略红,苔微黄干,脉细滑均为血热之征	4
中医类证鉴别	胎动不安是妊娠期间仅有腰酸腹痛或下腹坠胀,或伴有少量阴道出血。而妊娠腹痛是妊娠期发生小腹疼痛,并无腰酸,也无阴道流血	3
中医治法	清热滋阴,养血安胎	2
方剂名称	保阴煎加减	2
药物组成、剂量及煎服法	生地 15 g 白芍 15 g 熟地 10 g 山药 15 g 黄芩 12 g 地榆 15 g 旱莲草 15 g 续断 15 g 香附 10 g 陈皮 6 g 甘草 6 g 阿胶 10 g (##化) 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:050

病案(例)摘要2:

胡某,女,34岁,已婚。

患者 15 岁月经初潮,每次月经来潮均有小腹疼痛,尤以经行第 1 日为甚,绞痛难忍,热敷稍舒,常需口服或注射止痛药。两年前曾诊断为"子宫内膜异位症"。平素胃纳欠佳,四肢不温,经前小腹及肛门下坠,大便溏薄。舌质淡暗,苔白,脉沉细迟缓。

请与异位妊娠破裂相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	痛经	3
中医证候诊断	寒凝血瘀证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者主要表现为经行小腹疼痛,以经行第1日为甚,绞痛难忍,热敷稍舒,故诊断为痛经。患者病程较长,经行腹痛剧烈,并伴有经量多,色暗,有血块,持续7-8天,证属血瘀。舌质淡暗,苔白,脉沉细迟缓为寒象。寒凝子宫、冲任,血行不畅,"不通则痛",故经期小腹疼痛,寒得热化,瘀滞暂通,故热敷稍舒;寒邪内盛,阻遏阳气故四肢不温;大便溏薄为阳虚之象。舌质淡暗,苔白,脉沉细迟缓均为寒凝血瘀之象	4
中医类证鉴别	异位妊娠破裂多有停经史和早孕反应,妊娠试验阳性;妇科检查时,宫颈有抬举痛,腹腔内出血较多时,子宫有漂浮感;盆腔 B 超检查常可见子宫腔以外有孕囊或包块存在;后穹隆穿刺或腹腔穿刺阳性;内出血严重时,患者可出现休克表现,血红蛋白下降。痛经虽可出现剧烈的小腹痛,但无妊娠征象	3
中医治法	温经暖宫,化瘀止痛	2
方剂名称	少腹逐瘀汤加减	2
药物组成、剂量及煎服法	小茴香 10 g 干姜 6 g 延胡索 15 g 当归 12 g 川芎 10 g 肉桂 10 g 赤芍 12 g 白芍 10 g 五灵脂 10 g ^(包煎) 炒白术 20 g 鸡内金 10 g 党参 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



病案摘要 2:

李某,男,2岁。

患儿3天前因着凉出现咳嗽,未予治疗。后出现壮热、咳嗽前来就诊。症见壮热烦躁,咳嗽喘憋,气促鼻扇,伴有喉间痰鸣,痰稠色黄,口唇紫绀,体温达39.8℃,肺部湿罗音明显。舌红苔黄,脉滑数。请与咳嗽变异型哮喘相鉴别

文 为"依加工之洞女,压占心						
项目	评分标准					
中医疾病诊断	肺炎喘嗽	3				
中医证候诊断	常证-痰热闭肺证	3				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者因着凉出现咳嗽,后出现壮热、咳嗽前来就诊,故诊断为肺炎喘嗽。症见壮热烦躁,咳嗽喘憋,气促鼻扇,伴有喉间痰鸣,痰稠色黄,舌红苔黄,脉滑数,证属痰热闭肺。痰热闭肺临床以发热、咳嗽、痰壅、气急、鼻扇为特征,重者肺气闭塞可致气滞血瘀,见口唇紫绀					
中医类证鉴别	咳嗽变异型哮喘是以咳嗽为主症,咳嗽持续1个月以上,常在夜间和(或)清晨及运动后发作或加重,以干咳为主。肺部听诊无啰音。 抗生素治疗无效	3				
中医治法	清热涤痰,宣肺降逆	2				
方剂名称 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减						
药物组成、剂量及煎服法	麻黄 9g 苦杏仁 9g 生石膏 15g ^(先煎) 甘草 6g 葶苈子 9g 紫苏子 9g 前胡 6g 黄芩 6g 百部 6g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3				





考试级别:140/240/340/440

试题编号:052

病案(例)摘要2:

张某,女,3个月。

患儿近2日出现大便溏稀,日行四、五次,夹有乳凝块,气味酸臭,腹痛胀满嗳气酸馊,矢气颇多,啼哭不安。苔厚腻,脉滑实。

请与细菌性痢疾相鉴别

~, r.		
项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	小儿泄泻	3
中医证候诊断	常证-伤食泻证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患儿主要表现为大便溏稀,日行四、五次,符合泄泻的诊断。乳食不节,损伤脾胃,健运失司,食积中焦,故见以上诸症。腹痛胀满,嗳气酸馊,矢气颇多,啼哭不安,苔厚腻,为伤食之征。故辨证应为伤食泻	4
中医类证鉴别	小儿泄泻与细菌性痢疾的鉴别:后者急性起病,便次颇多,便稀,有黏液脓血,腹痛明显,里急后重。大便常规检查脓细胞、红细胞多,可找到吞噬细胞;粪便培养有痢疾杆菌生长。泄泻是由多种病因引起的以大便次数增多和性状变稀为特点的疾病,分为感染性腹泻和非感染性腹泻	3
中医治法	和胃止泻,消食化滞	2
方剂名称	保和丸加減	2
药物组成、剂量及煎服法	炒麦芽 10 g 炒山楂 10 g 煨葛根 6 g 莱菔子 6 g 茯苓 6 g 陈皮 3 g 木香 3 g 连翘 3 g 神曲 6 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:053

病案摘要 2:

张某,女,27岁,已婚。2018年5月23日初诊。

患者 15 岁月经初潮,初潮后月经量长期偏多。近半年来,月经紊乱,经来无期,时而出血量多,时而淋沥不尽,血色淡而质薄,气短神疲,面色胱白,手足不温,末次月经 2018 年 5 月 10 日,至今未尽,舌淡,苔薄白,脉弱。

请与经期延长相鉴别

项目	评分标准					
中医疾病诊断	崩漏	3				
中医证候诊断	牌虚证					
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者月经初潮后经量长期偏多。近半年来,月经紊乱,经来无期,时 而出血量多,时而淋沥不尽,故诊断为崩漏。症见血色淡而质薄,气 短神疲,面色;此白,手足不温,舌淡,苔薄白,脉弱,证属脾虚证。脾 虚固摄失司,故长期月经量偏多;脾虚运化无权,气血生化乏源,无 以温养机体,故气短神疲,面色;光白,手足不温,舌淡,苔薄白,脉弱					
中医类证鉴别	经期延长仅为经期的延长,月经周期和经量无明显异常表现,而崩漏不仅月经淋沥不尽,且经量、月经周期皆出现异常表现					
中医治法	补气升阳,止血调经	2				
方剂名称	固本止崩汤加减					
药物组成、剂量及煎服法	黄芪 15 g 人参 9 g 升麻 6 g 白术 9 g 生龙骨 15 g (^{先煎)} 生牡蛎 15 g (先煎) 海螵蛸 15 g 荆芥炭 10 g 炮姜炭 6 g 熟地黄 15 g 白芍 9 g 茜草 9 g 灸甘草 6 g 3 剂,水煎服。每月 1 剂,早晚分服	3				



考试级别:140/340 试题编号:054

病案摘要 2:

胡某,女,21岁,学生。2018年4月15日初诊。患者平素月经正常,近一年来,经血非时而下,量少淋沥,血色鲜红而质稠,心烦潮热,小便黄赤,大便干燥。末次月经:2018年3月30日,来诊室月经已净,舌红,少苔,脉细数。

请与经期延长相鉴别

文外: 依加工是洞女, 压音	31-11-11-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10					
项目	评分标准					
中医疾病诊断	崩漏	3				
中医证候诊断	血热-虚热证	3				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	以经血非时而下为主证辨病为崩漏。经血量少淋沥,血色鲜红而质稠,心烦潮热,小便黄赤,大便干燥。舌红,少苔,脉细数,辨证为虚热证。热伤冲任,迫血妄行,故经血非时而下					
中医类证鉴别	经期延长仅为经期的延长,月经周期和经量无明显异常表现。而崩漏为月经的周期、经期及经量发生了严重紊乱的疾病,表现为周期、经期紊乱,或暴下不止,或淋沥不断					
中医治法	养阴清热,固冲止血	2				
方剂名称	上下相资汤加减	2				
熟地黄 15 g 山茱萸 12 g 人参 10 g ^(另煎) 玄参 10 g 沙参 12 g 当归 9 g 麦冬 12 g 北五味子 9 g 茜草 10 g 仙鹤草 15 g 乌贼骨 15 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服						





考试级别:140/340 试题编号:055

病案摘要 2:

于某,男,3岁。2018年12月10日初诊。

患者于1天前开始恶寒、发热,咳嗽,现症:无汗,鼻流清涕,咳嗽气促痰鸣,痰稀色白,听诊肺部水泡音,体温达38.5℃,舌淡红,苔薄白,脉浮紧,指纹浮红。

请与咳嗽变异型哮喘相鉴别

31.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00					
项目	评分标准				
中医疾病诊断	肺炎喘嗽	3			
中医证候诊断	常证-风寒闭肺证	3			
以恶寒、发热,咳嗽气促痰鸣为主症,辨病为肺炎喘嗽。无汗,鼻流中医辨病辨证依据(含病 清涕,咳嗽气促痰鸣,痰稀色白,听诊肺部水泡音,舌淡红,苔薄白, 脉浮紧,指纹浮红。辨证为风寒闭肺证。 风寒之邪外袭于肺,而致肺气郁闭,肺气失宣					
咳嗽变异型哮喘以咳嗽为主症,咳嗽持续1个月以上,常反复之中医类证鉴别 多有过敏史,夜间和(或)清晨及运动后发作或加重,以干咳肺部听诊无啰音。抗生素治疗无效					
中医治法	辛温宣肺,化痰止咳	2			
方剂名称	方剂名称 华盖散加味				
麻黄 6 g 苦杏仁 5 g 甘草 3 g 荆芥 6 g 防风 3 g 药物组成、剂量及煎服法 前胡 6 g 苏叶 3 g 桔梗 3 g 生姜 3 g 大枣 3 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服					





考试级别:140/240/340/440

试题编号:056

病案(例)摘要2:

孙某,男,35岁,已婚,教师。

患者 10 天前食用海鲜后出现全身泛发丘疹水疱,搔抓渗液,伴有剧烈瘙痒,近 5 天症状加重。现症见:全身泛发红斑,丘疹,水疱,糜烂,渗液,并散在脓疱,皮损边界不清,伴剧烈瘙痒。胸闷纳呆,口苦,大便干,小便赤少。舌红苔薄黄,脉滑数。患者既往有海鲜过敏史。查体:头面颈部未见异常,心肺腹(-)。请与接触性皮炎相鉴别

项目	评分标准					
 中医疾病诊断 	湿疮					
中医证候诊断	湿热蕴肤证	3				
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	患者以食用过敏食物后出现全身泛发丘疹水疱,搔抓渗液,伴有剧 烈瘙痒等为主症,故诊为湿疮。患者禀赋不耐,又因食用荤腥动风 之品,致脾失健运,湿热内生,复感风邪,郁于肌腠而发病。湿阻气 机,气失条达,故见胸闷纳呆;湿热内蕴,故见口苦,大便干,小便赤 少;舌红苔薄黄,脉滑数为湿热之象					
中医类证鉴别	湿疮(急性)与接触性皮炎相鉴别:接触性皮炎有接触过敏物的病 史,常见于暴露部位和接触部位,皮疹以红斑、大疱、水疱为主,皮疹 较单一,边界清楚,祛除病因后很易痊愈,不复发。而湿疮(急性)病 因常不明确,发病部位不固定,常对称发生,皮疹为多形性,丘疹、疱疹等边界不清,瘙痒剧烈,常有复发倾向					
中医治法	中医治法					
方剂名称 龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤加减						



考试级别:140/240/340/440

试题编号:057

病案(例)摘要2:

周某,男,6岁,2018年12月12日初诊。

患儿腹泻 1 个半月。1 个半月前因饮食过饱而出现腹泻,每日 10 余次,经治疗好转,但目前大便仍清稀, 色淡无味,每日 4~5 次,常于食后作泻,时轻时重,面色萎黄,不思饮食,神疲易困,舌淡苔白,脉细弱。 请与痢疾(细菌性痢疾)鉴别

X.W. INMEDIAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO						
项目	评分标准	分值				
中医疾病诊断	小儿泄泻					
中医证候诊断	常证-脾虚泻证					
中医辨病辨证依据(含病因病机分析)	患儿主要表现为大便清稀,色淡无味,每日4~5次,常于食后作泻,时轻时重,故诊断为小儿泄泻。脾虚湿失于运化,使水谷精微从肠道而下,而见泄泻。患儿面色萎黄,不思饮食,神疲易困,舌淡苔白,脉细弱,辨证为脾虚泻证。					
中医类证鉴别	痢疾(细菌性痢疾),急性起病,大便为黏液脓血便,腹痛,里急后重, 医类证鉴别 大便常规检查脓细胞增多,可找到吞噬细胞,大便培养有痢疾杆菌 生长。					
中医治法	健脾益气,助运止泻	2				
方剂名称	参苓白术散加减	2				
药物组成、剂量及煎服法	人参6g 茯苓3g 白术3g 扁豆5g 莲子肉5g 甘草3g 山药6g 砂仁3g ^(后下) 薏苡仁3g 3剂,水煎服。每日1剂,早晚分服	3				



病案(例)摘要2:

周某,女,44岁,已婚。

患者 2016 年 12 月 1 日初诊。患者 13 岁月经初潮,月经周期 28 天,行经期 7 天,月经量中等,痛经(+)。5 年前开始月经量明显增多,月经 10 余天方净,末次月经 2016 年 11 月 8 日,量多,夹有血块,伴口干不欲饮。1 周前妇科检查:子宫增大,腹部包块,坚硬不移,痛而拒按。B 超:子宫前壁可见 7 cm×6 cm×5 cm强回声区,宫体 12 cm×11 cm×9 cm,现见面色晦暗,肌肤不润。舌暗红边有瘀点,苔薄白,脉沉涩。请与妊娠子宫相鉴别

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	癥瘕	3
中医证候诊断	血瘀证	3
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	血瘀不行,气机被阻,积结成癥瘕,故包块坚硬不移,痛而拒按;脉络不通,血运关愈,上不荣面,外不荣肌肤,故面色晦暗,肌肤不润;瘀血内阻,冲任失调,故月经量多且夹有血块,瘀血内阻,不通则痛,故见痛经;津液不能上承,故见口干不欲饮。舌暗红边有瘀点,苔薄白,脉沉涩为血瘀之象	4
中医类证鉴别	癥瘕与妊娠子宫相鉴别:妊娠子宫者,有停经史,子宫大小与停经月份相符,肿块在下腹中央,质地较软,形态规则,妊娠试验阳性。癥瘕指患者下腹胞中有结块,伴有或胀,或痛,或满,甚或出血者	3
中医治法	活血散结,破瘀消癥	2
方剂名称	桂枝茯苓丸加减	2
药物组成、剂量及煎服法	牡丹皮 12 g 桂枝 12 g 茯苓 10 g 赤芍 15 g 桃仁 15 g 醋三棱 12 g 醋莪术 12 g 红花 10 g 甘草 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服	3



考试级别:140/240/340/440

试题编号:059

病案摘要1:

史某,女,34岁,已婚。2018年12月22日初诊。

平素忧愁、焦虑、经常失眠多梦。现症:精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,时时欠伸, 舌淡,脉弦。

请与癫证相鉴别

文(V.) [K加工之间文 , 压口之] 工 / [M V M					
项目	评分标准				
中医疾病诊断	郁证				
中医证候诊断	心神失养证(脏躁)				
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以精神恍惚,心神不宁为主症,诊断为郁证。 精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,悲忧善哭,喜怒无常,时时欠伸,舌 淡,脉弦。辨证为心神失养证。 营阴暗耗,心神失养				
中医类证鉴别	脏躁多发于青中年妇女,在精神因素的刺激下呈间歇性发作,不发作时可如常人。癫证则多发于青壮年,男女发病率无显著差别,病程迁延,心神失常的症状极少自行缓解				
中医治法	甘润缓急,养心安神				
方剂名称	甘麦大枣汤加减				
甘草 10 g 小麦 15 g 大枣 6 g 郁金 10 g 莲子 10 g 合欢花 9 g 当归 10 g 生地黄 15 g 炒酸枣仁 15 g 柏子仁 12 g 茯神 12 g 钩藤 12 g ^(后下) 生姜 9 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服		3			





考试级别:140/240/340/440

试题编号:060

病案摘要 2:

韩某,男,39岁,已婚。2018年3月18日初诊。

平素喜食辣椒,嗜好喝酒,并有便秘史。现症:大便带血、滴血,色鲜红,大便秘结,伴有肛门瘙痒,舌红, 苔薄黄,脉数。肛门指诊检查可触及柔软、表面光滑、无压痛的黏膜隆起。

请与肛乳头肥大相鉴别

项目	评分标准				
中医疾病诊断	痔-内痔	3			
中医证候诊断	风热肠燥证	3			
中医辨病辨证依据(含病 因病机分析)	患者以大便带血、滴血为主症,肛门指诊检查可触及柔软、表面光滑、无压痛的黏膜隆起,诊断为内痔。 便带血、滴血,色鲜红,大便秘结,伴有肛门瘙痒,舌红,苔薄黄,脉数。辨证为风热肠燥证。 热伤肠络,血不循经,下溢则便血				
中医类证鉴别	肛乳头肥大呈锥形或鼓槌状,灰白色,表面为上皮,一般无便血,常 有疼痛或肛门坠胀,过度肥大者,便后可脱出于肛门外				
中医治法	清热凉血祛风				
方剂名称	凉血地黄汤加减				
生地黄 15 g 当归 12 g 地榆 12 g 槐角 12 g 黄连 6 g 药物组成、剂量及煎服法 天花粉 15 g 生甘草 5 g 升麻 12 g 赤芍 12 g 枳壳 15 g 黄芩 10 g 荆芥炭 12 g 3 剂,水煎服。每日 1 剂,早晚分服		3			





第二站基本操作标准考试题库

站次	具体规定学历 (中医执业、助理)				师承或确有专长 (中医执业、助理)			
	考试内容	分数	考试方法	时间	考试内容	分数	考试方法	时间
	中医操作	10	实际操作		中医操作	10	实际操作	
第二站	中医操作	10	实际操作	20	中医操作	10	实际操作	
	病史采集	10	现场口述	20	病史采集	10	现场口述	20
	中医临床 答辩	5	现场口述	9	中医临床 答辩	5	现场口述	





考试级别:140/240/340/440

必考题:脉诊的操作。(10分)

答案与评分要点:

(1)患者体位:诊脉时患者应取正坐位或仰卧位,前臂自然向前平展,与心脏置于同一水平,手腕伸直,手掌向上,手指微微弯曲,在腕关节下面垫一松软的脉枕,使寸口部位充分伸展,局部气血畅通,便于诊察脉象。



- (2) 医生指法,诊脉指法主要包括选指、布指、运指三部分。
- 1)选指:医生用左手或右手的食指、中指和无名指三个手指指目诊察。指目是指尖和指腹交界棱起之处,是手指触觉较灵敏的部位。诊脉者的手指指端要平齐,即三指平齐,手指略呈弓形,与受诊者体表约呈45°为宜,这样的角度可以使指目紧贴于脉搏搏动处。
- 2) 布指:中指定关。医生先以中指按在掌后高骨内侧动脉处,然后食指按在关前(腕侧)定寸,无名指按在关后(肘侧)定尺。布指的疏密要与患者手臂长短与医生手指粗细相适应,如患者的手臂长或医者的手指较细,布指宜疏,反之宜密。定寸时可选取太渊穴所在位置(腕横纹上),定尺时可考虑按寸到关的距离确定关到尺的长度以明确尺的位置。寸关尺不是一个点,而是一段脉管的诊察范围。
- 3)运指:医生运用指力的轻重、挪移及布指变化以体察脉象。常用的指法有举、按、寻、循、总按和单诊等,注意诊察患者的脉位(浮沉、长短)、脉次(至数、均匀度)、脉形(大小、软硬、紧张度等)、脉势(强弱、流利度等)及左右手寸关尺各部表现。
- (3)平息:医生在诊脉时注意调匀呼吸,即所谓"平息"。一方面医生保持呼吸调匀,清心宁神,可以自己的呼吸计算患者的脉搏至数:另一方面,平息有利于医生思想集中,可以仔细地辨别脉象。
- (4)切脉时间:一般每次诊脉每手应不少于1分钟,两手以3分钟左右为宜。诊脉时应注意每次诊脉的时间至少应在五十动,一则有利于仔细辨别脉象变化,再则切脉时初按和久按的指感有可能不同,对临床辨证有一定意义,所以切脉的时间要适当长些。
- (5)报告脉象:脉象正常,一息四至五次,不浮不沉,不大不小,从容和缓,柔和有力。寸、关、尺三部均触, 沉取不绝。






考试级别:140/240/340/440

试题编号:001

试题一: 叙述并指出丰隆、秩边的定位, 叙述并演示亳针捻转法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1. 丰隆: 在小腿外侧, 外踝尖上 8寸, 胫骨前肌外缘。(2分)
- 2. 秩边: 平第4 骶后孔, 骶正中嵴旁开3寸。(2分)
- 3.毫针捻转法的操作:





- (3)进针,刺入到一定深度。(1分)
- (4)针身向前向后的持续均匀捻转。(1分)
- (5)保持针身在腧穴基点上左右旋转运动。(1分)
- (6)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)







秩边 捻转

试题二:陈某,男,68岁,退休。消瘦1年,伴多食、多饮、多尿、乏力。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:体重下降了多少?每天饮水量是多少?每天吃多少?上述症状持续的时间,有无规律?
- (2)伴随症状:是否伴有汗出?是否伴有尿次、尿量增多?夜尿是否频多?尿是否有特殊气味?大便情况如何?有无乏力?是否伴有心慌心悸?口舌是否干燥?睡眠情况如何?
- (3)诊疗经过:是否测过空腹血糖、OGTT 和糖化血红蛋白?是否确诊糖尿病?是否服用降糖药物?如服了,是何种药物?使用剂量和方法?效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:偏头痛的主穴和配穴。(5分)

答案与评分要点:

1.主穴:百会、风池、太冲、内关。(3分)

2.配穴:肝阳上亢配行间、侠溪、太溪;痰湿中阻配头维、中脘、丰隆;高血压配曲池、足三里;颈源性眩晕配风府、天柱、颈夹脊。(2分,回答两项即满分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:002

试题一:叙述并指出公孙、膈俞的定位,叙述并演示亳针捻转补法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.公孙:在跖区,第1跖骨底的前下缘赤白肉际处。(2分)
- 2.膈俞:在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。(2分)
- 3.亳针捻转补法的操作:
- (1)选择适宜毫针,常规消毒用具,选择适宜体位,充分暴露针刺部位。(1分)







公孙

捻转补法

- (2)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。(1分)
- (3)进针,行针得气。(1分)
- (4) 捻转角度小,频率慢,用力轻,结合拇指向前、食指向后(左转)用力为主。(1分)
- (5) 反复捻转,相对操作时间短。(1分)。
- (6)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)

试题二:吴某,男,72岁,农民。间断心悸眩晕2年,近半年加重伴下肢水肿。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间,程度:间断心悸眩晕发作的频率?近半年加重有无诱发因素?水肿是指凹性还是非指凹性?下肢水肿起病的缓急?
- (2)伴随症状:是否伴有咳嗽喘息?是否有脘腹胀闷?是否伴有胸闷胸痛?是否口渴喜饮?有无形寒肢冷?小便量是否减少?
- (3)诊疗经过:是否做过心功能等相关检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:胸痹与胃痛的鉴别。(5分)

答案与评分要点:

心在脘上, 脘在心下, 故有胃脘当心而痛之称, 以其部位相近。胸痹之不典型者其疼痛可在胃脘部, 极易混淆。但胸痹以闷痛为主, 为时极短, 虽与饮食有关, 但休息、服药常可缓解。胃脘痛与饮食相关, 以胀痛为主, 局部有压痛, 持续时间较长, 常伴有泛酸、嘈杂、嗳气、呃逆等胃部症状。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:003

试题一:叙述并指出三阴交、神门的定位,叙述并演示毫针提插泻法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.三阴交:在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际。(2分)
- 2.神门:在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。(2分)







- 3. 毫针提插泻法的操作:
- (1)选择适宜毫针,常规消毒用具。选择适宜体位,充分暴露针 三朋交 刺部位。(1分)
- (2)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。进针,行针得气。(1分)
- (3)先深后浅,轻插重提(针下插时速度宜慢,用力宜轻;提针时速度宜快,用力宜重),提插幅度大,频率快。(2分)
- (4) 反复操作。相对操作时间长。(1分)
- (5)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)

试题二:王某,女,39岁,白领。近期白带异常前来就诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间,程度:带下量是多还是少?质地清稀如水,还是黏稠如脓,或是豆渣状或凝乳状?颜色是白色、黄色还是五色杂下?气味是否异常?是否有鱼腥臭味?有无经期、产后余血未净,或不禁房事,或妇科手术后感染邪毒病史?
- (2)伴随症状:是否伴有发热?是否伴腹痛?是否有阴部瘙痒、灼热、疼痛?有无尿频、尿痛?有无面色白或萎黄,四肢倦怠?是否头晕耳鸣,五心烦热,咽干口燥?有无腰酸,畏寒肢冷,小腹冷?大小便情况如何?
- (3)诊疗经过:是否进行过妇科检查?是否做过白带检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:为什么说"胃以通为用"。(5分)

答案与评分要点:

胃属于六腑之一。六腑的共同生理特点是传化水谷,泻而不藏,以通为用。胃的生理功能是受纳腐熟水谷,主通降,以降为和。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:004

试题一:叙述并指出地机、期门的定位,叙述并演示指按法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.地机:在小腿内侧,阴陵泉下3寸,胫骨内侧缘后际。(2分)
- 2.期门:在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。(2分)
- 3.指按法的操作,
- (1) 嘱患者选合适体位。(1分)





- (1) 烟思有远行迫评位。(1分) (2) 医者以拇指螺纹面着力干施术部位, 余四指张开, 置干相应位置以支撑助力, 腕关节屈曲 40°~60°。
- (2分)
- (3)拇指主动用力,垂直向下按压。(1分)
- (4)当按压力达到所需的力度后,要稍停片刻,然后松劲撤力,再做重复按压,使按压动作既平稳又有节奏性。(2分)

试题二:王某,男,58岁,干部。1日前与人争吵后突然倒地,发生口眼歪斜。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间,程度:口眼歪斜持续的时间,有无规律?有无诱发因素,如情绪波动、受凉等因素?
- (2)伴随症状:发病之前有无头晕、头痛、肢体一侧麻木等先兆症状?有无一侧肢体的偏瘫?有无意识丧失?是否手足麻木?有无口角流涎,舌头向一侧偏歪,舌强语谵?有无手足拘挛,关节酸痛?有无耳后疼痛?有无大汗淋漓,目闭口开,手撒遗尿?有无手足厥冷?
- (3) 诊疗经过:是否进行过头颅 CT 检查? 是否检查过血常规? 是否确诊? 是否治疗,怎样治疗,效果如何? 应用何种药物?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?是否有高血压病史?是否有高脂血症?是否有心脏病?是否有糖尿病?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:项背痛、恶寒发热的主穴、配穴。(5分)

答案与评分要点:

根据患者以项背痛为主症,可诊断为落枕;伴有恶寒发热等表证,辨证为风寒袭络证。(1分) 主穴;外劳宫、天柱、阿是穴。(2分)

配穴:病在督脉、太阳经配后溪、昆仑:病在少阳经配外关、肩井;风寒袭络配风池、合谷。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:005

试题一:叙述并指出血海、膻中的定位,叙述并演示夹持进针法的操作。(10分)

答案与评分要点:

1.血海:选择两种取穴方法之一即可。(2分)

方法一:在股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处。

方法二:简便取穴法:患者屈膝,医者以左手掌心按于患者右膝髌骨上缘,第2至5指向上伸直,拇指约呈45。斜置,拇指尖下是穴。对侧取法仿此。







2.膻中:在胸部,平第4肋间隙,前正中线上。(2分)

- 3.夹持进针法的操作:
- (1)选择适宜毫针,常规消毒。选择适宜体位,充分暴露针刺部位。(1分)
- (2)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。(1分)
- (3)持针:押手拇、食指持消毒干棉球裹住针身下段,以针尖端露出 0.3~0.5cm 为宜。刺手拇、食、中三指指腹夹持针柄,使针身垂直。(2分)
- (4)刺入:将针尖固定在所刺腧穴的皮肤表面;刺手捻转针柄,押手下压,双手配合,同时用力,迅速将针刺入腧穴皮下。(1分)
- (5)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)

试题二:刘某,女,34岁,老师。近三天失眠加重,伴心悸、盗汗。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间,程度:患者是人睡困难,寐而易醒,还是醒后不能再寐,甚则是彻夜不寐?发病的时间? 有无诱发因素?
- (2)伴随症状:是否伴有心烦、多梦?有无腰膝酸软、五心烦热?有无头晕耳鸣?有无咽干少津?有无心悸心慌?食欲如何?二便是否正常?既往月经是否规律?目前月经周期、行经期、经量色质是否正常?
- (3)诊疗经过:是否做过相关检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.其他病史:既往史、个人史、家族史、过敏史有无异常?
- 3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:小儿肺炎喘嗽的病因病机。(5分)

答案与评分要点:

外因为感受风邪,或由其他疾病传变而来(2分);内因为小儿肺脏娇嫩,卫外不固(2分)。外感风邪,由口鼻或皮毛而人,侵犯肺卫,致肺失清肃,闭郁不宣,化热灼津,炼液成痰,阻于气道,肃降无权,从而出现咳嗽、气促、痰壅、鼻扇、发热等肺气郁闭的证候,发为肺炎喘嗽。(1分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:006

试题一:叙述并指出神门、中脘,并演示回旋灸的操作。(10分)

答案与评分要点,

- 1.神门,在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧
- 2.中脘:在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。(2分)
- 3.回旋灸的操作.
- (1)选择艾条,线香,点火器,灰烬清理用具。选取适宜体位,充 分暴露待灸腧穴。(1分)





- (2)点燃艾卷:选用艾卷,将其一端点燃。(1分)
- (3) 术者手持艾条的中上部,将艾卷燃烧端对准施灸部位,与施灸部位的皮肤保持相对固定的距离(一般 在 3cm 左右),左右平行移动或旋转施灸。反复操作,动作要均匀。(2分)
- (4) 灸至局部皮肤出现红晕,有温热感而无灼痛为度(一般灸 5~10 分钟)。
- (5) 灸毕熄灭艾火,清理灰烬。(1分)

试题二:田某,男,73岁,退休。一周前咳嗽、咽痛、咳吐黄痰。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间, 程度: 咳嗽、咽痛、咳吐黄痰起病的缓急?咳嗽的时间、程度?有无诱发因素?咽痛的程 度? 咳吐黄痰的量? 咳痰难易程度? 痰中是否有脓血? 是否有气味?
- (2)伴随症状,是否伴有恶寒,发热。有无鼻流黄涕。有无胸闷。是否口渴喜饮。是否伴有胁肋胀痛、心 烦易怒?
- (3) 诊疗经过: 是否做过胸部 X 线检查? 是否确诊? 有无治疗, 怎样治疗, 效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:崩漏的治疗原则和治崩三法。(5分)

答案与评分要点:

治疗原则是急则治其标,缓则治其本。(2分)

治崩三法:塞流、澄源、复旧。(3分)




考试级别:140/240/340/440

试题编号:007

试题一:叙述并指出膈俞、阳陵泉的定位,用三棱针在耳尖取血的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.膈俞:在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。(2分)
- 2.阳陵泉:在小腿外侧,腓骨头前下方凹陷中。(2分)
- 3.三棱针在耳尖取血的操作:







阳陵泉



(2)用手指柔和推、揉、挤、捋,使耳尖充血。耳尖皮肤常规消毒。(1分)

- (3) 术者戴消毒手套。一手固定耳尖,另一手持针,露出针尖 3~5mm,对准耳尖快速刺入,迅速出针。一般刺入 2~3mm。(3分)
- (4)轻轻挤压针孔周围,使出血少许用消毒干棉球按压针孔或贴敷创可贴。(1分)

试题二:方某.男.43岁.工人。下肢肌肉萎缩,腰膝酸痛2年。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间,程度:肌肉萎缩的程度?有无其他诱发因素?持续的时间?是否进行性加重?腰膝酸痛的程度?是否跟劳累有关?
- (2)伴随症状:是否伴有肢体关节疼痛重着麻木?肢体是否变形?有无一侧肢体偏瘫?是否伴有口眼歪斜?是否眩晕耳鸣?有无遗精或遗尿?有无口舌干燥?
- (3) 诊疗经过:是否进行过检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:肩关节的功能锻炼。(5分)

答案与评分要点:

肩周炎患者,肩关节配合练功活动,主要包括上肢外展、上举、内旋、外旋、前屈、后伸、环转等运动,做"内外运旋""叉手托上""手拉滑车""手指爬墙""体后拉手"等动作。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:008

试题一:叙述并指出听宫、关元,并演示指切进针法的操作。(10分)

答案与评分要点,

- 1.听宫:在面部.耳屏正中与下颌骨髁状突之间的凹陷中(2分)
- 2.关元:在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。(2分)
- 3.指切进针法的操作:
- (1)选择适宜的毫针,常规消毒用具。选择适宜舒适的体位,充 分暴露针刺部位。(1分)







关元

指切进针法

- (2)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。(1分)
- (3)押手固定拟针刺部位皮肤:押手拇指或食指指甲切掐固定拟针刺处皮肤。(1分)
- (4)刺手拇、食、中指指腹夹持针柄:将针身紧贴押手指甲缘快速刺入。(1分)
- (5)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)
- (6)适官于短针进针。(1分)

试题二:唐某,男,34岁,商人。头胀痛,急躁易怒1年。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间,程度:头痛的部位是在巅顶还是两侧,是前额连眉棱骨疼痛,还是后头部连及项部?发 作有无规律? 胀痛是阵发性还是持续性? 起病的缓急? 有无诱发因素?
- (2)伴随症状:除伴有急躁易怒外,是否伴有面红目赤,口苦咽干?有无胁痛?是否有眩晕?是否夜寐不 宁? 是否大便秘结? 是否小便短赤?
- (3)诊疗经过:是否进行过头颅 CT、脑血流等相关检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三: 痿证和中风偏枯的鉴别。(5分)

答案与评分要点:

痿证可以有肢体瘫痪、活动无力等类似中风的表现:中风后半身不遂日久不能恢复者,亦可见肌肉瘦削、 筋脉弛缓,两者应予以区别。但痿证一般起病缓慢,以双下肢瘫痪或四肢瘫痪,或肌肉萎缩.筋惕肉瞤为 多见。而中风的肢体瘫痪多起病急骤,目以偏瘫不遂为主。痿证起病时无神昏,中风则常有不同程度的 神昏。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:008

试题一:叙述并指出肺俞、地机的定位,叙述并演示毫针直刺、平刺的操作。(10分)

答案与评分要点,

- 1.肺俞:在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。(2分)
- 2.地机:在小腿内侧,阴陵泉下3寸,胫骨内侧缘后际。(考官判断:阴陵泉定 位是否准确)(2分)
- 3.毫针直刺、平刺的操作:
- (1) 选择适宜的毫针,常规消毒用具。(1分)
- (2)选择适官舒适的体位,充分暴露针刺部位。(1分)
- (3)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。(1分)
- (4) 直刺:针身与皮肤表面呈90。垂直刺入。适用于大部分的腧穴。(1分)
- (5)平刺:针身与皮肤表面呈 15。左右沿皮刺入。适用于皮薄肉少部位的腧 穴。(1分)
- (6)出针:消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)









试题二:王某,男,29岁,会计。近三个月经常失眠前来就诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间, 程度: 患者是人寐困难或寐而易醒, 还是醒后不能再寐, 还是彻夜难眠?症状持续的时 间?是否跟工作有关?是否跟情绪变化或进食等因素有关?
- (2)伴随症状:是否有头痛、头昏? 有无心悸、健忘、神疲乏力? 有无心神不宁、多梦? 有无劳倦、饮食不 节、思虑过度、情志失常、病后、体虚等病史?
- (3) 诊疗经过:是否进行过相关检查?是否口服安神类中药或镇静类西药?治疗效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:眩晕的主配穴。(5分)

答案与评分要点:

主穴:百会、风池、太冲、内关。

配穴:肝阳上亢配行间、侠溪、太溪:痰湿中阻配头维、中脘、丰隆:高血压配曲池、足三里:颈源性眩晕配风 府、天柱、颈夹脊。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:008

试题一: 叙述并指出膈俞、外关的定位, 叙述并演示毫针提插法的操作。(10分)

答案与评分要点:

1.膈俞:在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。(2分)

2.外关:在前臂后区,腕背侧远端横纹上2寸,尺骨与桡骨间隙中点。(2分)







3.毫针提插法的操作:

- (1)选择适宜的毫针,常规消毒用具。选择适宜舒适的体位,充分暴露针刺部位。(1分)
- (2)针刺部位皮肤和术者双手常规消毒。进针,刺入到一定深度。(1分)
- (3)实施提插操作:将针由浅层向下刺入深层为插,从深层向上引退至浅层为提。(2分)
- (4) 反复地上提下插操作。(1分)
- (5)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)

试题二:李某,男,78岁,退休。水肿,加重一个月。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间,程度:发病缓急? 是眼睑先肿还是下肢先肿? 水肿是指凹性还是非指凹性? 有无诱发因素? 是否有心悸、疮毒、紫癜以及久病体虚病史? 恶心是阵发性还是持续性?
- (2)伴随症状:神志是否清楚?是否伴有身体困重?是否胸闷喘息?食欲如何?有无腹胀?小便是否正常?是否伴有畏寒肢冷、面色白?大便是否正常?有无腰膝酸软?
- (3)诊疗经过:是否做过肾功能、尿常规等相关检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:鼓胀使用逐水法的禁忌证。(5分)

答案与评分要点:

鼓胀日久,正虚体弱,或发热,黄疸日渐加深,或有消化道溃疡,曾并发消化道出血,或见出血倾向者,均不宜使用。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:011

试题一:叙述并指出阳陵泉、少商的定位,叙述并演示虚里按诊的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.阳陵泉:在小腿外侧,腓骨头前下方凹陷中。(2分)
- 2.少商:在手指,拇指末节桡侧,指甲根角侧上方 0.1 寸(指寸)。 (2分)
- 3. 虚里按诊的操作方法:
- (1)检查前与患者良好的沟通,告知检查内容。(1分)
- (2)病人采取坐位和仰卧位,医生位于病人右侧。(1分)
- (3)医生用右手全掌或指腹平抚于虚里部(即心尖搏动处),并调节压力。(2分)
- (4)按诊内容应包括有无搏动、搏动部位及范围、搏动强度和节律、频率、聚散等。(2分)



答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度: 是小便点滴不畅还是小便闭塞不通?发病的时间?是否有着凉、情绪变化?
- (2)伴随症状:小腹是否胀满?有无口苦口黏,或口渴不欲饮,或大便不畅?是否烦躁易怒?是否咳嗽?食欲如何?是否倦怠乏力?有无腰膝酸软?
- (3)诊疗经过:男性患者是否进行过前列腺肛门指诊检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:肾俞、中脘的主治病证。(5分)

- 1.肾俞(3分):(下列4项,正确回答3项及以上,满分。仅正确回答2项,2分。仅正确回答1项,1分)
- ①头晕、耳鸣、耳聋、慢性腹泻、气喘、腰酸痛、遗精、阳痿、不育等肾虚病证;②遗尿、癃闭等前阴病证;③月经不调、带下、不孕等妇科病证;④消渴。
- 2.中脘(2分):(下列3项,正确回答2项及以上,满分。仅正确回答1项,1分)
- ①胃痛、呕吐、完谷不化、食欲不振、腹胀、泄泻、小儿疳积等脾胃病证;②癫痫、不寐等神志病;③黄疸。



阳陵泉

少商



考试级别:140/240/340/440

试题编号:012

试题一:叙述并指出大陵、昆仑的定位,叙述并演示亳针辅助手法弹法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.大陵:在腕前区,腕掌侧远端横纹中,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱 之间。(2分)
- 2.昆仑:在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷中。(2分)
- 3. 亳针辅助手法弹法的操作:
- (1)选择适宜毫针,常规消毒用具。选择适宜体位,充分暴露施术部位。施术部位皮肤和术者双手常规消毒。(1分)
- (2)进针,刺入一定深度。(1分)
- (3)以拇指与食指相交呈环状,食指指甲缘轻抵拇指指腹。(1分)
- (4)弹叩针柄:将食指指甲面对准针柄或针尾,轻轻弹叩,使针体微微震颤。也可以拇指与其他手指配合进行操作。弹叩数次。(2分)
- (5)出针,消毒干棉球按压针孔,以防出血。(1分)

试题二:郁证的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度:忧郁不畅、情绪不宁、胸胁胀满疼痛持续的时间?有无诱发因素?是否有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史?
- (2)伴随症状:是否脘闷嗳气、不思饮食?有无头痛、目赤、耳鸣,或吞酸嘈杂、大便秘结?咽中是否如物梗塞,吞之不下,咯之不出?有无失眠、多梦、五心烦热、盗汗?
- (3)诊疗经过:是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:内关、阳陵泉的主治病证。(5分)

答案与评分要点:

1.内关(3分):(下列6项,正确回答4项及以上,满分。仅正确回答3项,2分。仅正确回答2项,1分)

- ①心痛、心悸、胸闷等心胸病证;②胃痛、呕吐、呃逆等胃腑病证;③中风,眩晕,偏头痛;④不寐、郁证、癫狂痫等神志病证;⑤胁痛,胁下痞块,肘臂挛痛。
- 2.阳陵泉(2分):(下列3项,正确回答2项及以上,满分。仅正确回答1项,1分)
- ①黄疸、胁痛、口苦、呕吐等肝腑病证;②膝髌肿痛、下肢痿痹、肩痛等筋病;③小儿惊风。



陆



考试级别:140/240/340/440

试题编号:013

试题一:叙述并指出委中、水沟的定位,叙述并演示舌诊的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.委中:在膝后区,腘横纹中点。(2分)
- 2.水沟:在面部,人中沟的上 1/3 与中 1/3 交界点处。(2分)
- 3. 舌诊的操作方法:
- (1)患者采取坐位和仰卧位,医生姿势略高于患者。(1分)







- (2)患者面向自然光线,头略扬起,自然将舌伸出口外,舌体放松,舌面平展,舌尖略向下,尽量张口使舌体充分暴露。(2分)
- (3)望舌的顺序是先看舌质,再看舌苔;先看舌尖,再看舌中舌边,最后看舌根部。(2分)
- (4)必要时可配合刮舌或揩舌的方法。(1分)

试题二:便血的问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:便血的颜色是鲜红、暗红或紫暗,还是黑如柏油样?便血的量?持续的时间?是先便后血、大便染血,还是便血相混?
- (2)伴随症状:大便是否带脓?大便习惯是否改变?大便的形状是否正常?是否伴有肛门疼痛?是否有肛门异物感?肛门是否有异物突出?大便是否干燥?是否伴有腹痛?有无食少、体倦、面色萎黄、心悸、少寐?是否喜热饮?
- (3)诊疗经过:是否进行过肛门指诊检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:百会、昆仑的主治病证。(5分)

- 1.百会(3分):(下列3项,正确回答3项,满分。仅正确回答2项,2分。仅正确回答1项,1分)
- ①晕厥、中风、失语、痴呆、癫狂、不寐、健忘等神志病;②头风、颠顶痛、眩晕耳鸣等头面病证;③脱肛、阴挺、胃下垂等气虚下陷证。
- 2.昆仑(2分):(下列4项,正确回答2项及以上,满分。仅正确回答1项,1分)
- ①后头痛、目眩、项强等头项病证:②腰膝疼痛,足踝肿痛;③癫痫;④滞产。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:014

试题一:叙述并指出期门、公孙的定位,叙述并演示诊尺肤的操作手法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.期门:在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。(2分)
- 2.公孙:在跖区,第1跖骨底的前下缘赤白肉际处。(2分)
- 3. 诊尺肤的操作手法:
- (1)嘱患者采取坐位或仰卧位。(1分)





- (2)诊左尺肤时,医生用右手握住患者上臂近肘处,左手握住患者手掌,同时向桡侧转前臂,使前臂内侧面向上平放,尺肤部充分暴露。(2分)
- (3)医生用指腹或手掌平贴尺肤处并上下滑动来感觉尺肤的寒热、滑涩、缓急(紧张度)。(2分)
- (4)诊右尺肤时,医生操作手法同上,左、右手置换位置,方向相反。诊尺肤应注意左、右尺肤的对比。(1 分)

试题二:肺痨的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:咳嗽、咯血、潮热、盗汗、消瘦持续的时间? 有无诱发因素? 有无与肺膀患者接触病史?
- ②伴随症状:是否伴有自汗?是否伴有胸痛、胸闷、气短?食欲如何?有无倦怠乏力?有无畏寒肢冷?大小便如何?是否伴有失眠?是否有心悸、心慌?
- ③诊疗经过:是否进行过结核菌素试验?痰液是否进行过结核菌培养?是否确诊?是否服用抗结核药物?采用的治疗方案是什么,治疗效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:涌泉、肺俞的主治病证。(5分)

答案与评分要点:

1.涌泉(3分):(下列6项,正确回答5项及以上,满分。仅正确回答4项,2分。仅正确回答3项,1分)① 昏厥、中暑、小儿惊风等急症;②癫狂痫、头痛、头晕、目眩、失眠等神志病;③咽喉肿痛、喉痹、失音等头面 五官病证;④大便难、小便不利等前后二阴病证;⑤足心热;⑥奔豚气。

- 2.肺俞(2分):(下列 4 项,正确回答 2 项及以上,满分。仅正确回答 1 项,1分)
- ①鼻塞、咳嗽、气喘、咯血等肺系病证:②骨蒸潮热、盗汗等阴虚病证:③背痛:④皮肤瘙痒.瘾疹。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:015

试题一:叙述并指出承山、大椎的定位,叙述并演示拇指平推法操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.承山:在小腿后区,腓肠肌两肌腹与肌腱交角处。(3分)
- 2.大椎:在脊柱区,第7颈椎棘突下凹陷中,后正中线上。(3分)
- 3.拇指平推法操作:
- (1)受术者取适当体位,放松。(1分)
- (2) 术者以拇指罗纹面着力于施术部位。(1分)
- (3)余四指置于其前外方以助力,腕关节略屈。(1分)
- (4)拇指及腕部主动施力。(1分)
- (5)向食指方向呈短距离单向直线推进。(1分)
- (6)在操作过程中,拇指罗纹面的着力部分应逐渐偏向桡侧,且随拇指的推进腕关节应逐渐伸直。(1分)



答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度:发热是高热、潮热,还是低热?每天大便的次数?稀水样便还是黄糜样便?是否有不消化食物?大便气味如何?腥臭、酸臭,还是臭味不显著?是否有伤食、受凉、饮食不节或饮食不洁等诱发因素?
- (2)伴随症状:神志是否清楚?有无鼻塞、咳嗽?有无咽喉肿痛?是否伴有腹痛?大便是否有脓血?是 否伴有里急后重?有无呕吐?有无口渴喜饮?饮水量多寡?皮肤是否干燥?有无眼窝凹陷?小便如何?
- (3)诊疗经过:是否进行过大便常规检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:大椎、后溪的主治病证。(5分)

- 1.大椎(3分);(下列6项,正确回答4项及以上,满分。仅正确回答3项,2分。仅正确回答2项,1分) ①恶寒发热、疟疾等外感病证;②热病,骨蒸潮热;③咳嗽、气喘等肺气失于宣降证;④癫狂痫、小儿惊风等神志病证;⑤风疹、痤疮等皮肤疾病;⑥项强、脊痛等脊柱病证。
- 2.后溪(2分):(下列 4 项,正确回答 3 项及以上,满分。仅正确回答 2 项,1分)
- ①头项强痛、腰背痛、手指及肘臂挛痛等;②耳聋、目赤、咽喉肿痛等五官病证;③癫狂痫等神志病证;④疟疾。





承山

大椎



考试级别:140/240/340/440

试题编号:016

试题一:叙述并指出昆仑、百会的定位,叙述并演示虚里按诊的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.昆仑:在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷中。(3分)
- 2.百会:在头部,前发际正中直上5寸。(3分)
- 3. 虚里按诊的操作方法:
- (1)检查前与患者良好的沟通,告知检查内容。(1分)
- (2)病人采取坐位和仰卧位,医生位于病人右侧。(1分)
- (3)医生用右手全掌或指腹平抚于虚里部(即心尖搏动处),并调节压力。(:2分)
- (4)按诊内容应包括有无搏动、搏动部位及范围、搏动强度和节律、频率、聚散等。(2分)





昆仑

试题二:头痛的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:头痛发生的时间?头痛的部位是在太阳穴、颠顶部、前额部,还是后头部连及项部?是空痛、隐痛、胀痛、刺痛,还是掣痛?是持续性疼痛还是间歇发作?有无着凉、生气等诱发因素?
- (2)伴随症状:是否伴有头晕目眩?是否有恶风发热?有无汗出?有无呕吐?是否口渴?是否烦躁不安?有无神疲、倦怠、乏力?是否伴有腰膝酸软?大便情况如何?
- (3)诊疗经过:是否进行过头颅 CT 或脑血流图等相关检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何? 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:合谷、天枢的主治病证。(5分)

- 1.合谷(3分):(下列10项,正确回答4项及以上,满分。仅正确回答3项,2分。仅正确回答2项,1分) ①头痛、齿痛、目赤肿痛、咽喉肿痛、牙关紧闭、口喝、鼻通、耳聋、痄腮等头面五官病证;②发热恶寒等外感病;③热病;④无汗或多汗;⑤经闭、滞产、月经不调、痛经、胎衣不下、恶露不止、乳少等妇科病证;⑥上肢疼痛、不遂;⑦皮肤瘙痒、荨麻疹等皮肤科病证;⑧小儿惊风、痉证;⑨腹痛、痢疾、便秘等肠腑病证;⑩牙拔出术、甲状腺手术等面口五官及颈部手术针麻常用穴。
- 2.天枢(2分):(下列2项,正确回答2项,满分。正确回答1项,1分)
- ①绕脐腹痛、腹胀、便秘、泄泻、痢疾等脾胃肠病证;②癥瘕、月经不调、痛经等妇科病证。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:017

试题一:叙述并指出至阴、外关的定位,叙述并演示诊察小儿指纹的操作方法及主要观察内容。(10分) 答案与评分要点:

- 1.至阴:在足趾,小趾末节外侧,趾甲根角侧后方 0.1 寸(指寸)。 (2分)
- 2.外关:在前臂后区,腕背侧远端横纹上2寸,尺骨与桡骨间隙中点。(2分)



至阴



- 3.诊察小儿指纹的操作方法及主要观察内容。
- (1)诊察小儿指纹时,令家长抱小儿面向光亮处。(1分)
- (2)医生用左手拇指和食指握住小儿食指末端,再以右手拇指在小儿食指掌侧前缘从指尖向指根部推擦几次,即从命关向气关、风关直推,用力要适中,使指纹显露,便于观察。(3分)
- (3)观察络脉显现部位的深浅(浮沉)及所在食指的位置,络脉的形状(络脉支数的多少、络脉的粗细等)、色泽(红、紫、青、黑)及淡滞(浅淡、浓滞)。(2分)

试题二:心悸、胸闷伴下肢浮肿的问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度;患者自觉心搏异常,或快速。或缓慢。或跳动过重,或忽跳忽止,持续的时间?发作有无规律?有无诱发因素?胸闷和下肢水肿出现的时间?水肿的性质是按之随手而起还是按之凹陷如泥?
- (2)伴随症状:是否伴有咳嗽咳痰?夜间是否有呼吸困难?是否伴有腹胀?食欲如何?是否伴有形寒肢冷?有无恶心、欲吐、流涎?有无自汗、盗汗?是否伴有头痛、头晕?睡眠如何?是否有口渴?饮水情况如何?二便如何?
- (3)诊疗经过:是否进行过心电图、心功能、超声心动等检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:曲池、膈俞的主治病证。(5分)

- 1.曲池(3分):(下列7项,正确回答4项及以上,满分。仅正确回答3项,2分。仅正确回答2项,1分)
- ①目赤肿痛、齿痛、咽喉肿痛等五官热性病证;②热病;③手臂肿痛、上肢不遂等上肢病证;④风疹、瘾疹、湿疹等皮肤科病证;⑤腹痛、吐泻、痢疾等肠腑病证;⑥头痛、眩晕;⑦癫狂等神志病。
- 2.膈俞(2分):(下列5项,正确回答3项及以上,满分。仅正确回答2项,1分)
- ①呕吐、呃逆、咳嗽、气喘等气逆之证;②贫血、吐血、便血等血证;③瘾疹、皮肤瘙痒等皮肤病证;④潮热、盗汗等阴虚证;⑤胃痛。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:018

试题一:叙述并指出太溪、大陵的定位,叙述并演示舌诊的操作方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.太溪:在踝区,内踝尖与跟腱之间的凹陷中。(2分)
- 2.大陵:在腕前区,腕掌侧远端横纹中,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱 之间。(2分)
- 3. 舌诊的操作方法:
- (1)患者采取坐位和仰卧位,医生姿势略高于患者。(1分)





- (2)患者面向自然光线,头略扬起,自然将舌伸出口外,舌体放松,舌面平展,舌尖略向下,尽量张口使舌体充分暴露。(2分)
- (3)望舌的顺序是先看舌质,再看舌苔;先看舌尖,再看舌中、舌边,最后看舌根部。(2分)
- (4)必要时可配合刮舌或揩舌的方法。(1分)

试题二:女,19岁,经血淋沥不尽,纳呆便溏的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度;月经淋沥不尽持续的时间? 经血的颜色、质地和经量如何? 纳呆便溏出现的时间? 是否有诱发因素?
- ②伴随症状:是否神疲气短?有无面浮肢肿、小腹空坠?有无四肢不温?是否有潮热盗汗?是否有心烦口干?是否伴有失眠多梦?是否有心悸不宁?
- ③诊疗经过:是否进行过激素六项、基础体温、宫颈黏液等相关检查?是否确诊?有无治疗?怎样治疗?效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史等有无异常?既往有无崩漏史?有无口服避孕药或其他激素史?有无内 科出血病史?月经史:初潮年龄、既往月经来潮情况等。

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:三阴交、商阳的主治病证。(5分)

答案与评分要点:

1.三阴交(3分):(下列7项,正确回答5项及以上,满分。仅正确回答4项,2分。仅正确回答3项,1分) ①肠鸣、腹胀、泄泻、便秘等脾胃肠病证;②月经不调、经闭、痛经、带下、阴挺、不孕、滞产等妇产科病证;③ 心悸、不寐、癫狂等神志病证;④小便不利、遗尿、遗精、阳痿等生殖泌尿系统病证;⑤下肢痿痹;⑥湿疹、荨麻疹等皮肤病证;⑦阴虚诸证。

- 2.商阳(2分):(下列3项,正确回答2项及以上,满分。仅正确回答1项,1分)
- ①热病,昏迷;②耳聋、青盲、咽喉肿痛、颐颔肿、齿痛等五官病证;③手指麻木。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:019

试题一:叙述并指出照海、内关的定位,叙述并演示诊尺肤的操作手法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.照海:在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边际凹陷中。(2分)
- 2.内关:在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。(2分)
- 3.诊尺肤的操作手法:
- (1)嘱患者采取坐位或仰卧位。(1分)





- (2)诊左尺肤时,医生用右手握住患者上臂近肘处,左手握住患者手掌,同时向桡侧转前臂,使前臂内侧面向上平放,尺肤部充分暴露。(1分)
- (3)医生用指腹或手掌平贴尺肤处并上下滑动来感觉尺肤的寒热、滑涩、缓急(紧张度)。(2分)
- (4)诊右尺肤时,医生操作手法同上,左、右手置换位置,方向相反。(1分)
- (5)诊尺肤应注意左、右尺肤的对比。(1分)

试题二:患者阳事不举,伴心悸、乏力的问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、强度:患者是痿而不举、举而不坚,还是坚而不久?病情持续的时间?有无诱发因素?心悸、乏力是阵发性还是持续性,是否有诱发因素?
- ②伴随症状:是否伴有早泄?是否有神疲?有无腰酸膝软?是否畏寒肢冷?睡眠如何?是否精神苦闷、胆怯多疑?有无小便不畅、滴沥不尽等症?
- ③诊疗经过:是否进行过相关检查?是否排除阴茎发育不良引起的性交不能?是否服用药物治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史等有无异常?患者是否有房劳过度、手淫频繁、久病体弱,或有消渴、惊悸、郁证等病史?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:关元、地仓的主治病证。(5分)

答案与评分要点:

- 1.关元(3分):(下列6项,正确回答3项及以上,满分。仅正确回答2项,2分。仅正确回答1项,1分) ①中风脱证、虚劳羸瘦、脱肛、阴挺等元气虚损所致病证;②遗精、阳痿、早泄、不育等男科病证;③崩漏、月经不调、痛经、闭经、不孕、带下病等妇科病证;④遗尿、癃闭、尿频、尿急等泌尿系病证;⑤腹痛、泄泻、脱肛、便血等肠腑病证;⑥保健要穴。
- 2.地仓(2分):

口祸、眼睑瞤动、流涎、齿痛、颊肿等头面五官病证。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:020

试题一: 叙述并指出足三里、期门的定位, 叙述并演示耳穴压丸法的正确操作方法。(10分) 答案与评分要点,

- 1.足三里,在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。(2分)
- 2.期门:在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。(2分)
- 3. 耳穴压丸法,
- (1) 选穴:根据耳穴的选穴原则,选择耳穴确定处方。(1分)





期门

- (2) 选择体位:一般以坐位或卧位为官。(1分)
- (3)准备丸粒:将小丸粒贴于 0.5cm×0.5cm 的小方块医用胶布中央,备用;或选用成品耳穴贴。(1分)
- (4) 耳穴皮肤消毒:用75%酒精棉球擦拭消毒,去除污垢和油脂。(1分)
- (5)贴压:一手托住耳廓,另一手持镊子将贴丸胶布对准耳穴进行敷贴,并给予适当按压,使耳廓有发热、 胀痛感。压穴时,托指不动压指动,只压不揉,以免胶布移动;用力不能过猛过重。(2分)

试题二:胸痹问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度, 疼痛的部位是在胸骨后还是心前区?疼痛是闷痛、刺痛还是冷痛?持续的时间长 短,是几分钟还是十几分钟甚至半小时以上?疼痛是否放射到肩背部?疼痛有无诱发因素,如与生气、受 寒、饱食等有关?疼痛能否自行缓解?以往有无类似发作?
- (2)伴随症状:是否伴有痰多气短、肢体沉重。有无心悸气短、动则益甚、倦怠乏力。大小便如何。睡眠 是否正常?
- (3)诊疗经过:是否做过心电图、心肌酶等相关检查?是否确诊?服用硝酸甘油或复方丹参滴丸否?如 已服用,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三: 丰隆、中极的主治病证。(5分)

- 1. 丰隆(3分):(下列4项,正确回答3项及以上,满分。仅正确回答2项,2分。仅正确回答1项,1分)
- ①头痛、眩晕等头部病证;②癫狂;③咳嗽、哮喘、痰多等肺系病证;④下肢痿痹。
- 2.中极(2分):(下列3项,正确回答2项及以上,满分。仅正确回答1项,1分)
- ①遗尿、癥闭、尿频、尿急等泌尿系病证:②遗精、阳痿、不育等男科病证:③崩漏、月经不调、痛经、经闭、不 孕、带下病等妇科病证。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:021

试题一:叙述并指出条口、迎香的定位,叙述并演示中脘穴中指揉法的操作。(10分) 答案与评分要点,

- 1.条口:在小腿外侧,犊鼻下8寸,犊鼻与解溪连线上。(考官判 断:犊鼻、解溪定位是否准确)(4分)
- 2.迎香:在面部,鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中。(3分)
- 3.中脘穴中指揉法的操作:









迎香

- (2) 术者中指伸直,食指搭于中指远端指间关节背侧,腕关节微屈,用中指罗纹面着力于中脘穴。(2分)
- (3)以肘关节为支点,前臂做主动运动,通过腕关节使中指罗纹面做轻柔的小幅度的环旋运动。(2分)
- (4) 术后保暖、嘱患者卧床休息。(1分)

试题二:小儿急性腮腺炎问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:发热和腮部肿胀疼痛出现的时间。腮部肿胀疼痛是单侧还是双侧。疼痛跟进食是 否有关? 有无急性腮腺炎患者接触史?
- ②伴随症状:发热时是否有恶寒表现?有无汗出?有无口渴?有无头痛、呕吐、四肢抽搐和颈项僵直?神 志是否清楚? 男孩有无睾丸肿痛? 女孩有无一侧少腹(附件)疼痛?
- ③诊疗经过:是否进行过相关检查?确诊急性腮腺炎否?口服抗病毒西药或中药否,治疗效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史有无异常? 预防接种史:预防接种情况如何? 是否全程接种? 尤其是麻 腮风疫苗是否接种过?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:晕针的处理。(5分)

答案与评分要点:

- 1.立即停针、起针。(1分)
- 2.头低脚高位平卧,宽衣,保暖。(1分)

11 Cles

- 3.轻者静卧休息,给予温开水,或糖水。(1分)
- 4.重者:针刺人中、涌泉等穴;或灸百会、气海、关元等穴。(1分)
- 5.仍不醒者,现代急救处理。(1分)




考试级别:140/240/340/440

试题编号:022

试题一:叙述并指出天枢、支沟的定位,叙述并演示刺络拔罐法的正确操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.天枢:在腹部,横平脐中,前正中线旁开2寸。(2分)
- 2.支沟:在前臂后区,腕背侧远端横纹上3寸,尺骨与桡骨间隙中点。(2分)
- 3.刺络拔罐法:







- 天枢
- (3)消毒施术部位,刺络出血;医者戴消毒手套,用碘伏消毒施术部位,持三棱针(或一次性注射针头)点刺局部使之出血,或用皮肤针叩刺出血。(2分)
- (4) 用闪火法留罐, 留置 5~15 分钟后起罐。(1分)
- (5)起罐时不能迅猛,避免罐内污血喷射而污染周围环境。用消毒棉签清理皮肤上残存血液,清洗火罐后进行消毒处理。(2分)

试题二:乳房肿块伴乳房胀痛的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:乳房肿块的部位、形状、大小、数目、质地?肿块是否随喜怒而消长?乳房胀痛是否与月经周期及情志变化相关?
- (2)伴随症状:乳头是否有溢液?肿块部位的皮肤是否有变化?是否腰酸乏力、神疲倦怠?有无月经失调?月经量、色有无变化?是否烦躁易怒?是否有心悸失眠?
- (3) 诊疗经过: 是否做过乳腺相关检查? 是否确诊? 是否治疗, 怎样治疗, 效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:滞针的处理。(5分)

答案与评分要点:

1.因病人精神紧张,局部肌肉过度收缩所致者,应采用:①可稍延长留针时间;②于滞针腧穴附近进行循按或叩弹针柄;③在附近再刺一针,以宣散气血,而缓解肌肉的紧张。(3分)

2.因行针手法不当,单向捻转太过而致者,应采用:①向相反方向将针捻回;②配合刮柄、弹柄法或循按法,使缠绕的肌纤维回释,即可消除滞针。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:023

试题一:叙述并指出下关、气海的定位,叙述并演示掌推法的正确操作方法。(10分) 答案与评分要点:

- 1.下关:在面部, 颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中,合口有孔,张口即闭,宜闭口取穴。(4分)
- 2.气海:在下腹部,脐中下1.5寸,前正中线上。(3分)
- 3.掌推法操作:
- (1)受术者取适当体位,放松。(1分)
- (2) 术者以掌根部着力于施术部位。(1分)
- (3) 腕关节略背伸, 肘关节伸直。(1分)
- (4)以肩关节为支点(1分),上臂部主动施力。(1分)
- (5)通过肘、前臂、腕,使掌根部向前做单向直线推进。(1分)







试题二:桡骨下端骨折问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:受伤的经过? 手掌哪个部位着地? 疼痛的部位? 皮肤颜色? 持续的时间? 是否肿胀?
- (2)伴随症状:是否发热?有无出血?
- (3)诊疗经过:是否拍摄 X 线片? 是否确诊? 是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三: 弯针的处理。(5分)

- 1.现象:针柄改变了进针或刺入留针时的方向和角度,提插、捻转及出针均感困难,而患者感到疼痛。(2 分)
- 2.处理:出现弯针后,即不得再行提插、捻转等手法。如针柄轻微弯曲,应慢慢将针起出。若弯曲度过大时,应顺着弯曲方向将针起出。若由患者移动体位所致,应使患者慢慢恢复原来体位,局部肌肉放松后,再将针缓缓起出。切忌强行拔针,以免将针体折断,留在体内。(3分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:024

试题一:叙述并指出迎香、命门的定位,叙述并演示掌根揉法操作。(10分)

答案与评分要点:

1.迎香:在面部,鼻翼外缘中点旁,鼻唇沟中。(2分)

- 2.命门:在脊柱区,第2腰椎棘突下凹陷中,后正中线上。(2分)
- 3.掌根揉法操作,
- (1)受术者取适当体位,放松。(1分)







- (2) 肘关节微屈, 腕关节放松并略背伸, 手指自然弯曲, 以掌根部附着于施术部位。(2分)
- (3)以肘关节为支点,前臂做主动运动。(1分)
- (4)带动腕及手掌连同前臂做小幅度的来回旋转揉动。(1分)
- (5)术后保暖、嘱患者休息。(1分)

试题二:多饮、多食,伴消瘦1年,围绕主诉问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度:每天饮水量是多少?每天吃几两饭?体重下降了多少?上述症状持续的时间?
- (2)伴随症状:是否伴有多尿? 夜尿是否频多? 口舌是否干燥? 有无乏力? 是否伴有心慌心悸? 是否伴有汗出? 大便情况如何? 睡眠情况如何?
- (3)诊疗经过:是否测过空腹血糖、OGTT 和糖化血红蛋白?是否确诊糖尿病?是否服用降糖药物?如服了,是何种药物,使用剂量和方法如何,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:皮肤灼伤及起疱的处理。(5分)

- 1.现象:施灸或拔罐过程中,因操作不当或有意为之导致皮肤被灼伤起疱的现象。(1分)
- 2.处理:局部出现小水疱,只要注意不擦破,可任其自然吸收。(1分)
- 3.如水疱较大,对局部皮肤严格消毒后,用消毒的三棱针或粗毫针刺破水疱,放出水液,或用无菌的一次性注射器针抽出水液,再涂烫伤油等,并以纱布包敷,每日更换药膏 1 次,直至结痂,注意不要擦破疱皮。(1分)
- 4.如用化脓灸者,在灸疮化脓期间,要注意适当休息,保持局部清洁,并可用敷料保护灸疮,防止污染,待其自然愈合。(1分)
- 5.如处理不当,灸疮脓液呈黄绿色或有渗血现象,可用消炎药膏或玉红膏涂敷。(1分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:025

试题一:叙述并指出肩髃、中极的定位,叙述并演示掌推法操作。(10分)

答案与评分要点:

1.肩髃:选择两种取穴方法之一即可。(2分)

方法一:在三角肌区,肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷 中。

方法二:简便取穴法:屈臂外展肩峰外侧缘呈现前后两个凹陷,前下方的凹陷即是本穴。

- 2.中极:在下腹部,脐中下4寸,前正中线上。(2分)
- 3.掌推法操作:
- (1)受术者取适当体位,放松。(1分)
- (2) 术者以掌根部着力干施术部位。(1分)
- (3) 腕关节略背伸, 肘关节伸直。(1分)
- (4)以肩关节为支点(1分),上臂部主动施力。(1分)
- (5)通过肘、前臂、腕,使掌根部向前做单向直线推进。(1分)





開 中

试题二: 痢疾的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:大便每天几次?脓血便是白多赤少还是赤多白少?腹痛、里急后重的程度?有无不洁饮食或痢疾患者接触病史?是急性发作还是反复发作?
- (2)伴随症状:是否腹胀、腹痛、肠鸣、纳呆?有无恶寒、发热、头痛等外感症状?有无呕吐?有无小便量少?
- (3)诊疗经过:是否进行过大便常规检查?是否进行过大便痢疾杆菌培养?是否确诊?是否治疗,采用何种药物治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸起针的出现血肿的处理。(5分)

- 1.现象:出针后,针刺部位肿胀疼痛,继则皮肤呈现青紫色。(2分)
- 2.处理:若微量的皮下出血而局部小块青紫时,一般不必处理,可以自行消退。若局部肿胀疼痛较剧,青紫面积大而且影响活动功能时,先做冷敷止血后,再做热敷或在局部轻轻揉按,以促使局部瘀血消散吸收。(3分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:026

试题一:叙述并指出曲池、夹脊的定位,叙述并演示掌按法操作。(10分)

答案与评分要点,

1.曲池,在肘区,尺泽与肱骨外上散连线的中点处。(考官判断, 尺泽定位是否准确)(3分)

2.夹脊:在脊柱区,第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧,后正中线旁 开 0.5 寸,一侧 17 穴。(4 分)



(1)受术者取适当体位,放松。术者以单手或双手掌面重叠置于 施术部位。(1分)







- (2)以肩关节为支点,利用身体上半部重量,通过上臂、前臂传至手掌部,垂直向下按压。(2分)
- (3) 当按压力达到所需的力量后,稍停片刻,然后松劲撤力。(2分)
- (4) 再做重复按压,使按压动作既平稳又有节奏性。(1分)

试题二:内痔的问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1) 主症的时间、程度: 便血的颜色?排便时是否有肿物脱出?能自行回纳,还是用手方能还纳?肛门有 无异物感? 有无诱发因素?
- (2)伴随症状,是否伴有疼痛?疼痛的性质、持续时间?肛周是否感觉潮湿、瘙痒?
- (3) 诊疗经过,是否做过肛门指诊检查,是否确诊,是否治疗,怎样治疗,效果如何,
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗偏头痛的主穴及痰湿偏盛的配穴。(5分)

答案与评分要点:

- 1.主穴:率谷、阿是穴、风池、外关、足临泣、太冲。(3分)
- 2.配穴:痰湿偏盛配中脘、丰隆。(2分)

allele.



考试级别:140/240/340/440

试题编号:027

试题一:叙述并指出少商、命门的定位,叙述并演示腰部拳滚法的操作。(10分)

答案与评分要点:

1.少商:在手指,拇指末节桡侧,指甲根角侧上方 0.1 寸(指寸)。

(2分

- 2.命门:在脊柱区,第2腰椎棘突下凹陷中,后正中线上。(2分)
- 3.腰部拳滚法的操作:
- (1)受术者俯卧位,充分暴露腰部。铺治疗巾。(1分)
- (2)拇指自然伸直,余指半握空拳状。(1分)
- (3)以食指、中指、无名指和小指的第一节指背着力于施术部位。(1分)
- (4) 肘关节屈曲 20°~40°, 前臂主动施力, 推拉摆动, 带动腕关节屈伸活动。(1分
- (5)在腰部进行连续不断地动。(1分)
- (6) 腕关节屈伸幅度应在 120° 左右。前和回时着力轻重之比约为 3:1。(1分)

试题二:崩漏的问诊。(10分)

答案与评分要点,

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:月经是淋沥下血不断还是突然下血量多如注?月经周期是否正常?月经颜色是淡红、深红、紫暗还是鲜红?是否夹有血块?经期持续几天?有无诱发因素?
- (2)伴随症状:是否有神疲气短、面浮肢肿、小腹空坠或四肢不温?有无头晕耳鸣、腰膝酸软?有无潮热盗汗?有无口渴心烦?大小便情况如何?
- (3)诊疗经过:是否做过相关检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?以往月经的周期、经期、经量有无异常?有无崩漏史?有无口服避孕药或其他激素史?有无放置宫内节育器及输卵管结扎术史?有无内科出血病史?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗落枕的主穴及风寒袭络的配穴。(5分)

答案与评分要点:

1.主穴:外劳宫、阿是穴、天柱。(3分)

2.配穴:风寒袭络者,加风池、合谷。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:028

试题一:叙述并指出内关、地仓的定位,叙述并演示循法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.内关:在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕 屈肌腱之间。(2分)
- 2.地仓:在面部,口角旁开 0.4 寸。(2分)
- 3.循法的操作:
- (1)确定腧穴所在的经脉及其循行路线。(1分)







- (2)循按或拍叩,用拇指指腹,或第二、三、四指并拢后用三指的指腹,沿腧穴所属经脉的循行路线或穴位的上下左右进行循按或拍叩。(3分)
- (3) 反复操作数次, 以穴周肌肉得以放松或出现针感或循经感传为度。(2分)

试题二:便秘的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:排便的间隔时间如何? 大便粪质是否干结、排出艰难,或欲大便而艰涩不畅? 发病的时间? 有无饮食不节、情志内伤、劳倦过度等病史?
- (2)伴随症状:是否腹胀、腹痛、口臭?有无纳差及神疲乏力?便后有无短气乏力?平素有无头晕目眩、心悸气短、健忘?是否伴有畏寒肢冷?小便如何?
- (3) 诊疗经过: 是否进行过相关检查? 是否确诊? 是否治疗, 怎样治疗, 效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:太冲、环跳的主治病证。(5分)

- 1.太冲(3分):(下列5项,正确回答4项及以上,满分。仅正确回答3项,2分。仅正确回答2项,1分) ①中风、癫狂痫、头痛、眩晕、口眼蜗斜、小儿惊风等内风所致病证;②目赤肿痛、口喝、青盲、咽喉干痛、耳鸣、耳聋等头面五官热性病证;③月经不调、崩漏、痛经、难产等妇科病证;④黄疸、胁痛、腹胀、呕逆等肝胃病证;⑤下肢痿痹、足踝肿痛。
- 2.环跳(2分):(下列2项,正确回答2项满分。仅正确回答1项,1分)
- ①下肢痿痹,半身不遂,腰腿痛;②风疹。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:029

试题一: 叙述并指出孔最、太冲的定位, 叙述并演示拇指后位捏脊法的操作。(10分)

答案与评分要点:

1. 孔最: 在前臂前区, 腕掌侧远端横纹上 7 寸, 尺泽穴与太渊穴连线上。(考官判断: 尺泽、太渊定位是否准确)(2分)

2.太冲:在足背第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动。(2分)







3.拇指后位捏脊法的操作:

- 3.拇指用位连角齿的採作:
- (1)受术者俯卧位,充分暴露背部。(1分)
- (2)两手拇指伸直,两指端分别置于脊柱两侧,指面向前。(1分)
- (3)两手中食指前按,腕关节微屈。以两手拇指与食、中指罗纹面将皮肤捏起。轻轻提捏,向前推行移动。(1分)
- (4)两手拇指前推,食指、中指交替前按,相互配合,交替捏提捻动前行。(1分)
- (5)捏脊操作一般从腰俞穴开始,沿脊柱两侧向上终止于大椎穴为1遍,可连续操作3至5遍。(1分)
- (6)常捏捻3次向上提拉1次。(1分)

试题二:淋证问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:尿频、尿急、淋沥涩痛发生的时间?是否急性起病?每日小便次数?小便量是否减少?有无感染、饮水少等诱发因素?
- ②伴随症状:小腹是否伴有牵引痛?小便是否有中断?尿中是否有砂石?尿中是否有血?小便是清亮还是混浊如米泔水?是否伴有口苦口黏,或口渴不欲饮?有无咽干、烦渴欲饮、呼吸急促?有无情志抑郁,或多烦善怒、胁腹胀满?平素有无畏寒肢冷、腰膝冷而酸软无力?
- ③诊疗经过:是否进行过尿常规检查?是否确诊?是否治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗痛经实证的主穴及寒凝血瘀的配穴。(5分)

- 1.主穴:三阴交、中极、次髎、地机、十七椎。(3分)
- 2.配穴:寒凝血瘀配关元、归来。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:030

试题一:叙述并指出秩边、神门的定位,叙述并演示拿法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1. 秩边: 在骶区, 横平第4骶后孔, 骶正中嵴旁开3寸。(2分)
- 2.神门:在腕前区,腕掌侧远端横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。(2分)
- 3.拿法的操作:
- (1)受术者取适当体位,放松。(1分)
- (2) 术者拇指与其余手指的指面相对用力。(2分)
- (3)捏住施术部位的肌肤并逐渐收紧、提起。(2分)
- (4) 腕关节放松。(2分)
- (5)以拇指同其他手指的对合力进行轻重交替,连续不断地捏提并施以揉动。(3分

试题二:疱疹的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- (1)主症的时间、程度:疱疹先出现的部位?分布的部位?疱疹的颜色?疱液是清亮还是混浊?疱疹起病前是否有发热?是否有水痘患者接触史?
- (2)伴随症状:是否伴有高热、汗出、口渴?是否伴有丘疹、结痂?是否有头痛?食欲如何?二便如何?
- (3) 诊疗经过: 是否进行过相关检查? 是否确诊? 是否治疗, 怎样治疗, 效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗中风中脏腑的主穴及脱证的配穴。(5分)

- 1.主穴:水沟、百会、内关。(3分)
- 2.取穴:脱证,关元、神阙、气海。(2分)







动神

拿法




考试级别:140/240/340/440

试题编号:031

试题一:叙述并指出梁丘、期门的定位,叙述并演示温针灸的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.梁丘:在股前区,髌底上 2 寸,股外侧肌与股直肌肌腱之间(髂前上棘与髌骨外上缘连线上)。(2分)
- 2.期门:在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。(2分)
- 3.温针灸的操作:









米丘

期门

- (2)选取适宜体位,充分暴露待灸腧穴。(1分)
- (3)针刺得气留针:腧穴常规消毒,直刺进针,行针得气,将针留在适当的深度。(1分)
- (4)插套艾卷或搓捏艾绒,点燃:将艾卷有孔的一端经针尾插套在针柄上,插牢,不可偏歪,或将少许艾绒搓捏在针尾上,要捏紧,不可松散,以免滑落,点燃施灸。(1分)
- (5) 艾卷燃尽去灰,重新置艾: 待艾卷或艾绒完全燃尽成灰时,将针稍倾斜,把艾灰挥落在容器中,每穴每次可施灸1~3 壮。(1分)
- (6)待针柄冷却后出针。(1分)

试题二:恶心呕吐,食入不化1年的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:恶心、呕吐有无规律?每天发作几次?有无诱发因素?是呕吐清水痰涎还是不消化食物?呕吐物气味如何?是酸臭难闻还是气味不甚?
- ②伴随症状:食欲如何? 脘部有无痞闷不舒? 有无乏力? 是否喜暖恶寒? 大便情况如何? 是否夹有不消化食物? 睡眠如何? 是否伴有口渴喜饮?
- ③诊疗经过:是否进行过胃镜检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗哮喘虚证的治法及主穴。(助理不考)(5分)

- 1.治法:补益肺肾,止哮平喘。以相应背俞穴及手太阴、足少阴经穴为主。(3分)
- 2. 主穴:肺俞、膏肓、肾俞、定喘、太渊、太溪、足三里。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:032

试题一:叙述并指出天宗、气海的定位,叙述并演示闪罐法的操作。(10分)

答案与评分要点,

1.天宗:在肩胛区,肩胛冈中点与肩胛骨下角连线上 1/3 与下 2/3

(1) 洗取适宜体位, 充分暴露待拔腧穴。洗用大小适宜的罐具。

交点凹陷中。(2分)

- 2. 气海:在下腹部,脐中下 1.5 寸,前正中线上。(2分)
- 3.闪罐法的操作:





气海



- (2分)
- (2)用镶子夹紧一个 95%的酒精棉球点燃,使棉球在罐内壁中绕退出,并迅速将罐扣在应拔的部位,再立即将罐起下。(2分)
- (3)如此反复多次地拔住起下、起下拔住。拔至施术部位皮肤潮红、充血或瘀血为度。(2分)

试题二:腰部隐隐作痛,进行性加重2年的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:腰部隐隐作痛是持续性还是阵发性?是否跟劳累有关?活动后是否减轻?两年期间进行性加重的程度?
- ②伴随症状:腰部是否伴有酸软无力?有无心烦少寐、口燥咽干、面色潮红、手足心热?有无局部发凉,喜温喜按,遇劳更甚,卧则减轻?大小便情况如何?
- ③诊疗经过·是否进行过腰部 X 线检查? 是否确诊? 有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗呕吐的主穴及肝气犯胃的配穴。(5分)

答案与评分要点:

1.主穴:内关、足三里、中脘、胃腧。(3分)

allele-

2.配穴:肝气犯胃者,加肝俞、太冲。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:033

试题一:叙述并指出中冲、头维的定位,叙述并演示温和灸的操作。(10分)

答案与评分要点,

- 1.中冲:在手指,中指末端最高点。(2分)
- 2.头维:在头部,当额角发际直上 0.5 寸,头正中线旁开 4.5 寸。 (2分)
- 3.温和灸的操作:
- (1)选取适宜体位,充分暴露待灸腧穴。选用纯艾卷,将其一端 点燃。(1分)





- (2)术者手持艾卷的中上部,将艾卷燃烧端对准腧穴,距腧穴皮肤 2~3cm 进行熏烤,艾卷与施灸处皮肤的 距离应保持相对固定。(2分)
- (3)注意:若患者感到局部温热舒适可固定不动,若感觉太烫可加大与皮肤的距离,若遇到小儿或局部知觉减退者,医者可将食、中两指,置于施灸部位两侧,通过医者的手指来测知患者局部受热程度,以便随时调节施灸时间和距离,防止烫伤。(2分)
- (4)灸至局部皮肤出现红晕,有温热感而无灼痛为度,一般每穴灸10~15分钟。灸毕熄灭艾火。(1分)

试题二:发热、倦怠乏力、自汗1个月的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:发热是高热、潮热还是低热?发热有无规律?倦怠乏力和自汗的程度?与劳累是否有关?
- ②伴随症状:是否伴有恶寒? 夜间是否盗汗? 食欲如何? 是否形寒怯冷、四肢不温? 是否伴有精神倦怠? 大便是否正常?
- ③诊疗经过:是否进行过检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗牙痛的主穴及胃火牙痛的配穴。(5分)

- 1.主穴:合谷、颊车、下关。(3分)
- 2.配穴:胃火牙痛者,加内庭、二间。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:034

试题一:叙述并指出鱼际、环跳的定位,叙述并演示雀啄灸的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.鱼际:在手外侧,第1掌骨桡侧中点赤白肉际处。(2分)
- 2.环跳:在臀部,股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外 1/3 与内 2/3 交点处。(2分)
- 3.雀啄灸的操作:
- (1)选取适宜体位,充分暴露待灸腧穴。选用纯艾卷,将其一端 点燃。(1分)





鱼际

- (2) 术者手持艾卷的中上部,将艾卷燃烧端对准腧穴,像麻雀啄米样一上一下移动,使艾卷燃烧端与皮肤的距离远近不一,动作要匀速,起落幅度应大小一致。(2分)
- (3)燃艾施灸,如此反复操作,给予施灸局部以变量刺激,若遇到小儿或局部知觉减退者,术者应以食指和中指,置于施灸部位两侧,通过医者的手指来测知患者局部受热程度,以便随时调节施灸时间和距离,防止烫伤。(2分)
- (4)灸至皮肤出现红晕,有温热感而无灼痛为度,一般灸10~15分钟。灸毕熄灭艾火。(1分)

试题二:男,下肢肌肉萎缩,腰膝酸痛2年的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:肌肉萎缩的程度? 持续的时间? 是否进行性加重? 腰膝酸痛的程度? 是否与劳累有关? 有无其他诱发因素?
- ②伴随症状:是否伴有肢体关节疼痛、重着、麻木?肢体是否变形?有无一侧肢体偏瘫?是否伴有口眼吗斜?是否眩晕耳鸣?有无舌咽干燥?有无遗精或遗尿?
- ③诊疗经过:是否进行过检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗急性泄泻主穴及泻下脓血的配穴。(助理不考)(5分)

- 1.主穴:天枢、上巨虚、阴陵泉、水分。(3分)
- 2.配穴:泻下脓血配曲池、三阴交、内庭。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:035

试题一:叙述并指出膻中、膈俞的定位,叙述并演示小鱼际滚背部的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1.膻中:在胸部,横平第4肋间隙,前正中线上。(2分)
- 2.膈俞:在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。(2分)







- 3.小鱼际滚背部的操作:
- (1)拇指自然伸直,余指自然屈曲,无名指与小指的掌指关节屈 膻中 膈俞 小鱼际核法 曲约 90%(2分)
- (2)手背沿掌横弓排列呈弧面,以第五掌指关节背侧为吸点吸附于患者背部。(2分)
- (3)以肘关节为支点,前臂主动做推旋运动,带动腕关节做较大幅度的屈伸活动,使小鱼际和手背尺侧部在背部持续不断地来回滚动。(2分)

试题二:男,50岁,项背强直、四肢抽搐1小时的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:项背强直、四肢抽搐起病的缓急? 是阵发性还是持续性? 每次持续的时间? 既往是否有类似发作?
- ②伴随症状:神志是否清楚?肢体有无偏瘫?有无口眼㖞斜?是否口吐涎沫?有无发出猪羊叫声?是否伴有恶寒发热?有无高热头痛、口噤齿龄、手足躁动?有无腹满便结,口渴喜冷饮?有无心烦易怒、胁肋胀痛?
- ③诊疗经过:是否做过头颅 CT、脑电图等检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗牙痛的治法及主穴。(助理不考)(5分)

答案与评分要点:

1.治法: 祛风泻火, 通络止痛。以手、足阳明经穴为主。(3分)

2. 主穴:合谷、颊车、下关。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:036

试题一:叙述并指出攒竹、天宗的定位,叙述并演示肘推法的操作。(10分)

答案与评分要点:

- 1. 攒竹:在面部,眉头凹陷中,额切迹处。(2分)
- 2.天宗:在肩胛区,肩胛冈中点与肩胛骨下角连线上 1/3 与下 2/3 交点凹陷中。(2分)
- 3. 肘推法的操作:
- (1) 屈肘,以肘关节尺骨鹰嘴突起部着力于施术部位。(2分)
- (2)另一侧手臂抬起,以掌部扶握屈肘侧拳顶以固定助力。(2分)
- (3)以肩关节为支点腰部发力,上臂部施力,做较缓慢的单方向直线推进。(2分)





赞竹

试题二:72岁,男性,间断心悸、眩晕2年,加重半年伴下肢水肿的问诊。(10分)

答案与评分要点:

- 1.现病史询问内容。(7分)
- ①主症的时间、程度:间断心悸、眩晕发作的频率? 近半年加重有无诱发因素? 下肢水肿起病的缓急? 水肿是指凹性还是非指凹性?
- ②伴随症状:是否伴有胸闷胸痛?是否伴有咳嗽喘息?是否有脘腹胀闷?是否口渴不喜饮?小便量是否减少?有无形寒肢冷?
- ③诊疗经过:是否做过心功能等相关检查?是否确诊?有无治疗,怎样治疗,效果如何?
- 2.相关病史询问内容。(2分)

既往史、个人史、家族史、过敏史、手术史等有无异常?

3.根据临床症状不同等情况,有针对性地询问其他相关内容。(1分)

试题三:针灸治疗胆绞痛的主穴及肝胆湿热的配穴。(助理不考)(5分)

- 1.主穴:胆囊穴、阳陵泉、胆俞、日月。(3分)
- 2.配穴:肝胆湿热配行间、阴陵泉。(2分)



第三站临床答辩标准考试题库

站次	具体规定学历 (中医执业、助理)				师承或确有专长 (中医执业、助理)			
第三站	考试内容	分数	考试方法	时间	考试内容	分数	考试方法	时间
	体格检查	10	实际操作	20	体格检查	10	实际操作	20
	西医操作	10	实际操作		西医操作	10	实际操作	
	西医临床答	5	现场口述		西医临床答	5	现场口述	
	辩(含辅助				辩(含辅助			
	检查结果判				检查结果判			
	读分析)				读分析)			





考试级别:140/240/340/440

试题编号:001

试题一:演示拉塞格征的检查方法,并回答阳性表现。(10分)

答案与评分要点,

- 1.被检查者取仰卧位,两下肢伸直。(2分)
- 2.检查者一手压在一侧膝关节上,使下肢保持伸直,另一手将该侧下肢抬起。(4分)
- 3.正常可抬高 70°以上,如不到 30°即出现由上而下的放射性疼痛为阳性。(4分)

试题二:演示手术区皮肤消毒的全过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.准备好消毒用品(卵圆钳、消毒剂、棉球或纱布)。用碘伏(或 0.5%安尔碘)棉球或小纱布团进行皮肤消毒,从手术区中心向四周皮肤顺序涂擦三遍,第二、三遍不能超出上一遍的范围。(4分)
- 2.消毒范围应包括手术切口周围半径 15 cm 的区域。(2分)
- 3.对感染伤口或肛门等处的手术,应自外周向感染伤口或会阴肛门处涂擦。(2分)
- 4.对腹部手术,可先滴少许碘伏于脐孔,以延长消毒时间。消毒皮肤时涂擦应稍用力,方向应一致,不可 遗漏空白或自外周返回中心部位。已经接触污染部位的药液纱布不应再返回涂擦清洁处。(2分)

试题三:试述肺心病代偿期的临床表现。(5分)

- 1.肺部原发疾病表现及急性呼吸道感染的表现: COPD 等原发病的症状与体征。肺部听诊常有干、湿啰音。
- 2.肺动脉高压和右心室肥大:肺动脉瓣区 S_2 亢进。三尖瓣区出现收缩期杂音或剑突下触及心脏收缩期搏动。可出现颈静脉充盈、肝淤血肿大等。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:002

试题一:请演示肾区叩击痛的检查方法(10分)

答案与评分要点:

- 1.嘱被检查者取坐位或侧卧位。(4分)
- 2.检查者以左手掌平放于患者肾区(肋脊角处),右手握拳用轻到中等力量叩击左手手背。(6分)

试题二:演示心肺复苏时胸外心脏按压的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.患者仰卧于地面或硬板上,抢救者跪在患者身旁或站在床旁。(2分)
- 2.抢救者按压时上半身稍向前倾,双肩位于患者正上方,保持前臂与患者胸骨垂直,两肘关节伸直,以上半身力量用力垂直向下按压。(2分)
- 3.按压部位是胸骨中下 1/3 处(或两乳头连线与前正中线交点或胸骨的下半段)。(2分)
- 4.抢救者左手掌根紧贴于患者胸部,右手掌掌根重叠其上,两手手指相扣,左手五指翘起。(2分)
- 5.按压要求成人胸骨下陷 5~6 cm,按压频率 100~120 次/min,压、放时间比为 1:1。放松时要使胸壁回复原位,放松时掌根不应离开胸壁。连续按压 30 次后给予人工呼吸 2 次。(2 分)

试题三:试述溃疡性结肠炎的严重程度分级。(5分)

答案与评分要点:

(1)轻型:腹泻每天少于 4 次,无发热,贫血和便血轻或无,血沉正常。(2)中型:介于轻、重型之间,腹泻每天超过 4 次,仅伴有轻微全身表现。(3)重型:腹泻每天超过 6 次,多为肉眼脓血便,体温超过 37.5℃至少持续 2 天以上,脉搏超过 90 次/分,血红蛋白<100 g/L,血沉>30 mm/h,血清白蛋白<30 g/L,体重短期内明显减轻。常有严重的腹痛、腹泻、全腹压痛,严重者可出现失水,一般情况较差。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:003

试题一:演示左颌下淋巴结的检查方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.将左手置于被检查者头顶,以便能随时改变其头位而配合检查,使头微向左前倾斜。(4分)
- 2.右手四指并拢,屈曲掌指及指间关节,沿下颌骨内缘向上滑动触摸。(6分)

试题二:演示诊断患者是否腹水的腹腔穿刺术操作过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.清洁双手、戴好帽子、口罩。询问患者有无麻醉药过敏史,并签署手术同意书。检查物品准备。(1分)
- 2.嘱患者取侧卧位,穿刺点选择在贴近床面侧脐水平线与腋前线或腋中线交点处。用无菌医用棉签蘸取碘伏在穿刺部位皮肤消毒(自内向外进行画圈式皮肤消毒,消毒范围直径约 15 cm,待消毒液晾干后,再重复消毒 1 次,第 2 次消毒范围应略小于第一次)(2 分)
- 3.打开一次性腹腔穿刺包,戴无菌手套,检查一次性腹腔穿刺包内物品是否齐全。(1分)
- 4.铺无菌洞巾,助手打开局部麻醉剂,操作者用 5 mL 注射器抽取。一手拇指与示指绷紧穿刺点皮肤,另一手持针斜行刺进穿刺点皮下,注射麻醉剂形成小皮丘后,自皮肤至腹膜壁层逐层注射麻醉,每次注药前应回抽观察有无血液、腹水抽出。(2分)
- 5.检查穿刺针夹闭穿刺针连接的胶皮管,操作者用左手拇指与示指固定穿刺部位皮肤右手持腹腔穿刺针在麻醉处先稍倾斜刺进皮下然后垂直刺入腹壁待有明显抵抗感时提示针尖已穿过腹膜壁层,助手戴手套房用消毒血管钳在皮肤接近进针处协助固定穿刺针操作者用 50 mL 注射器连接胶皮管抽取腹水并留样送检。(2分)
- 6.抽液完毕,用无菌纱布压住穿刺部位拔出穿刺针,穿刺点用消毒棉球擦拭后,覆盖无菌纱布,稍用力压 迫穿刺部位数分钟,用医用胶带固定。(1分)
- 7.操作结束后协助患者平卧位休息,嘱患者卧床休息,如有不适及时呼叫医护人员。按要求妥善处理穿刺用物品。(1分)

试题三:试述慢性肾小球肾炎的临床表现。(5分)

- (1)血尿:多为镜下血尿。(1分)
- (2)蛋白尿:尿蛋白多在 1~3 g/d。(1分)
- (3)水肿:以眼睑及脚踝部晨起水肿为特点,严重时可呈现全身性水肿。(1分)
- (4)高血压:可为首发表现,突出表现为持续中等程度以上的高血压,严重时出现高血压脑病及高血压心脏病。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:004

试题一:演示布鲁津斯基征的检查方法,并回答阳性表现。(10分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者去枕仰卧,双下肢自然伸直。(4分)
- 2.检查者左手托住被检查者枕部,右手置于患者胸前,使颈部移动前屈,两膝关节和髋关节反射性屈曲为阳性。(6分)

试题二:演示伤口的换药方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.操作者戴好帽子、口罩、洗手,准备好无菌手套、换药器械、敷料,向患者说明换药目的,并嘱患者按伤口部位采取不同的体位,要求舒适且伤口暴露充分,光线良好操作方便。(2分)
- 2.用手将伤口外层的敷料揭去,然后戴无菌手套,按无菌操作持镊,将覆盖在伤口上的内层敷料轻揭去 (注意要轻巧,一般沿伤口长轴方向揭除),露出伤口。如遇敷料与伤口因结痂粘连,不可强行揭下,应以 生理盐水棉球将结痂敷料浸湿后再揭去,以免伤口出血。(2分)
- 3.无感染伤口,用碘酊或75%酒精棉球由内向外消毒伤口及周围皮肤,沿切口方向范围距切口3~5 cm,擦拭2~3 遍。(2分)
- 4.感染伤口,则应从外向感染伤口处涂擦。分泌物较多且创面较深时,宜用干棉球及生理盐水棉球擦拭 并清除干净;高出皮肤表面或不健康的肉芽组织及较多坏死物质,可用剪刀剪平,再用等渗盐水棉球擦拭;若肉芽组织有较明显水肿时,可用 3%~5%高渗盐水湿敷。(2分)
- 5.换药时双手执摄,左手镊子从换药碗中夹无菌物品,并传递给右手镊子,两镊子不可相碰。一般创面可用,消毒凡士林纱布覆盖,污染伤口或易出血伤口要用引流纱布,沿肢体或躯干长轴覆盖敷料后用胶布固定或包扎。(2分)

试题三:支气管哮喘的临床表现。(5分)

答案与评分要点:

常见症状是发作性的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状,少数患者还可能以胸痛为主要表现,很多患者在哮喘发作时自己可闻及哮鸣音。症状通常是发作性的,多数患者可自行缓解或经治疗缓解。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:005

试题一:演示巴宾斯基征的检查方法,并回答阳性表现。(10分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者取仰卧位,下肢伸直。(2分)
- 2.检查者左手持被检查者踝部,右手用叩诊锤柄部末端的钝尖在足底外侧从后向前快速划至小趾根部,再转向拇趾侧。(4分)
- 3.正常出现足趾向跖面屈曲,如出现拇趾背屈,其余四趾呈扇形分开,称巴宾斯基征阳性。(4分

试题二:演示屈曲肢体加垫止血的方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.适用于肘、膝关节的创伤性大出血,有骨关节损伤者禁用。(2分)
- 2.先抬高患肢以增加静脉回心血量,在肘或胭窝处垫以卷紧的棉垫卷或毛巾卷。(3分)
- 3.然后将肘关节或膝关节尽力屈曲,借衬垫物压住动脉以减少或终止出血。(3分)
- 4.用绷带或三角巾将肢体固定于能有效止血的屈曲位,精确记录止血的时间并标记在垫布上。(2分)

试题三:试述 ALT 为 100 U/L 的临床意义。(5 分)

- (1) 肝脏疾病:①急性病毒性肝炎;②慢性病毒性肝炎;③肝硬化;④肝内、外胆汁瘀积;⑤酒精性肝病等。
- (2)心肌梗死。
- (3)其他疾病:如骨骼肌疾病、肺梗死、肾梗死、胰腺炎、休克及传染性单核细胞增多症。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:006

试题一:演示指鼻试验的检查方法。(10分)

答案与评分要点

- 1.检查时,受检查者与医师相距 $0.5 \, \mathrm{m}$,嘱其用食指触及医师伸出的食指 $(1 \, \mathcal{G})$,再以食指指尖触自己的鼻尖。 $(4 \, \mathcal{G})$
- 2.先慢后快,先睁眼后闭眼,反复进行(2分),观察被检查者动作是否稳准。(3分)

试题二:演示无颈部创伤患者呼吸复苏时,如何为患者开放气道。(10分)

答案与评分要点:

答案一:(仰头举颏法)

- 1. 使患者仰卧于坚固的平地或平板上, 松开患者衣扣和裤带, 头颈部和躯干保持在同一轴面。(3分)
- 2.如有义齿应取下,用手指缠纱布清除口腔异物和分泌物。(3分)
- 3.抢救者在患者的右侧,左手掌小鱼际侧置于患者前额,下压使其头部后仰,右手食指与中指置于患者下 额处,将颏部向前托起,使头后仰,开放气道。(4分)

答案二:(仰头抬颈法)

- 1. 使患者仰卧于坚固的平地或平板上, 松开患者衣扣和裤带, 头颈部和躯干保持在同一轴面。(3分)
- 2.如有义齿应取下,用手指缠纱布清除口腔异物和分泌物。(3分)
- 3.抢救者在患者的右侧,右手抬起患者颈部,左手掌小鱼际侧置于患者前额,下压使其头后仰,气道开放。 (4分)

试题三:心电图显示提早出现的 QRS 波群形态基本正常,提早出现的 QRS 波群之前有逆行 P 波,有完全性代偿间歇。请做出心电图诊断。(5分)

参考答案:房室交界性早搏。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:007

试题一:演示脊柱压痛的检查方法。(5分)

答案与评分要点,

- 1.嘱被检查者取端坐位,身体稍向前倾。(2分)
- 2.检查者用右手拇指自上而下逐个按压脊椎棘突及椎旁肌肉(2分),询问被检查者是否有压痛感。(1分)

试题二:演示口对口人工呼吸的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.抢救者一只手的拇指与食指捏住患者鼻翼,用小鱼际肌下压患者前额,另一只手固定患者下颏,开启口腔。(3分)
- 2.抢救者深吸气后,用双唇严密包住患者口唇,平静状态下均匀吹气,同时观察胸是否隆起。吹气时间每次不少于1秒,每次送气量500~600 mL,以胸廓抬起为有效。(3分)
- 3.吹气完毕,松开患者口鼻,使患者的肺及胸廓自然回缩,将气体排出,重复吹气一次,与心脏按压交替进行,吹气按压比为2:30。(4分)

试题三:患者外周血白细胞 11.9×10°/L,中性粒细胞 78%,分析其临床意义。(5分)

- (1)感染:化脓性感染为最常见的原因,如流行性脑脊髓膜炎、肺炎、阑尾炎等。
- (2)严重组织损伤:如较大手术后、急性心肌梗死后。
- (3)急性大出血、溶血;如脾破裂或宫外孕、急性溶血等。
- (4)其他:如中毒、类风湿性关节炎及应用某些药物如皮质激素等。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:008

试题一:演示气管位置的检查方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.被检查者取坐位或仰卧位(2分),头颈部保持自然正中位置。(2分)
- 2.检查者分别将右手食指和无名指置于两侧胸锁关节上(2分),中指在胸骨上切迹部置于气管正中。(2分)
- 3.观察中指是否在食指和无名指的中间。(2分)

试题二:演示无菌手术伤口(切口)换药的方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.穿工作服,戴好帽子、口罩,洗净双手,必要时先查看伤口,一次备妥无菌手套、换药器械及敷料,向患者说明换药目的以取得配合。(2分)
- 2.用手先将伤口外层的敷料揭去,戴无菌手套,按无菌操作持镊,将覆盖在伤口上的内层敷料轻轻揭去,露出无菌伤口。(2分)
- 3.用 75%酒精(或碘伏)棉球先消毒伤口部位,再由内向外在伤口周围消毒 2 次,消毒范围应大于敷料覆盖的范围。(2 分)
- 4.无菌敷料覆盖伤口(距离切口边缘 3 cm 以上)后用胶布固定,贴胶布方向应与肢体或躯干长轴垂直。(2分)
- 5.注意换药时须双手持镊,左手镊子从换药盘中夹无菌物品,并传递给右手,两镊不可相碰。(2分)

试题三:患者外周血白细胞 10.5×10°/L,淋巴细胞 48%,分析其临床意义。(5分)

答案与评分要点,

- (1)感染性疾病:主要为病毒感染,如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎,传染性单核细胞增多症等。也可见于某些杆菌感染,如结核病、百日咳、布氏杆菌病。
- (2)某些血液病。急性大出血、溶血:如脾破裂或宫外孕、急性溶血等。
- (3)急性传染病的恢复期。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:009

试题一:演示口咽部的检查方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者取坐位或立位。(2分)
- 2.嘱被检查者头稍向后仰(2分),口张大并拉长发"啊"音。(2分)
- 3.检查者一手用压舌板在舌前 2/3 与舌后 1/3 交界处迅速下压舌体 $(2\, \mathcal{G})$,另一手持电筒照射咽部,观察咽部情况。 $(2\, \mathcal{G})$

试题二:演示橡皮管止血带止血的方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.抬高患肢,将软布料、棉花等软织物衬垫于止血部位皮肤上。(2分)
- 2.扎止血带时一手掌心向上,手背贴紧肢体,止血带一端用虎口夹住,留出长约 10 cm 的一段,另一手拉较长的一端,适当拉紧拉长,绕肢体 2~3 圈,以前一手的食指和中指夹住橡皮带末端用力拉下,使之压在紧缠的橡皮带下面即可。(2分)
- 3.止血带的缠扎部位:上肢应选择在上臂的上 1/3,下肢应在股部中下 1/3 交界处。(2分)
- 4.松紧程度以伤口不再继续出血,远端动脉搏动刚好消失为宜;如需放松止血带,将尾端拉出即可。(2分)
- 5.扎止血带时间不宜超过3小时,应1小时松止血带1次,每次放松2~3min。(2分)

试题三:患者女性,30岁,ESR35mm/h。分析其临床意义。(5分)

- (1)生理性增快:妇女月经期、妊娠、老年人、儿童。(1分)
- (2)病理性增快:①各种炎症:如细菌性急性炎症、风湿热和结核病活动期。(1分)②损伤及坏死、心肌梗死等。(1分)③恶性肿瘤。(1分)④各种原因导致的高球蛋白血症:如多发性骨髓瘤、感染性心内膜炎、系统性红斑狼疮、肾炎、肝硬化等。⑤贫血。(1分)





考试级别:140/240/340/440

试题编号,010

试题一:演示锁骨上窝淋巴结的检查方法(10分)

答案与评分要点,

- 1.嘱被检查者取坐位或仰卧位。(4分)
- 2 检查者用右手检查被检者左锁骨上窝,用左手检查被检者右锁骨上窝。(2分)
- 3.检查时将食指与中指屈曲并拢(2分),在锁骨上窝进行触诊,并深入锁骨后深部。(2分)

试题二:演示右侧气胸患者的胸腔穿刺术操作过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.清洁双手、戴好帽子、口罩。核对患者信息,询问患者有无麻醉药过敏史,并签署手术同意书。检查物品准备。(1分)
- 2. 嘱患者取仰卧半坐位, 穿刺点选择在右侧锁骨中线第 2 肋间, 用无菌医用棉签蘸取碘伏在穿刺部位皮肤消毒(自内向外进行画圈式皮肤消毒, 消毒范围直径约 15 cm, 待消毒液晾干后, 再重复消毒 1 次, 第 2 次消毒范围应略小于第一次)(2分)
- 3.打开一次性胸膜腔穿刺包,戴无菌手套,检查一次性胸膜腔穿刺包内物品是否齐全。(1分)
- 4.铺无菌洞巾,助手打开局部麻醉剂,操作者用 5 mL 注射器抽取。在穿刺点的下一肋间上缘倾斜进针穿人皮下,少量推注麻醉剂后,将注射针直立,逐层进行局部浸润麻醉,麻醉过程中边进针边回抽,直至有突破感并能回抽出积气,用无菌纱布压住进针部位拔出注射器。(1分)
- 5.胸穿针连接好胶皮管,用血管钳将胶皮管夹闭,一手示指、中指绷紧并固定住穿刺处皮肤,另一手持胸穿针刺入穿刺点皮下,然后沿肋骨上缘按局部浸润麻醉的路径缓慢进针,当有落空感时提示穿透壁层胸膜进入胸膜腔。(1分)
- 6.助手将胶皮管末端接排空的 50 mL 注射器松开夹闭胶皮管的血管钳开始抽气,注射器吸满后先用血管钳夹闭胶皮管拔出注射器将气体则排入大气中,排空注射器后再接上胶皮管松开血管钳继续抽气,反复操作达到穿刺目的注意记录抽气量。(1分)
- 7.夹闭乳胶管用无菌纱布按压住穿刺点拔出穿刺针压迫穿刺点片刻(1~2分钟)后用无菌棉签蘸取消毒液进行局部消毒观察针刺点有无溢液覆盖无菌纱布用医用胶带固定。详细记录抽出液体的量、色泽、混浊度等并尽快送检标本。(1分)
- 8.协助患者回到病床整理好衣服仰卧位休息与患者简单交流操作情况检查血压、脉搏有无明显变化术后 严密观察患者有无气胸、血胸、肺水肿及胸腔感染等并发症。按要求妥善处理穿刺用物品。(2分)

试题三:患者男性,50 岁,血清总蛋白 56 g/L,白蛋白 25 g/L;A/G0.8:1,分析其临床意义。(5 分) 答案与评分要点:

- (1) 肝脏疾病: 肝炎、肝硬化、肝癌等慢性肝病。
- (2) 肝外因素:①见于蛋白质摄入不足或消化不良;②蛋白质丢失过多,如肾病综合征、大面积烧伤等;③消耗增加,如恶性肿瘤、甲状腺功能亢进症、重症结核等。



考试级别:140/240/340/440

试题编号:011

试题一:演示膝反射的检查方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.被检查者取坐位,小腿完全松驰下垂(2分),或嘱被检查者取仰卧位,检查者在其腘窝处托起下肢使 髋、膝关节屈曲。(2分)
- 2.用叩诊锤叩击髌骨下方的股四头肌腱(4分),正常时出现小腿伸展。(2分)

试题二:演示女子导尿术的操作过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.携带导尿物品至患者床旁告知房间内除患者以外的其他人员暂时离开关闭门窗拉上隔帘(或用屏风遮挡)以保护患者隐私。(1分)
- 2.能自理的患者嘱其清洗外阴不能完成的患者协助其清洗外阴,协助患者褪下对侧(左侧)裤腿,盖在近侧(右侧)腿上,将盖被斜盖在对侧(左侧)腿上以保暖。嘱患者取仰卧位,双腿稍屈膝外展,露出外阴将尿垫垫于臀下。(1分)
- 3.打开一次性无菌导尿包将弯盘放于患者两腿之间取消毒棉球 1 包倒入弯盘内的右侧左手戴手套右手用镊子夹取消毒棉球进行第一次消毒消毒顺序是由上至下由外向内阴阜→两侧大阴唇→两侧小阴唇→尿道口,最后一个消毒棉球消毒尿道口至肛门。用过的棉球放在弯盘内左侧。每个棉球只能用一次,第一次消毒完毕,脱下手套放入弯盘内,与治疗碗一并移至床尾。(2分)
- 4.将打开的一次性无菌导尿包移至两腿之间,双手戴好手套,铺洞巾(洞巾的下缘连接导尿包,包布形成临时无菌区)将未使用的弯盘放置于会阴部。检查导尿管是否通畅,气囊是否漏气,撕开石蜡油棉球包,用石蜡油棉球润滑导尿管前端 18~20 cm 后放于治疗盘内,撕开消毒棉球包将消毒棉球倒入弯盘内右侧。(1分)
- 5.以左手拇、示指分开并固定小阴唇右手持镊子夹住消毒棉球进行第二次消毒顺序是尿道口→两侧小阴唇→尿道口,每个部位用一个消毒棉球,每个棉球只用一次,污染物放于床尾弯盘内。(1分)
- 6. 嘱患者放松并张口呼吸左手固定小阴唇将导尿管尾端置于治疗盘内右手持卵圆钳夹住导尿管轻轻插 人尿道内4~6 cm 插进过程中注意观察患者的表情,询问有无不适,见尿液流出后再插入1~2 cm,然后固 定导尿管。将尿液引流入治疗盘内,仔细观察尿液外观需要时留取尿标本,嘱患者放松。导尿结束缓慢 拔除尿管用纱布擦净外阴。(2分)
- 7.如需留置导尿管用注射器向气囊管内注入无菌水约 10 mL 并稍用力牵拉导尿管观察是否已固定连接 一次性尿袋尿袋引流管用别针挂于床旁将尿管标识粘贴在引流管上。(1分)
- 8.撤去导尿用物品脱下手套后协助患者穿好裤子盖好被子告知患者导尿结束询问患者有无不适、需要及 疑问,拉开床间隔帘(或撤去屏风)。妥善处理导尿用物品。(1分)

试题三:患者男性,68岁,ALP370 U/L。分析其临床意义。(5分)

答案与评分要点,

①胆道阻塞:各种肝内、外胆管阻塞性疾病;(2分)②急、慢性肝炎;(1分)③肝胆系统以外疾病如纤维性骨炎、佝偻病、骨软化症、成骨细胞瘤等。(2分)



考试级别:140/240/340/440

试题编号:012

试题一:演示腹壁反射的检查方法。(5分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者取仰卧位,两下肢稍屈曲,使腹壁放松。(2分)
- 2.检查者用叩诊锤柄部末端钝尖部迅速从外向内分别轻划两侧上、中、下腹部皮肤。(2分)
- 3.正常人受刺激部位出现腹肌收缩。(1分)

试题二:演示脱隔离衣的全过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.解开腰带,在前面打一活结,解开袖口,在肘部将部分袖子套塞入袖内,暴露前臂。(2分)
- 2.消毒双手,从前臂至指尖顺序刷洗 2 分钟,清水冲洗擦干解开衣领。(2分)
- 3.手伸入另一侧袖口内,拉下衣袖过手(用清洁手拉袖口内的清洁面),用遮盖着的手在外面拉下另一衣袖。(2分)
- 4.两手在袖内使袖子对齐,双臂逐渐退出,双手持领将隔离衣两边对齐。(2分)
- 5.如挂在半污染区的隔离衣,清洁面向外;如挂在污染区的隔离衣,污染面向外,挂在钩上。(考官可提问:在污染区、半污染区隔离衣如何放置)(2分)

试题三:患者女性,60岁,谷氨酰转移酶(y-GT)130 U/L。分析其临床意义。(5分)

答案与评分要点:

①肝癌。(1分)②胆道阻塞。(1分)③肝脏疾病:急性肝炎、慢性肝炎及肝硬化的活动期,急慢性酒精性肝炎、药物性肝炎。(3分)





考试级别:140/240/340/440

试题编号:013

试题一:演示肱三头肌反射的检查方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者取坐位或卧位, 半屈肘关节, 上臂稍外展。检查者以左手托住被检查者肘部。(4分)
- 2.检查者用叩诊锤直接叩击尺骨鹰嘴突上方的肱三头肌肌腱的附着处。(4分)
- 3.正常时出现前臂伸展。(2分)

试题二:演示戴干手套的全过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.穿无菌手术衣、戴口罩后,选取号码合适手套并核对灭菌日期;用手套袋内无菌滑石粉包轻轻敷擦双手。(2分)
- 2.左手自手套袋内捏住两只手套的翻折部分,提出手套使两只手套拇指相对向。(2分)
- 3.右手先插入手套内,再用戴好手套的右手 2~5 指插入左手手套的翻折部内,帮助左手插入手套内,然后将手套翻折部翻回套压住手术衣袖口。(2分)
- 4.用无菌盐水冲净手套外面的滑石粉。(2分)
- 5.手术开始前,将双手举于胸前,切勿任意下垂或高举。(2分)

试题三:患者女性,35岁,HBsAg、HBeAg及抗-HBc阳性。分析其临床意义。(5分)

答案与评分要点:

"大三阳",提示 HBV 正在大量复制,有较强的传染性。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:014

试题一:演示肱二头肌反射的检查方法。(10分)

答案与评分要点,

- 1.被检查者取坐位或卧位,检查者以左手托住被检查者屈曲的肘部。(4分)
- 2.检查者将左手拇指置于被检查者肱二头肌肌腱上,右手用叩诊锤叩击左拇指指甲。(4分)
- 3.正常时出现前臂快速屈曲。(2分)

试题二:演示穿隔离衣的全过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.穿隔离衣前要戴好帽子、口罩,取下手表,卷袖过肘,洗手。(2分)
- 2.手持衣领从衣钩上取下隔离衣,清洁面朝自己,将衣领两端向外折齐,对齐肩缝,露出袖子内口。(2分)
- 3.右手持衣领,左手伸入袖内,右手将衣领向上拉,使左手套入后露出;换左手持衣领,右手伸入袖内,举双手将袖抖上,注意勿触及面部。(2分)
- 4.两手持衣领,顺边缘由前向后扣好领扣,再扎好袖口。(2分)
- 5.从腰部向下约 5 cm 处自一侧衣缝将隔离衣渐向前拉,见到衣边捏住,依法将另一边捏住,两手在背后将两侧衣边对齐,向一侧按压折叠,以一手按住,另一手将腰带拉至背后压住折叠处,在背后交叉,回到前面行一活结,系好腰带。 $(2\, \mathcal{G})$

试题三:患者男性,22岁,抗-HBs 阳性。分析其临床意义。(5分)

答案与评分要点,

见于注射过乙型肝炎疫苗或曾感染过 HBV,从目前 HBV 已被清除者,对 HBV 已有了免疫力。





考试级别:140/240/340/440

试题编号:015

试题一:演示浮髌试验检查方法,并回答阳性表现。(10分)

答案与评分要点:

- 1.被检查者取平卧位,患肢伸直放松。(2分)
- 2.检查者左手拇指和其余四指分别固定于肿胀膝关节上方两侧,右手拇指和其余四指分别固定于肿胀膝 关节下方两侧(4分),然后用右手食指将髌骨连续向下方按压数次,压下时有髌骨与关节面的碰触感,松 手时有髌骨随手浮起感,称为浮髌试验阳性。(4分)

试题二:演示气囊-面罩简易呼吸器的使用方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.将患者仰卧、去枕,头后仰,清除口腔分泌物,摘除假牙。(2分)
- 2.抢救者站干患者头顶处或头部左、右侧,托起患者下颌,使患者头进一步后仰,扣紧面罩。(2分)
- 3.手以"CE"手法固定(C法—左手拇指和食指将面罩紧扣于患者口鼻部,固定面罩,保持面罩密闭无漏气;E法—中指,无名指和小指放在病人下颌处向前上托起下颌,保持气道通畅)面罩另—手挤压气囊—面罩简易呼吸器气囊,按压时间大于1秒,潮气量为8~12 mL/kg,频率成人为12~16次/分,按压和放松气囊时间比为1:1.5~1:2。(4分)
- 4.气囊-面罩简易呼吸器连接氧气,氧流量 8~10L/分。(2分)

试题三:患者男性,36岁,血清尿素氮(BUN)10.3 mmol/L。分析其临床意义。(5分)

- (1) 肾前性因素:①肾血流量不足:见于脱水、心功能不全、休克、水肿、腹水等。②体内蛋白质分解过盛:见于急性传染病、脓毒血症、上消化道出血、大面积烧伤、大手术后和甲状腺功能亢进症等。
- (2) 肾脏疾病: 如慢性肾炎、肾动脉硬化症、严重肾盂肾炎、肾结核和肾肿瘤的晚期。
- (3)肾后性因素:尿路结石、前列腺肥大、泌尿生殖系统肿瘤等。





考试级别:140/240/340/440

试题编号,016

试题一:演示脊柱叩击痛的检查方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.脊柱叩击痛有直接叩诊和间接叩诊两种检查法。(2分)
- 2.直接叩诊法:被检查者取坐位,检查者用叩诊锤直接叩击胸、腰椎棘突(颈椎位置深,一般不用此法),了解被检查者有无叩击痛。(4分)
- 3.间接叩诊法:被检查者取坐位,检查者将左手掌置于被检查者头顶部,右手半握拳,以小鱼际肌部位叩击左手背,了解被检查者的脊柱各部位有无疼痛。(4分)

试题二:演示手术区皮肤消毒的全过程。(10分)

答案与评分要点:

- 1.准备好消毒用品(卵圆钳、消毒剂、棉球或纱布)。用碘伏(或 0.50% 安尔碘)棉球或小纱布团进行皮肤消毒,从手术区中心向四周皮肤顺序涂擦三遍,第二、三遍不能超出上一遍的范围。(4 分)
- 2.消毒范围应包括手术切口周围半径 15 cm 的区域。(2分)
- 3.对感染伤口或肛门等处的手术,应自外周向感染伤口或会阴肛门处涂擦。(2分)
- 4.对腹部手术,可先滴少许碘伏于脐孔,以延长消毒时间。消毒皮肤时涂擦应稍用力,方向应一致,不可遗漏空白或自外周返回中心部位。已经接触污染部位的药液纱布不应再返回涂擦清洁处。(2分)

试题三:患者男性,69岁,空腹血糖 7.8 mmol/L。分析其临床意义。(5分)

- (1)糖尿病。(1分)
- (2)其他内分泌疾病;如甲状腺功能亢进症、嗜铬细胞瘤、肾上腺皮质功能亢进等。(2分)
- (3)应激性高血糖:如颅内高压。(2分)





考试级别:140/240/340/440

试题编号:017

试题一:指出心脏瓣膜听诊区的位置。(10分)

答案与评分要点,

- 1.二尖瓣是心尖搏动最强处。一般情况下位于第5肋间隙左锁骨中线内侧。(2分)
- 2.主动脉瓣位于胸骨右缘第2肋间隙:主动脉瓣第二听诊区,位于胸骨左缘第3、4肋间隙。(4分)
- 3.肺动脉瓣区:位于胸骨左缘第2肋间隙。(2分)
- 4.三尖瓣区:位于胸骨体下端近剑突偏右或偏左处。(2分)

试题二:演示心脏复苏时胸外心脏按压的操作方法。(10分)

答案与评分要点:

- 1.患者仰卧于地面或硬板上,抢救者跪在患者身旁或站在床旁。(2分)
- 2.抢救者按压时上半身稍向前倾,双肩位于患者正上方,保持前臂与患者胸骨垂直,两肘关节伸直,以上半身力量用力垂直向下按压。(2分)
- 3.按压部位是胸骨中、下 1/3 处(或两乳头连线与前正中线交点或胸骨的下半段)。(2分)
- 4.抢救者一手掌根紧贴于患者胸部,另一手掌掌根重叠其上,两手手指相扣,贴紧按压胸部的五指翘起。 (2分)
- 5.按压要求成人胸骨下陷 5~6 cm,按压频率 100~120 次/min,压、放时间比为 1:1。放松时要使胸壁回复原位,放松时掌根不应离开胸壁,连续按压 30 次后给予与人工呼吸 2 次。(2 分)

试题三:患者男性,67岁,血钾6.3 mmol/L。分析其临床意义。(5分)

- (1) 肾脏排钾减少,如急、慢性肾功能不全及肾上腺皮质功能减退等。
- (2)摄入或注射大量钾盐,超过肾脏钾能力。
- (3)严重溶血或组织损伤。
- (4)组织缺氧或代谢性酸中毒时大量细胞内的钾转移至细胞外。

