



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

# 金英杰直播学院

临床重点学科

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- 1、胎儿期：①受精卵至出生，约 40 周②前三月易受影响，出现流产或先天畸形、遗传病
- 2、围生期：①妊娠满 28 周至出生 7 天②死亡率高（首选）③衡量医疗水平高低指标
- 3、新生儿期：①胎儿娩出至生后 28 天；②新生儿早期指出生后不满七天，发病率高，死亡率高
- 4、婴儿期：①出生至满 1 周岁②生长发育最迅速，第一高峰③后半年易患消化紊乱，营养不良、感染疾病
- 5、幼儿期：①自一岁至满三周岁之前，②意外事故较多见，应注意防护，③语言发育关键时期，
- 6、学龄前期：①三岁看大七岁看老②智能发育加速，③性格形成的关键
- 7、学龄期：①入小学到青春期，
- 8、青春期：①体格生长第二高峰，②生殖系统发育，第二性征突出
- 9、生长发育连续、有阶段；规律——上到下，近到远，粗到细，低级到高级，简单到复杂
- 10、神经系统发育最早；生殖系统发育最晚；体格发育快慢快；淋巴系统发育先快后慢
- 11、个体差异受遗传和环境因素影响
- 12、体重反映近期营养状况指标①新生儿初生体重平均 3kg（男 3.3kg，女 3.2kg）②1 岁以内，前三月增加等于后九月总和③一岁约十千克
- 13、生理性体重下降，不影响生长发育，下降范围不超过 10%，不超过 10 天
- 14、身高反映骨骼发育指标①出生身长 50cm，1 岁 75cm，2 岁 87cm②1 岁以内，前三月增加等于后九月总和 12.5cm③2~6 岁—身高=年龄\*7+75；7~10 岁—身高=年龄\*6+80
- 15、头围①出生平均 33~34；②1 周岁，头围=胸围=46cm；③测量——经眉弓上缘到枕骨结节，环绕一圈④1 岁以内，前三月增加等于后九月总和 6cm
- 16、胸围出生时，胸围小于头围

- 17、上臂围测左上臂围，筛查 1~5 岁小儿营养状况
- 18、颅骨发育后囟一般 6~8 周闭合，颅骨缝 3~4 月闭合，前囟 1~2 岁，最迟 2 岁闭合，长度以两对边中点连线长短表示
- 19、颈椎 3 月；胸椎 6 月；腰椎 1 岁。前后前
- 20、骨化中心反映骨骼发育年龄，检查左手腕部，早期正位 X 光片；1~9 岁腕部骨化中心数等于年龄加 1，十岁出齐，共十个，（三月出头状骨，钩骨）
- 21、牙齿乳牙 20 颗，4~10 月萌出，13 月后未萌出为出牙延迟，三岁前出齐，两岁内乳牙数=月龄-（4~6）。
- 22、大运动：三抬四握六会坐，七翻八爬周会走
- 23、细运动：4 握 5 扶能站直，6 摇 7 换 8 拍手，9 月试独站，10 月捏物走几步
- 24、新生儿啾呀叫，二月微微笑，三到四月笑出声，七月八月能把爸妈叫。一岁说再见，三岁唱歌谣
- 25、出生乙肝卡介苗，016 打乙肝，234 吃糖丸，345 百白破，8 月莫忘麻疹苗
- 26、二妈白 四季灰 6—7 白破二联疗
- 27、出生未打卡介苗，打前先做 PPD 试验，阴性才能打，皮内注射



**金英杰医学**  
JINYINGJIE.COM

**医学培训领导品牌**

致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



北京金英杰医考课程

## 金英杰直播，让学习更容易

全国免费咨询热线：**400-900-9392** 客服及投诉电话：**400-606-1615**

地址：北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层