

中医执业助理医师资格考试

真题洞察与高频考点集锦

金英杰医学教育研究院 编

编委会

刘广鹏 冯欣语 孙晓旭 王 爽
南静毓 霍秀红 王瑞娟 张圣淇
刘远城 杨翠秒 馨 月 何春燕
迟 爽 杨斯羽 春亚之 安 杰
刘雨琪 王冬竹 郭晓静 司 思
赵博涛

仅限内部学员课堂使用
免费交流

目 录

第一章 中医基础理论.....	001
第二章 中医诊断学.....	011
第三章 中药学.....	020
第四章 方剂学.....	029
第五章 中医内科学.....	039
第六章 中医外科学.....	053
第七章 中医妇科学.....	063
第八章 中医儿科学.....	071
第九章 针灸学.....	080
第十章 诊断学基础.....	088
第十一章 内科学.....	096
第十二章 传染病学.....	103
第十三章 医学伦理学.....	111
第十四章 卫生法规.....	115

第一章 中医基础理论



高频考点必背

1. 中医学理论体系包括两个主要特点:一是**整体观念**,二是**辨证论治**。
2. 整体观念是中医学关于**人体自身**的完整性及**人与自然**和**社会环境**统一性的认识。
3. “证”也叫证候,是机体在疾病发展过程中的**某一阶段**或某一类型的病理性概括。
4. 辨证论治是运用中医学理论辨析有关疾病的资料以确立证,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程。
5. **同病异治**指同一种病,由于发病的时间、地域不同,或疾病所处的阶段或类型不同,或病人的体质有异,故反映出的证不同,因而治疗也就有异。
6. **异病同治**指几种不同的疾病,在其发展变化过程中出现了大致相同的病机,大致相同的证,故可用大致相同的治法和方药来治疗。
7. 精的概念,源于“**水地说**”。
8. 气的概念,源于“**云气说**”。
9. 阴阳既可以代表相互**对立的事物或现象**,又可以代表**同一事物或现象**内部对立的两个方面。
10. 事物阴阳属性的**绝对性**主要表现在其属阴或属阳的**不可变性**。
11. 事物阴阳属性的**相对性**包括:①阴阳属性可互相转化。②阴阳之中复有阴阳。③因比较的对象的改变而发生改变。
12. 事物和现象五行归类的方法,主要有取象**比类法**和**推演络绎法**两种。
13. 阴阳对立制约指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的**相互斗争、相互制约和相互排斥**。
14. 阴阳互根互用指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有**相互依存、互为根本**的关系。
15. 阴阳交感互藏指阴阳二气在**运动中相互感应而交合**,亦即发生相摩、相错、相荡的相互作用。
16. 阴阳的消长有**阴长阳消、阳长阴消、阴消阳长、阳消阴长**4种形式。
17. 阴阳的转化一般都产生于事物发展变化的“**物极**”阶段,即所谓“物极必反”。
18. 阴阳的自和与平衡指阴阳双方**自动维持和自动恢复**其协调平衡状态的能力和趋势。
19. “木曰曲直”:引申为凡具有**生长、升发、条达、舒畅**等性质或作用的事物和现象,归属于木。
20. “火曰炎上”:引申为凡具有**温热、上升、光明**等性质或作用的事物和现象,归属于火。
21. “土爰稼穡”:引申为凡具有**生化、承载、受纳**性质或作用的事物和现象,归属于土。
22. “金曰从革”:引申为凡具有**沉降、肃杀、收敛**等性质或作用的事物和现象,归属于金。
23. “水曰润下”:引申为凡具有**滋润、下行、寒凉、闭藏**等性质或作用的事物和现象,归属于水。

24.事物属性的五行归类

自然界							五行	人体									
五音	五味	五色	五化	五气	方位	季节		五脏	五腑	五官	形体	情志	五液	五脉	五华	五声	变动
角	酸	青	生	风	东	春	木	肝	胆	目	筋	怒	泪	弦	爪	呼	握
徵	苦	赤	长	暑	南	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜	汗	洪	面	笑	忧
宫	甘	黄	化	湿	中	长夏	土	脾	胃	口	肉	思	涎	缓	唇	歌	哕
商	辛	白	收	燥	西	秋	金	肺	大肠	鼻	皮	悲	涕	浮	毛	哭	咳
羽	咸	黑	藏	寒	北	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐	唾	沉	发	呻	栗

25.五行相生次序是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

26.五行相克次序是:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

27.五行相乘次序是:与相克相同。

28.五行相侮次序是:木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木。

29.母病及子:指五行中的某一行异常,累及其子行,导致母子两行皆异常。

30.子病及母:指五行中的某一行异常,影响到其母行,终致子母两行皆异常。

5年 历年真题

1.中医学的基本特点是

- A.阴阳五行与藏象经络
- C.以五脏为主的整体观
- E.辨证求因与审因论治

- B.整体观念与辨证论治
- D.望闻问切与辨证论治

【答案】B

【解析】中医理论体系是经过长期临床实践,在中国古代哲学的指导下逐步形成的,其主要特点是整体观念和辨证论治。其余选项均为这一特点的具体体现。

涉及考点 | 中医学理论体系的主要特点

2.事物或现象阴阳属性的征兆是

- A.寒热
- C.水火
- E.左右

- B.上下
- D.晦明

【答案】C

【解析】根据《素问·阴阳应象大论》,“水火者,阴阳之征兆也”,说明水火是阴阳对立最明显的征兆。

涉及考点 | 阴阳的含义

3.古代哲学中构成宇宙本原的是

- A.天气
- C.阳气
- E.精气

- B.地气
- D.阴气

【答案】E

【解析】精气,在中国古代哲学中,一般泛指气,是一种充塞宇宙之中的无形(指肉眼看不见形质)而运动不息的极细微物质,是构成宇宙万物的本原。在某些情况下专指气中的精粹

部分,是构成人类的本原。

涉及考点 | 精的概念

- 4.重阴必阳,重阳必阴说明了阴阳之间的哪种关系
- | | |
|--------|--------|
| A.相互交感 | B.对立制约 |
| C.互根互用 | D.消长平衡 |
| E.相互转化 | |

【答案】E

【解析】阴阳转化,是指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化。阴阳双方的消长运动发展到一定阶段,事物内部的阴与阳的比例出现了颠倒,该事物的属性即发生转化。一般都产生于事物发展变化的“物极”阶段,即所谓“物极必反”。

涉及考点 | 阴阳的转化

- 5.阴阳转化是
- | | |
|-------|--------|
| A.绝对的 | B.有条件的 |
| C.偶然的 | D.必然的 |
| E.量变的 | |

【答案】B

【解析】任何事物在发展过程中都存在着“物极必反”的规律。“重阴必阳,重阳必阴”的“重”,“寒极生热,热极生寒”的“极”,以及“寒甚则热,热甚则寒”的“甚”,即阴阳消长变化发展到“极”的程度,是事物的阴阳总体属性发生转化的内在因素和必备条件。所以,阴阳的转化是有条件的。它在重、极、甚的情况下可以发生转化。故本题选B。

涉及考点 | 阴阳的相互转化

- 6.关于阴阳学说较准确的说法是
- | | |
|--------------------|------------|
| A.中医的经典理论 | B.对立统一的世界观 |
| C.我国古代的一种哲学思想 | D.唯物论 |
| E.我国古代朴素的唯物论和辩证法思想 | |

【答案】E

【解析】中医学基本理论是在阴阳概念基础上建立起来的,阴阳五行学说是我国古代朴素的辩证唯物的哲学思想。

涉及考点 | 阴阳学说

- 7.属于阳中之阳的脏是
- | | |
|-----|-----|
| A.肝 | B.肺 |
| C.脾 | D.心 |
| E.肾 | |

【答案】D

【解析】心肺居于膈上属阳,而心属火,主温通,属阳中之阳。肺属金,主肃降,属阳中之阴。肝脾肾居膈下属阴。而肝属木,主生发,属阴中之阳。肾属水,主闭藏,属阴中之阴。脾属土,主四时,属阴中之至阴。

涉及考点 | 五脏分阴阳属性

- 8.中医学的基本特点是
- | | |
|-------------|-------------|
| A.阴阳五行与藏象经络 | B.整体观念与辨证论治 |
| C.以五脏为主的整体观 | D.望闻问切与辨证论治 |

E.辨证求因与审因论治

【答案】B

【解析】中医理论体系是经过长期临床实践,在中国古代哲学的指导下逐步形成的,其主要特点是整体观念和辨证论治。其余选项均为这一特点的具体体现。

涉及考点 | 中医学理论体系的主要特点

9.采取同病异治方法的原因是

- | | |
|--------|--------|
| A.疾病相同 | B.症状不同 |
| C.阶段相同 | D.证候不同 |
| E.体征不同 | |

【答案】D

【解析】同病异治是同一病证,因时、因地、因人不同,或由于病情进展程度、病机变化,以及用药过程中正邪消长等差异,治疗上应相应采取不同治法。

涉及考点 | 同病异治

10.感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同,其理论依据是

- | | |
|--------|--------|
| A.同病异治 | B.异病同治 |
| C.辨病论治 | D.同病同治 |
| E.异病异治 | |

【答案】A

【解析】同病异治,是指同一种疾病,在其疾病的发展过程中,由于证不同,根据中医辨证论治的原理,采用的治法也不一样。感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同,就是因为它们的证不相同,因而采用不同的治疗方法。故本题选A。

涉及考点 | 辨证论治

11.体表属阳,体内属阴,筋骨为

- | | |
|---------|--------|
| A.阳中之阳 | B.阳中之阴 |
| C.阴中之阳 | D.阴中之阴 |
| E.阴中之至阴 | |

【答案】B

【解析】事物阴阳属性的相对性其中体现在阴阳之中复有阴阳,分属于阴阳的脏腑形体组织还可以再分阴阳。如体表属阳,然皮肉为阳中之阳,筋骨为阳中之阴。

涉及考点 | 阴阳学说在组织结构和生理机能方面的应用

12.下列不属于病理变化的是

- | | |
|--------|--------|
| A.五行制化 | B.母病及子 |
| C.子病及母 | D.五行相侮 |
| E.五行相乘 | |

【答案】A

【解析】五行学说的基本内容包括五行相生与相克、五行制化、五行相乘与相侮和五行的母子相及四个方面。选项A五行的制化是指五行系统中具有的自我调节机制,不属于病理变化。选项B、C、D、E是五行之间异常的生克变化。

涉及考点 | 五行学说的基本内容

13.最容易导致阳虚和久病体虚的是哪个季节

- | | |
|-----|-----|
| A.春 | B.夏 |
|-----|-----|

- C.秋
E.长夏
- D.冬

【答案】D

【解析】春温、夏热、秋凉、冬寒。寒性属阴，易伤阳气，阳气被遏，卫外功能降低，会引起久病体虚。因此，本题选择D。

涉及考点 | 四季与五行

14.五行中有收敛、沉降性质的是

- A.火
C.土
E.金
- B.水
D.木

【答案】E

【解析】选项A凡具有温热、上升、光明等性质或作用的事物和现象，归属于火。选项B凡具有滋润、下行、寒凉、闭藏等性质或作用的事物和现象，归属于水。选项C凡具有生化、承载、受纳等性质或作用的事物和现象，归属于土。选项D凡具有生长、升发、条达、舒畅等性质或作用的事物和现象，归属于木。选项E凡具有沉降、肃杀、收敛等性质或作用的事物和现象，归属于金。

涉及考点 | 五行的特性

15.五志相胜，思所胜的是

- A.喜
C.悲
E.忧
- B.怒
D.恐

【答案】D

【解析】思属脾，脾属土，恐属肾，肾属水。根据五行生化克制，土克水，土所胜为水，所以推断得出思所胜为恐。

涉及考点 | 五行制化

16.五行中“木”的特性是

- A.炎上
C.稼穡
E.从革
- B.润下
D.曲直

【答案】D

【解析】“木曰曲直”：“曲”，屈也；“直”，伸也。曲直，是指树木的枝条具有生长、柔和，能屈又能伸的特性，引申为凡具有生长、升发、条达、舒畅等性质或作用的事物和现象，归属于木。

涉及考点 | 五行的特性

17.脏腑之阴阳，脾为

- A.阴中之阳
C.阴中之至阴
E.阳中之阴
- B.阴中之阴
D.阳中之阳

【答案】C

【解析】选项A阴中之阳为肝。选项B阴中之阴为肾。选项C阴中之至阴为脾。选项D阳中之阳为心。选项E阳中之阴为肺。

涉及考点 | 阴阳学说在组织结构方面的应用

18.以下属“证候”的是

- A.痢疾
- B.感冒
- C.发热
- D.头痛
- E.心阳不振

【答案】E

【解析】证候是指疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。选项 A、B、D 属病。选项 C 属症。

涉及考点 | 证候的定义

19.药物性味中属阳的是

- A.辛味
- B.酸味
- C.咸味
- D.苦味
- E.性凉

【答案】A

【解析】《内经》云:“辛甘淡属阳,酸苦咸属阴。”

涉及考点 | 阴阳学说在疾病预防和治疗方面的应用

20.下列各项,与肺主通调水道功能关系最密切的是

- A.气机的调节
- B.朝百脉
- C.主宣发与肃降
- D.司呼吸
- E.宗气的生成

【答案】C

【解析】肺主行水,指肺气的宣发肃降运动推动和调节全身水液的输布和排泄。

涉及考点 | 肺的生理机能与特性

21.五行学说指导诊断,面见青色,脉见弦,则病位在

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

【答案】A

【解析】面色青,弦脉,属于肝病。五行中五色青、赤、黄、白、黑对应五脏肝、心、脾、肺、肾。

涉及考点 | 五行学说在疾病诊断中的应用

22.根据情志相胜法,可制约大怒的情志是

- A.喜
- B.思
- C.悲
- D.恐
- E.惊

【答案】C

【解析】“怒胜思”“思胜恐”“恐胜喜”“喜胜忧”“悲胜怒”。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的应用

23.藏象学说中的整体观以何者为中心

- A.五体
- B.六腑
- C.官窍
- D.四肢百骸
- E.五脏

【答案】E

【解析】藏象学说的主要特点是以五脏为中心的整体观,通过经络系统“内属于脏腑,外络于肢节”,将六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身脏腑形体官窍联结成有机整体。

涉及考点 | 藏象学说的特点

24.六腑共同的生理特点是

- | | |
|----------|--------|
| A.化生精气 | B.贮藏精气 |
| C.满而不实 | D.藏而不泻 |
| E.受盛传化水谷 | |

【答案】E

【解析】五脏共同的生理特点是化生和贮藏精气,六腑共同的生理特点是受盛和传化水谷。五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实;六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。选项A、B、C、D均为五脏的生理特点。

涉及考点 | 六腑的生理特点

25.见肝之病,知肝传脾的病机传变是

- | | |
|--------|--------|
| A.土侮木 | B.木乘土 |
| C.木克土 | D.母病及子 |
| E.子病犯母 | |

【答案】B

【解析】肝属木,脾属土,木与土之间为相克的关系。当对被克制的“一行”因克制太过引起异常的反应,称为相乘;当五行中的“一行”过于强盛,对原来克制自己的“一行”进行反克,称为相侮。所以肝病及脾为相乘关系。

涉及考点 | 五行相乘

26.培土生金法的理论基础是

- | | |
|--------|--------|
| A.五行相生 | B.五行相克 |
| C.五行制化 | D.五行相乘 |
| E.五行相侮 | |

【答案】A

【解析】培土生金也称补脾益肺。土为脾,金为肺,借五行相生的理论用补脾益气的方药来补益肺气。故本题选A。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的应用

27.神志活动与五脏有关,其中关系最密切的脏是

- | | |
|---------|---------|
| A.心、肺、肝 | B.心、肝、脾 |
| C.肺、脾、肾 | D.心、脾、肾 |
| E.心、肝、肾 | |

【答案】B

【解析】人体是以五脏为中心的有机整体,故情志活动与五脏的关系最为密切。由于心、肝、脾三脏在人体生理活动和精神活动中发挥着重要作用,故情志内伤最易损伤心、肝、脾、三脏。所以,神志活动与心、肝、脾、的关系最密切。

涉及考点 | 五脏的生理功能

28.下列除哪一项外均为五脏具有的共同特点

- | | |
|---------|----------|
| A.实而不能满 | B.藏精气而不泻 |
|---------|----------|

- C.可行气于腑
E.病则多虚证
- D.实体性器官

【答案】A

【解析】“五脏满而不能实”，“六腑实而不能满”。

涉及考点 | 五脏的生理特点

29.中医“藏象”的基本含义是

- A.现代解剖学的概念
C.脏腑组织的形象
E.脏腑的生理功能及其相互联系
- B.人体内脏的总称
D.藏于体内的脏腑及其表现于外的征象

【答案】D

【解析】藏指藏于体内的内脏，象指表现于外的生理、病理现象。藏象学说，就是通过对人体生理、病理现象的观察，研究人体各个脏腑的生理功能、病理变化及其相互关系的学说。

涉及考点 | 藏象及藏象学说的概念

30.形成阴阳两虚的病机是

- A.阴阳盛衰
C.阴阳格拒
E.阴阳亡失
- B.阴阳互损
D.阴阳转化

【答案】B

【解析】阴阳互损是指在阴或阳任何一方虚损的前提下，病变发展影响到相对的一方，形成阴阳两虚的病机。在阴虚的基础上，继而导致阳虚，称为阴损及阳；在阳虚的基础上，继而导致阴虚，称为阳损及阴。故本题选 B。

涉及考点 | 阴阳失调

2年 易错考题

- 1.阴阳一分为二，合二为一体现了阴阳之间的哪种关系
- A.阴阳互藏
C.阴阳平衡
E.阴阳转化
- B.阴阳互根
D.阴阳制约

【答案】B

【解析】选项 A 是指阴中有阳，阳中有阴。选项 B 是指相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。阴阳一分为二，合二为一，对立又统一体现了阴阳互根的关系。选项 C 是指阴阳协调和相对稳定状态。选项 D 是指相关联的阴阳双方之间存在着相互抑制、排斥、牵制的关系。选项 E 是指在一定条件下，可以向其对立面转化。

涉及考点 | 阴阳互根

2.“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，体现了阴阳之间的哪种关系

- A.对立制约
C.平衡协调
E.互相转化
- B.互根互用
D.互为消长

【答案】B

【解析】阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。阴阳互用，是指阴阳双方具有相互滋生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应

象大论》说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”指出阳以阴为基，阴以阳为偶；阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离。

涉及考点 | 阴阳学说的基本内容

3. 阴中求阳的治法适用于

- A. 阴虚
- B. 阳虚
- C. 阴盛
- D. 阳盛
- E. 阴阳两虚

【答案】B

【解析】阴阳间相互对立，又相互依存，当出现阳虚病证时，除了使用补阳药外，还应适当运用补阴药，使阳得阴助而生化无穷，此为阴中求阳，这是根据阴阳互根理论确定的治疗原则。

涉及考点 | 阴阳在疾病预防和治疗方面的应用

4. 五行中火的“所胜”是

- A. 木
- B. 水
- C. 土
- D. 金
- E. 火

【答案】D

【解析】“克我”者是“所不胜”，“我克”者是“所胜”，火的“所胜”，即火“所克”者。根据五行相克次序：水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。所以火的“所胜”是金。

涉及考点 | 五行相克

5. 下列关于五行生克规律的表述，正确的是

- A. 木为土之所胜
- B. 木为水之子
- C. 火为土之子
- D. 水为火之所胜
- E. 金为木之所胜

【答案】B

【解析】五行相生次序：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。“生我”者为母，“我生”者为子。五行相克次序：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。“克我”者为“所不胜”，“我克”者为“所胜”。

涉及考点 | 五行相生与相克

6. 根据五行生克规律，治疗肝肾阴亏，肝阳上亢之证，应该选用的是

- A. 滋水涵木法
- B. 益火补土法
- C. 培土制水法
- D. 泻南补北法
- E. 金水相生法

【答案】A

【解析】滋水涵木法是滋肾阴以养肝阴的治法，又称滋肾养肝法、滋补肝肾法。适用于肾阴亏损而肝阴不足，甚或肝阳上亢之证。所以，根据五行生克规律，治疗肝肾阴亏，肝阳上亢之证，应选用的治疗方法是滋水涵木法。故本题选A。

涉及考点 | 五行学说在疾病治疗方面的应用

7. 心主神志最主要的物质基础是

- A. 津液
- B. 精液
- C. 血液
- D. 宗气

E.营气

【答案】C

【解析】心藏神,心具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和人体精神意识思维活动的功能。心主血脉,心气可推动和调控血液在脉管中正常运行,流注全身。心的这两种功能相互影响:一方面,心主血脉的功能受心神主宰;另一方面,心神又必须得到心血的濡养才能正常地工作。

涉及考点 | 心的生理功能

8.根据五行的生克乘侮规律,以下说法错误的是

A.心火不足,肾水乘之

B.木火刑金

C.肝木乘土

D.心火过亢,反侮肺金

E.岁土太过,雨湿流行,肾水受邪

【答案】D

【解析】心属火,肺属金,火克金,心火过亢则称心火乘肺金,不是反侮。

涉及考点 | 五行的相生与相克、相乘与相侮

9.按五行生克乘侮规律,木火刑金是指五行的

A.相生

B.相克

C.相乘

D.相侮

E.制化

【答案】D

【解析】相侮,是反向克制致病。形成五脏相侮亦有两种情况,即太过相侮和不及相侮。太过相侮,是指由于某脏过于亢盛,导致其所不胜无力克制而反被克的病理现象。例如:肺金本能克制肝木,由于暴怒而致肝火亢盛,肺金不仅无力制约肝木,反遭肝火的反向克制,而出现急躁易怒,面红目赤,甚则咳逆上气,咯血等肝木反侮肺金的症状,称为“木火刑金”。所以,木火刑金是指五行的相侮关系。故本题选D。

涉及考点 | 五行学说的基本内容

10.导致津液输布障碍,水湿痰饮潴留的最主要因素是

A.肺的宣发肃降失职

B.脾的运化功能失健

C.肝的疏泄功能失常

D.肾的主水功能失调

E.三焦疏通水道不利

【答案】B

【解析】脾居中焦,为人体气机升降的枢纽,故在人体水液代谢过程中起着重要的枢纽作用。因此,脾运化水湿的功能健旺,既能使体内各组织得到水液的充分濡润,又不致使水湿过多而潴留。反之,如果脾运化湿的功能失常,必然导致水液在体内的停滞,而产生水湿、痰饮等病理产物,甚则形成水肿。即所谓脾为“生痰之源”。

涉及考点 | 脾的生理功能

第二章 中医诊断学



高频考点必背

1. 中医诊断的基本原则：**整体审察、四诊合参、病证结合**。
2. “四诊合参”是指**望、闻、问、切**四诊并重，诸法参用，综合收集病情资料。
3. **病**是对疾病**全过程**的特点与规律所作的**概括**。
4. **证**是对疾病**当前阶段**的病位、病性等所作的**结论**。
5. 病注重从贯穿疾病始终的根本矛盾上认识病情，证主要是从机体反应状况上认识病情。辨病有利于从疾病全过程、特征上认识疾病的本质；辨证则重在从疾病当前的表现中判断病变的位置与性质，抓住当前的主要矛盾。
6. **少神**临床表现：**精神不振**，两目乏神，面色少华，肌肉松软，**倦怠乏力**，**少气懒言**，动作迟缓等。临床意义：提示正气不足，精气轻度损伤，脏腑功能减弱。常见于虚证患者，或病后恢复期病人。
7. **假神**是指久病、重病患者，**精气本已极度衰竭**，而**突然**一时间**出现**某些神气暂时“**好转**”的虚假表现。古人比喻为回光返照、残灯复明。
8. **神乱**是指神志错乱失常。多见于癲、狂、痴、痫、脏躁等病人。
9. **主色**为人生来就有的基本面色，属于个体特征，终生基本不变。
10. **客色**是指因外界因素（如季节、昼夜、阴晴气候等）的不同，或生活条件的差异，而微有相应变化的面色。如**春应稍青**，**夏应稍红**，**长夏应稍黄**，**秋应稍白**，**冬应稍黑**等。
11. **善色**指病人面色虽有异常，但仍光明**润泽**。说明其病易治，预后较好。
12. **恶色**指病人面色异常，且**枯槁**晦暗。说明病变深重，脏腑精气已衰，胃气不能上荣于面。其病难治，预后较差。
13. **赤色**主**热**证，亦可见于**戴阳**证。**白色**主**虚**证（包括血虚、气虚、阳虚）、**寒**证、**失血**证。
14. **黄色**主**虚**证、**湿**证。
15. **青色**主**寒**证、**气滞**、**血瘀**、**疼痛**和**惊风**。
16. **黑色**主**肾虚**、**寒**证、**水饮**、**瘀血**、**剧痛**。
17. **目内眦及外眦**的血络属**心**，称为“**血轮**”。**黑珠**属**肝**，称为“**风轮**”。**白睛**属**肺**，称为“**气轮**”。**瞳仁**属**肾**，称为“**水轮**”。**眼胞**属**脾**，称为“**肉轮**”。
18. 伪膜坚韧，**不易剥离**，**重剥则出血**，或剥去随即复生，此属重证，多是**白喉**，又称“**疫喉**”，因肺胃热毒伤阴而成，属烈性传染病。
19. 伪膜：咽部溃烂处上覆白腐，形如**白膜**者。
20. 小儿病理指纹的观察其要点可概括为：**三关测轻重**，**浮沉分表里**，**红紫辨寒热**，**淡滞定虚实**。
21. 有“**舌尖属上脘**，**舌中属中脘**，**舌根属下脘**”的说法。
22. 舌尖红赤或破溃，多为**心火上炎**；舌体两侧出现青紫色斑点，多为**肝经气滞血瘀**。
23. 若舌见厚腻苔，多见于脾失健运所致的湿浊、痰饮、食积等；若**舌苔出现剥脱**，在舌中多为**胃阴不足**，在舌根多为肾阴虚等。

24.舌色红活明润,舌体**活动自如**者,为**有神**之舌。舌色晦暗枯涩,**活动不灵**者,为**无神**之舌。

25.**老舌**多见于**实证**。实邪亢盛,充斥体内,而正气未衰,邪正交争,邪气壅滞于上,故舌质苍老。

26.**嫩舌**多见于**虚证**。气血不足,舌体脉络不充,或阳气亏虚,运血无力,寒湿内生,故舌嫩色淡白。

27.**新病**音哑或失音者,多属实证,多因外感风寒或风热袭肺,或痰湿壅肺,肺失清肃,邪闭清窍所致,即所谓“**金实不鸣**”。

28.**久病**音哑或失音者,多属虚证,多因各种原因导致阴虚火旺,肺肾精气内伤所致,即所谓“**金破不鸣**”。

29.妇女妊娠末期出现音哑或失音者,称为**妊娠失音(子暗)**,系因胎儿渐长,压迫肾之络脉,使**肾精不能上荣于舌咽**所致。

30.伤寒病不经过传变,**两经或三经同时出现的病证**,称为“**合病**”。如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。

5年 历年真题

1.中医诊断的基本原则是

- A.整体审察,诊法合参,病证结合
- C.辨证求因,审因论治,脉症合参
- E.司外揣内,见微知著,以常衡变

- B.证候真假,证候错杂,诊法合参
- D.证候转化,病证结合,辨证求因

【答案】A

【解析】中医诊断的基本原则是:整体审察,诊法合参,病证结合。选项B、C、D、E均不是原则。

涉及考点 | 中医诊断的基本原则

2.下列各项,不属于面色青主病的是

- A.寒证
- C.湿证
- E.气滞

- B.惊风
- D.血瘀

【答案】C

【解析】面色青主寒证、疼痛、气滞、血瘀、惊风等,多由寒凝气滞,或痛则不通,或瘀血内阻,或筋脉拘急,使面部脉络血行受阻所致。湿证多见面色黄。

涉及考点 | 五色主病

3.肾虚水饮的面色特征是哪一项

- A.面黑暗淡
- C.眼眶周围色黑
- E.面色晦暗如烟熏

- B.面黑干焦
- D.面色黧黑

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是望面色。黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛,眼眶周围色黑着,多属肾虚水饮或寒湿带下。选项A属肾阳虚,选项B属肾阴虚,选项D属瘀血,选项E属

阴黄。

涉及考点 | 五色主病

4.按《素问·刺热》面部分候法,候脾的部位是

- A.额部
- B.鼻部
- C.右颊
- D.左颊
- E.颈部

【答案】B

【解析】《素问·刺热》划分法:左颊候肝,右颊候肺,额候心,鼻候脾,颊候肾。

涉及考点 | 面部色诊

5.按“五轮学说”之两目白睛是

- A.风轮
- B.血轮
- C.肉轮
- D.气轮
- E.水轮

【答案】D

【解析】中医特有的“五轮学说”,即瞳仁属肾,称为水轮;黑睛属肝,称为风轮;两眦及血络属心,称为血轮;白睛属肺,称为气轮;眼胞属脾,称为肉轮。

涉及考点 | 目的脏腑分属

6.斑与疹的区别主要是

- A.是否色红成片
- B.是否时现时隐
- C.是否抚之碍手
- D.是否压之褪色
- E.是否伴有身热

【答案】C

【解析】斑指皮肤黏膜出现深红色或青紫色片状斑块,平摊于皮肤,摸之不碍手,压之不褪色的症状。疹指皮肤出现红色或紫红色、粟粒状疹点,高出皮肤,抚之碍手,压之褪色的症状。常见于麻疹、风疹、瘾疹等病,也可见于温热病中。

涉及考点 | 斑与疹的主要区别

7.疮疡红肿高大,根盘紧束,焮热疼痛者为

- A.疽
- B.痈
- C.疔
- D.疔
- E.热气疮

【答案】B

【解析】选项 A 疽为漫肿无头,肤色不变,疼痛不已;选项 D 疔为形小如粟,根深如钉,麻木痒痛;选项 C 疔为型小而阔,红肿热痛不甚;选项 E 热气疮为针头至绿豆大小的水疮,有瘙痒和灼痛感,好发于口角唇边等。

涉及考点 | 痈的特点

8.肝胆郁热的呕吐物为

- A.黄绿色
- B.紫暗
- C.暗红色
- D.白稠
- E.黄稠

【答案】A

【解析】呕吐黄绿色苦水,多属肝胆郁热,以致胃失和降。

涉及考点 | 望呕吐物

9.小儿食指络脉达于气关是

- | | |
|--------|--------|
| A.邪气入络 | B.邪气入经 |
| C.邪入脏腑 | D.外感初起 |
| E.病情凶险 | |

【答案】B

【解析】风关以内,为邪在络;在气关,为邪在经;在命关,为邪入脏;透关射甲,即指纹一直延至指端爪甲者,预后不良,病情凶险。

涉及考点 | 望小儿指纹

10.长期使用抗生素后引起的舌苔变化是

- | | |
|-------|-------|
| A.灰黑苔 | B.黑腻苔 |
| C.燥腻苔 | D.花剥苔 |
| E.糙苔 | |

【答案】B

【解析】饮食和某些药物可以使舌象发生变化。长期服用某些抗生素,可产生黑腻苔或霉腐苔。

涉及考点 | 舌诊注意事项

11.舌青紫湿润而短缩的主病为

- | | |
|--------|----------|
| A.痰浊内阻 | B.寒凝筋脉 |
| C.肝风内动 | D.热盛伤津动风 |
| E.风气挟痰 | |

【答案】B

【解析】短缩舌的临床意义:短缩舌伴色淡紫或青紫而湿润,多属阳气暴脱,寒凝筋脉。

涉及考点 | 短缩舌的临床意义

12.阴寒内盛,血行瘀滞的舌象为

- | | |
|---------|---------|
| A.舌淡红润泽 | B.舌红绛少苔 |
| C.舌绛紫而干 | D.舌淡白光莹 |
| E.舌青紫湿润 | |

【答案】E

【解析】舌色淡紫或青紫湿润,多因阴寒内盛,血脉瘀滞所致。舌淡红润泽为气血调和的征象,常见于正常人。舌红绛少苔提示阴虚阳亢,多由热病后期阴液受损,或久病阴虚火旺,属虚热证。舌绛紫而干多属热盛伤津。舌淡白光莹多属阳虚水停。

涉及考点 | 舌色变化

13.邪热夹酒毒上壅的舌象是

- | | |
|--------|--------|
| A.舌色青紫 | B.舌色晦暗 |
| C.舌紫肿胀 | D.舌多瘀斑 |
| E.舌脉粗长 | |

【答案】C

【解析】本题考查的知识点是望舌。选项 A 为血瘀所致,还可见于某些先天性心脏病,或药物、食物中毒等病。选项 B 表明津液匮乏,气血大亏。选项 C 多见于酒毒内蕴,酒癖患者。

选项 D 由气滞血瘀所致。选项 E 多为瘀血内阻。

涉及考点 | 舌形变化

14. 消渴病患者病室的气味可为

- | | |
|-----------|--------|
| A. 尸臭味 | B. 腐臭味 |
| C. 血腥味 | D. 尿臊味 |
| E. 烂苹果样气味 | |

【答案】E

【解析】病室臭气触人，多为瘟疫类疾病。血腥味：病者多患失血。腐败味：病者疮疡化脓，流脓。尸臭味：病者脏腑衰败，病情重笃。烂苹果味：消渴患者晚期酮症酸中毒。尿臊味（氨气味），见于肾衰患者。

涉及考点 | 嗅气味

15. 久病重病，突然语声嘶哑的临床意义是

- | | |
|---------|---------|
| A. 脏气将绝 | B. 风热袭肺 |
| C. 阴虚火旺 | D. 肺气不足 |
| E. 咽喉失润 | |

【答案】A

【解析】新病音哑或失音者，多因外感风寒或风热袭肺，或痰湿壅肺，以致肺气不宣，清肃失司，邪闭清窍。声音嘶哑伴有低热、舌红少苔、咽干口渴者，多为阴虚火旺，当情绪发生变化也可突然发生失音，喉部检查无异常，多见于脏躁症。

涉及考点 | 音哑与失音

16. 发热为午后夜间低热的临床意义是

- | | |
|---------|---------|
| A. 阳明腑实 | B. 阴虚火旺 |
| C. 湿温内蕴 | D. 温病入营 |
| E. 热邪客表 | |

【答案】B

【解析】本题考察的是发热的特点。骨蒸潮热午后或夜间潮热：其特点是午后和夜间有低热。有热自骨内向外透发的感觉者，称为骨蒸发热，多属阴虚火旺所致。

涉及考点 | 阴虚发热

17. 外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 战汗 | B. 盗汗 |
| C. 自汗 | D. 冷汗 |
| E. 热汗 | |

【答案】A

【解析】战汗指病人先恶寒战栗而后汗出的症状。若汗出热退，脉静身凉，提示邪去正安，疾病好转；若汗出身热不退，烦躁不安，脉来急疾，提示邪盛正衰，病情恶化。

涉及考点 | 特殊汗出

18. 手足心汗出量多是因为

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 阴经郁热熏蒸 | B. 阳经郁热熏蒸 |
| C. 阴虚发热 | D. 上焦热盛 |
| E. 气虚发热 | |

【答案】A

【解析】手足心汗出为阳气内郁，阴虚阳亢或中焦湿热熏蒸证。

涉及考点 | 问汗

19.有形实邪闭阻气机所致的疼痛,其疼痛性质的是

- A.胀痛
- B.灼痛
- C.冷痛
- D.绞痛
- E.隐痛

【答案】D

【解析】胀痛为气滞作痛的特点。灼痛为火邪窜络,或阴虚火旺,经络被灼所致。冷痛因寒邪阻滞经络所致。绞痛多因有形实邪闭阻气机,或寒邪凝滞气机所致。隐痛多由精血亏虚,或阳气不足,阴寒内盛,机体失去充养、温煦而致。

涉及考点 | 疼痛的性质

20.肾精不足所致头痛的特点是

- A.隐痛
- B.绞痛
- C.胀痛
- D.刺痛
- E.空痛

【答案】E

【解析】隐痛指疼痛较轻微,但绵绵不休。常见于头部、腕部、肋肋、腰背等部位,多属虚证。由于精血亏损或阳虚生寒,脏腑、形体失于充养、温煦而致。绞痛指疼痛剧烈如刀绞,多因有形实邪阻闭气机,或寒邪阻滞气机所致,如心脉闭阻所致的“真心痛”。胀痛,指疼痛伴有胀满的感觉,主气滞。刺痛,指疼痛尖锐如针刺之感,主血瘀,以头部及胸胁腕腹等处较为常见,多伴痛处固定、拒按等。空痛,指疼痛且痛处伴有空虚感。常见于头部、胃脘或小腹部,多由于气血精髓亏虚,相应组织器官失其营养所致。故肾经不足的头痛多见空痛。故本题选E。

涉及考点 | 头痛的特点

21.下列各项,属痰湿内阻头痛特征的是

- A.胀痛
- B.刺痛
- C.眼花
- D.耳鸣
- E.昏沉

【答案】E

【解析】选项A为气滞疼痛特点;选项B为瘀血疼痛特点;选项E为湿性疼痛的特点。

涉及考点 | 问头痛

22.口渴不多饮,兼见身热不扬,头身困重,胸闷纳呆,舌苔黄腻,其临床意义为

- A.湿热内蕴
- B.饮停胃肠
- C.瘀血内阻
- D.热入营分
- E.阴虚火旺

【答案】A

【解析】渴不多饮,兼身热不扬、头身困重、苔黄腻者,属湿热证,由于湿热内蕴,津失布散所致;渴喜热饮,饮水不多,多为痰饮内停,津不上承所致;口干但欲漱水而不欲咽,兼舌紫暗或有瘀斑者,多属瘀血内停,气化不利所致;口渴饮水不多也可见于温病营分证,多因邪热入营,蒸腾营阴上承所致。

涉及考点 | 口渴与饮水

23. 口中黏腻不爽,其临床意义是

- | | |
|---------|---------|
| A. 胃火炽盛 | B. 湿热蕴脾 |
| C. 胆火上炎 | D. 心火上炎 |
| E. 脾胃气虚 | |

【答案】B

【解析】口中黏腻不爽,伴舌苔厚腻,多由湿浊困阻中焦所致;口黏腻而苦,多属肝胆湿热;口黏腻而甜,多为脾胃湿热。口淡多见于脾肾虚弱;口苦多见于心火、肝胆火旺,胆气上逆证;口酸多见于肝胃郁热,或食滞胃脘;口甜多见于脾胃湿热或脾虚之证,口咸多与肾病或寒水上泛有关;口涩多为燥热伤津,或脏腑热盛所致。

涉及考点 | 口味

24. 肝胃蕴热的口味是

- | | |
|---------|---------|
| A. 口中泛酸 | B. 口中酸馊 |
| C. 口甜黏腻 | D. 口中味咸 |
| E. 口中味苦 | |

【答案】A

【解析】酸味入肝,肝郁化热犯胃,胃失和降,则泛吐酸水,是为肝胃郁热证。选项 B 和选项 A 很相似,但它常见于脾胃湿热证。其余选项均不正确。

涉及考点 | 口味

25. 下列各项,除哪项外均属于排便感异常的是

- | | |
|---------|---------|
| A. 肛门灼热 | B. 排便不爽 |
| C. 里急后重 | D. 肛门重坠 |
| E. 完谷不化 | |

【答案】E

【解析】排便感异常有:肛门灼热、排便不爽、里急后重、肛门重坠、大便失禁。完谷不化为便质异常。

涉及考点 | 大便异常

26. 舌尖所候的脏腑是

- | | |
|--------|--------|
| A. 心、脾 | B. 脾、胃 |
| C. 肝、胆 | D. 肾 |
| E. 三焦 | |

【答案】A

【解析】舌尖所候的脏腑是心、脾,舌边所候的脏腑是肝、胆,舌中所候的脏腑是脾胃,舌根所候的脏腑是肾。故本题选 A。

涉及考点 | 舌诊原理

27. 外感病如见舌色绛,多提示

- | | |
|---------|---------|
| A. 气分大热 | B. 上焦湿热 |
| C. 阴虚火旺 | D. 胃肠热甚 |
| E. 热入营血 | |

【答案】E

【解析】绛为深红色,较红舌颜色更深浓之舌称为绛舌主病,有外感与内伤之分。在外感病为热入营血。在内伤杂病为阴虚火旺。故本题选E。

涉及考点 | 绛舌

28. 月经先期的临床意义是

- A. 血海空虚
- B. 瘀血阻滞
- C. 阴寒凝滞
- D. 肝郁化热
- E. 阳气盛衰

【答案】D

【解析】月经先期多因气虚不固,或阳盛血热、肝郁血热、阴虚火旺,以致热扰冲任,血海不宁,或瘀阻胞络,络伤血瘀等所致。

涉及考点 | 经期异常

29. 结脉与代脉的主要区别在于

- A. 节律不同
- B. 至数不同
- C. 脉力不同
- D. 脉位不同
- E. 流利度不同

【答案】A

【解析】脉来缓而时一止,止无定数为结脉,主阴盛气结,寒痰血瘀,亦主气血虚衰;脉来一止,止有定数,良久方来为代脉,主脏气衰微,亦主风证,痛证,七情惊恐,跌打损伤。

涉及考点 | 常见脉象

30. 下列对表证与里证的鉴别表述最恰当的是

- A. 表证为新病,里证多为久病
- B. 表证病较轻浅,里证病较深重
- C. 表证寒热并见,里证寒热单见
- D. 表证起病较急,里证起病较缓
- E. 表证多为外感,里证皆属内伤

【答案】C

【解析】表证有表寒证、表热证、表虚证之分,表证主要见于外感疾病初期阶段,表证病位浅,正气未伤,病情轻。里证多见于外感病的中、后期阶段或内伤疾病之中,里证其起病可急可缓,与表证相比一般病情较重、病程较长,除表证和半表半里后,基本可诊断为里证。鉴别最恰当的是寒热并见或单见。

涉及考点 | 表证与里证

2年 易错考题

1. 渴喜热饮而量不多,或水入即吐多为

- A. 湿热内蕴
- B. 痰饮内停
- C. 营分热盛
- D. 阴虚津亏
- E. 瘀血内阻

【答案】B

【解析】渴喜热饮,饮水不多,多为痰饮内停证或阳虚水津不布。

涉及考点 | 问饮食

2.大便时干时稀是因

- | | |
|--------|--------|
| A.脾气虚 | B.脾阳虚 |
| C.食滞胃肠 | D.肝郁脾虚 |
| E.脾肾阳虚 | |

【答案】D

【解析】溏结不调即大便时干时稀的症状,多因肝郁脾虚所致。

涉及考点 | 望二便

3.滑脉、动脉二者脉象相似的特点是

- | | |
|--------|--------|
| A.脉形如豆 | B.来去俱盛 |
| C.来盛去衰 | D.往来流利 |
| E.脉率均快 | |

【答案】D

【解析】滑脉往来流利,如盘走珠,应指圆滑;动脉脉形如豆,厥厥动摇,滑数有力。两脉均见往来流利。

涉及考点 | 脉象

4.不具有短、滑、数3种脉象的特点是

- | | |
|------|------|
| A.动脉 | B.涩脉 |
| C.弦脉 | D.滑脉 |
| E.数脉 | |

【答案】B

【解析】动脉:脉形如豆,厥厥动摇,滑数有力;涩脉:脉细而缓,往来艰涩不畅,如轻刀刮竹;弦脉:端直以长、如按琴弦;滑脉:往来流利,如盘走珠,应指圆滑;数脉:脉来急促,一息五六至。

涉及考点 | 脉象

5.以下脉象中除哪项外均易出现于气血两虚证中

- | | |
|------|------|
| A.濡脉 | B.弱脉 |
| C.细脉 | D.涩脉 |
| E.虚脉 | |

【答案】D

【解析】涩脉临床见于气滞血瘀,精伤血少。

涉及考点 | 脉象

6.下列各项不属于面赤临床意义的是

- | | |
|--------|-------|
| A.肝火上炎 | B.阴虚证 |
| C.戴阳证 | D.实热证 |
| E.肾精久耗 | |

【答案】E

【解析】本题主要考查的是五色与疾病的关系。面赤多属于阳热有余或者阴虚不足。所以前四个选项都可以,但是肾精久耗一般情况多见黑色,因为五色中肾对应的是黑色。

涉及考点 | 五色与脏腑疾病的关系

第三章 中药学



高频考点必背

1. **四气**,指药物的**寒、热、温、凉**四种不同药性,又称四性,它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,是对药物治疗寒热病证作用的概括。
2. 寒凉药分别具有**清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化痰热、清心开窍、凉肝息风**等作用。
3. 温热药分别具有**温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原和回阳救逆**等作用。
4. 甘:有**补益、和中、调和药性和缓急止痛**的作用。
5. 苦:有**泄、燥湿和坚阴**的作用。即具有清泄火热、泄降气逆、通泻大便、燥湿、坚阴(泻火存阴)等作用。
6. 咸:有**软坚散结、泻下通便**作用。
7. 有些药物**酒制则升,姜炒则散,醋炒收敛,盐炒下行**。
8. **相须**就是两种功效相似的药物配合应用,可以增强原有药物的疗效。
9. **相使**就是以一种药物为主,另一种药物为辅,两种药物合用,辅药可以提高主药的功效。
10. **相畏**就是一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制。
11. “本草明言十八反,半蒺贝蔴及攻乌,藻戟遂芫俱战草,诸参辛芍叛藜芦。”
12. 硫黄畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛,丁香畏郁金,川乌、草乌畏犀角,牙硝畏三棱,官桂畏赤石脂,人参畏五灵脂。
13. **包煎**主要指那些黏性强、粉末状及带有绒毛的药物,宜先用纱布袋装好,再与其他药物同煎,如**蛤粉、滑石、青黛、旋覆花、车前子、蒲黄及灶心土**等。
14. **另煎**又称另炖,主要是指某些贵重药材,为了更好地煎出有效成分,还应单独另煎。煎液可以另服,也可与其他煎液混合服用。如人参、西洋参、羚羊角、麝香和鹿茸等。
15. 解表药大多**辛散轻扬,主人肺与膀胱经**,偏行肌表,能促进机体发汗,使表邪由汗而解,从而达到治愈表证、防止传变的目的。
16. 麻黄与桂枝均为辛温解表药,有发汗解表之功,治疗风寒表证,常相须为用。但**麻黄**发汗力强,多**用于风寒表实无汗证**,并有宣肺平喘、利尿消肿的作用;**桂枝**发汗力缓,外感风寒**有汗、无汗均可应用**。
17. **荆芥与防风**二药皆性微温,温而不燥,长于祛风解表,既可用于风寒表证,也可用于风热表证,二药常相须为用。
18. **白芷**长于止痛,且善**入足阳明胃经**,故阳明经前额头痛以及牙龈肿痛尤为多用。
19. **桑叶与菊花**二药均能疏散风热,平抑肝阳,清肝明目。但桑叶疏散风热之力较强;菊花则平肝明目之力较强。
20. 清热药根据其性能,主要分为**清热泻火、清热燥湿、清热凉血、清热解毒和清虚热**5类。
21. **石膏与知母**二药均能清热泻火,除烦止渴。**石膏**清解力强,**重在清泻火热**,并偏重于清泻肺胃实火;**知母**则**滋阴润燥力强**,重在滋润肺、胃、肾阴,常用于治疗阴虚火旺证。
22. 黄芩、黄连与黄柏,三药均能清热燥湿,泻火解毒。**黄芩善清上焦热邪**,并善清肺热;**黄**

连清热燥湿与泻火解毒力尤强,并善清中焦热邪,并善泻心火、清胃火;黄柏善清下焦热邪,并能退虚热。

23. 生地黄与玄参二药均能清热凉血,养阴生津,适用于热入营血、热病伤阴、阴虚内热等证。但玄参泻火解毒力强,可用于痈肿疮毒,咽喉肿痛证;生地黄清热凉血作用较强,故血热出血、内热消渴者多用。

24. 泻下药分为攻下药、润下药、峻下逐水药3类。泻下药多为沉降之品,主归大肠经。主要有泻下通便作用,以排除胃肠积滞和燥屎等,主要适用于大便秘结,胃肠积滞,实热内结及水肿停饮等里实证。

25. 祛风湿药物味多辛苦,性或温或凉,能祛留着于肌肉、经络、筋骨的风湿之邪,有的还兼有散寒、舒筋、通络、止痛、活血或补肝肾、强筋骨等作用。

26. 化湿药味辛香温燥,主入脾、胃经,能促进脾胃运化,消除湿浊,解除因湿浊引起的脾胃气滞,主治湿浊内阻,脾为湿困,运化失常所致的脘腹痞满、呕吐泛酸、大便溏薄、食少体倦、舌苔白腻等症。

27. 利水渗湿药味多甘淡,主归膀胱、小肠经,具有利水消肿、利尿通淋、利湿退黄之功,主要用于小便不利、水肿、泄泻、痰饮、淋证、黄疸、湿疮、带下、湿温等水湿所致的各种病证。

28. 茯苓与猪苓二药均能利水消肿,渗湿,常用于水肿、小便不利等证。然猪苓利水作用较强,无补益之功。而茯苓能健脾补中、养心安神,可治脾虚诸证和心神不安证。

29. 车前子与滑石均具有利尿通淋作用,用治湿热下注膀胱之小便淋漓涩痛。车前子还可渗湿止泻,明目,祛痰。滑石还可清热解暑,祛湿敛疮。

30. 附子煎服,3~15 g,本品有毒,宜先煎0.5~1小时,至口尝无麻辣感为度。

5年 历年真题

1. 下列药物中,具有截疟作用的是

- | | |
|-------|-------|
| A. 葛根 | B. 生地 |
| C. 石膏 | D. 知母 |
| E. 柴胡 | |

【答案】E

【解析】柴胡的功效是解表退热,疏肝解郁,升举阳气。此外,柴胡还有退热截疟的作用,又为治疗疟疾寒热的常用药。

涉及考点 | 柴胡的功效及应用

2. 具有温肾阳、温脾阳、温通血脉、引火归原功效的药物是

- | | |
|-------|--------|
| A. 附子 | B. 干姜 |
| C. 肉桂 | D. 吴茱萸 |
| E. 桂枝 | |

【答案】C

【解析】肉桂的功效是补火助阳,散寒止痛,温通经脉,引火归原。

涉及考点 | 肉桂的功效

3. 下列各项,与乌头相反的药物是

- | | |
|-------|-------|
| A. 甘草 | B. 海藻 |
| C. 人参 | D. 藜芦 |

E.天花粉

【答案】E

【解析】张子和在《儒门事亲》中记载了“十八反歌”：“本草名言十八反，半蒺贝藜及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦”里面提到与乌头相反的药物有贝母、瓜蒌、半夏、白及、白藜。天花粉是葫芦科植物瓜蒌的干燥根，属于瓜蒌类。其余几味药不属于与乌头相反的药物类别。

涉及考点 | “十八反”的内容

4.“十九畏”中，人参“畏”的是

A.三棱

B.朴硝

C.硫黄

D.五灵脂

E.密陀僧

【答案】D

【解析】十九畏歌：硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。可知人参畏五灵脂，故正确答案为选项D。

涉及考点 | “十九畏”的内容

5.下列各药中，入汤剂宜包煎的药物是

A.砂仁

B.沉香

C.磁石

D.五灵脂

E.天南星

【答案】D

【解析】砂仁为干燥的成熟果实，宜后下。沉香为含有树脂的木材，性味芳香辛散，入汤剂宜后下。磁石为矿石，宜打碎先煎。天南星为草本天南星的干燥块茎，无特殊煎法。五灵脂为复齿鼯鼠的干燥粪便，气味腥臭，服后易引起呕吐，故宜包煎。

涉及考点 | 煎煮方法

6.孕妇应慎用的药物是

A.金银花

B.连翘

C.牛黄

D.鱼腥草

E.蒲公英

【答案】C

【解析】某些药物有损害胎元以致堕胎的副作用，根据药物对胎元的损害程度不同，可分为慎用和禁用两大类。慎用的药物包括通经桂皮，行气破滞，辛热滑利之品，如桃仁、大黄等；牛黄为干燥的牛胆结石，可发生过敏反应，故应慎用。

涉及考点 | 妊娠禁忌药的分类与使用原则

7.一般幼儿的用药量是成人的

A.1/6

B.1/3

C.1/2

D.2/3

E.1/4

【答案】E

【解析】中药的剂量与年龄等因素相关，一般5岁以下的小儿用成人药量的1/4。

涉及考点 | 影响中药剂量的因素

8.既可用治外感风寒，又可用于外感风热的药物是

A.麻黄

B.防风

- C.桂枝
E.羌活
- D.紫苏

【答案】B

【解析】防风祛风解表,为治风之通用品,既可治疗外感风寒,亦可治疗外感风热。

涉及考点 | 防风的应用

9.下列解表药中兼有化湿和中功效的是

- A.紫苏
B.香薷
C.生姜
D.白芷
E.防风

【答案】B

【解析】以上五个备选答案均为解表药。紫苏解表散寒,行气宽中,解鱼蟹毒,生姜解表散寒,温中止呕,温肺止咳,解毒。白芷解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。防风祛风解表,胜湿止痛,止痉。香薷发汗解表,化湿和中,利水消肿,主治外感风寒,内伤湿邪之阴暑证,有“夏月麻黄”之称。

涉及考点 | 香薷的功效

10.薄荷与牛蒡子均具有的功效是

- A.疏散风热,透疹利咽
B.疏散风热,解毒消肿
C.疏肝解郁,利咽透疹
D.清利头目,疏肝解郁
E.利咽透疹,清利头目

【答案】A

【解析】两者都属于发散风热药,薄荷具有疏散风热,清利头目,利咽透疹,疏肝行气的功效。牛蒡子具有疏散风热,宣肺透疹,利咽解毒的功效。所有说两者疏散风热,透疹利咽。

涉及考点 | 薄荷与牛蒡子的功效

11.下列药物中能燥湿止带的是

- A.防风
B.白芷
C.羌活
D.苍耳子
E.藁本

【答案】B

【解析】防风祛风解表,胜湿止痛,解痉止泻。白芷解表散寒,祛风止痛,通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。羌活解表散寒,祛风湿,止痛。苍耳子发散风寒,通鼻窍,祛风湿,止痛。藁本祛风散寒,除湿止痛。故正确答案为选项B。

涉及考点 | 白芷的功效

12.下列各项不属于细辛功效的是

- A.宣通鼻窍
B.温肺化饮
C.祛风止痛
D.解表散寒
E.燥湿止带

【答案】E

【解析】细辛属于发散风寒药,其功效是解表散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮。A、B、C、D选项均包含在细辛的功效之内,E选项不符。

涉及考点 | 细辛的功效

13.夏枯草具有的功效是

- A.散结消肿
B.润肠通便

- C.祛风明目
E.清热利湿
- D.疏散风热

【答案】A

【解析】夏枯草有明目作用,但其机理在于泻肝火以明目,而不是祛风明目;只有散结消肿是夏枯草的功效。

涉及考点 | 夏枯草的功效

14.下列具有清热燥湿,杀虫,利尿功效的药

- A.茯苓
C.猪苓
E.皂荚
- B.槟榔
D.苦参

【答案】D

【解析】茯苓利水渗湿,健脾,宁心。槟榔杀虫消积,行气,利水,截疟。猪苓利水渗湿。苦参清热燥湿,杀虫,利尿。皂荚祛顽痰,通窍开闭,祛风杀虫。故正确答案为选项 D。

涉及考点 | 苦参的功效

15.可用于治疗小便不利的药物是

- A.金银花
C.苦参
E.龙胆
- B.大青叶
D.秦皮

【答案】C

【解析】这几味药都属于清热药,但苦参归心、肝、胃、大肠、膀胱经,具有清热燥湿,杀虫,利尿的功效,因此可治疗湿热小便不利。而金银花、大青叶属于清热解毒药,秦皮、龙胆虽属清热燥湿药,均不归膀胱经,也不用于治疗小便不利。故正确答案为选项 C。

涉及考点 | 苦参的主治病证

16.下列各项,不属于玄参主治病证的是

- A.温毒发斑
C.经闭痛经
E.目赤咽痛
- B.津伤便秘
D.痈肿疮毒

【答案】C

【解析】玄参临床应用于:①温邪入营,内陷心包,温毒发斑。②热病伤阴,津伤便秘,骨蒸劳嗽。③目赤咽痛,瘰疬,白喉,痈肿疮毒。所以本题答案是选项 C。

涉及考点 | 玄参的主治病证

17.治疗咳喘,水肿,应选用的药物是

- A.百部
C.五加皮
E.紫苏子
- B.紫菀
D.桑白皮

【答案】D

【解析】百部主治功效是润肺止咳,杀虫灭虱。紫菀主治功效是润肺下气,止咳化痰。五加皮主治功效是祛风湿,补肝肾,强筋骨,利水。桑白皮主治功效是泻肺平喘,利水消肿。紫苏子主治功效是降气化痰,止咳平喘,润肠通便。所以本题排除 A、B、C、E 四个选项,正确答案是选项 D。

涉及考点 | 桑白皮的主治病证

18.治疗痰饮喘咳,应选用的药物是

- A.佩兰
B.苍术

- C.藿香
E.厚朴

D.砂仁

【答案】E

【解析】佩兰主治功效为化湿,解暑。苍术主治功效为燥湿健脾,祛风散寒。藿香主治功效为化湿,止呕,解暑。砂仁主治功效为化湿行气,温中止泻,安胎。厚朴主治功效为燥湿消痰,下气除满。所以本题排除 A、B、C、D 四个选项,正确答案为选项 E。

涉及考点 | 厚朴的主治病证

19.治疗亡阳证,寒饮喘咳,应选用的药物是

- A.附子
C.干姜
E.小茴香

- B.肉桂
D.吴茱萸

【答案】C

【解析】附子主治功效为回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。肉桂主治功效为补火助阳,散寒止痛,温通经脉,引火归元。干姜温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。吴茱萸主治功效为散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。小茴香主治功效为散寒止痛,理气和胃。所以本题排除 A、B、D、E 四个选项,正确答案为选项 C。

涉及考点 | 干姜的主治病证

20.薤白的主治病证是

- A.肝郁气滞
C.虫积腹痛
E.胃寒呕吐

- B.肺热咳嗽
D.胸痹心痛

【答案】D

【解析】薤白的主治功效为通阳散结,行气导滞,临床应用于胸痹心痛;脘腹胃痞胀痛,泻痢里急后重。所以本题正确答案为选项 D。

涉及考点 | 薤白的主治病证

21.炒用多用于回乳消胀的药物是

- A.山楂
C.麦芽
E.鸡内金

- B.神曲
D.莱菔子

【答案】C

【解析】选项 A 炒山楂用于止泻止痛。选项 B 炒神曲用于消食和胃。选项 C 炒麦芽多用于回乳消胀。选项 D 炒莱菔子消食除胀,降气化痰。选项 E 鸡内金用于消食健胃,涩精止遗。所以本题正确答案为选项 C。

涉及考点 | 麦芽的主治病证

22.下列各项,不属于槟榔功效的是

- A.消积
C.利水
E.止血

- B.行气
D.截疟

【答案】E

【解析】槟榔的功效有杀虫消积、行气、利水、截疟,而无止血功效。

涉及考点 | 槟榔的功效

23.乳香具有的功效是

- A. 消肿生肌
B. 祛风止痛
C. 化瘀止血
D. 凉血消痈
E. 清利湿热

【答案】A

【解析】乳香的功效是活血行气止痛、消肿生肌。

涉及考点 | 乳香的功效

24. 患者因失眠就诊,伴视物不清,听力下降,时常耳鸣,治疗应选用的药物是

- A. 龙骨
B. 磁石
C. 朱砂
D. 远志
E. 酸枣仁

【答案】B

【解析】磁石可以入肝、心、肾三经,有镇静安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘的功效。可以治疗耳鸣、耳聋和视物昏花,例如耳聋左慈丸。常常与枸杞子、女贞子、菊花配用。

涉及考点 | 磁石的功效

25. 芒硝具有的功效是

- A. 润燥软坚
B. 去积杀虫
C. 峻下冷积
D. 活血化瘀
E. 泄水逐饮

【答案】A

【解析】芒硝的功效为泻下攻积、润燥软坚、清热消肿。所以本题正确答案为选项 A。

涉及考点 | 芒硝的功效

26. 宜包煎,可用治淋证,目赤肿痛的药物是

- A. 薏苡仁
B. 海金沙
C. 车前子
D. 蒲黄
E. 石韦

【答案】C

【解析】车前子主治:①淋证,水肿。②泄泻。③目赤肿痛,目暗昏花,翳障。④痰热咳嗽。服用方法:煎服。宜包煎。

涉及考点 | 车前子主治及煎煮方法

27. 药性辛、热,为温暖中焦的主药是

- A. 干姜
B. 附子
C. 肉桂
D. 生姜
E. 吴茱萸

【答案】A

【解析】干姜辛热燥烈,主入脾胃而长于温中散寒、健运脾阳,为温暖中焦之主药。选项 B 附子辛、甘,大热,能上助心阳、中温脾阳、下补肾阳;选项 C 肉桂辛、甘,大热,能补火助阳,益阳消阴,为治命门火衰之要药;选项 D 生姜能治脾胃虚寒、呕吐,为“呕家圣药”;选项 E 吴茱萸辛、苦,热,能散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。

涉及考点 | 干姜的性味和功效

28. 具有行气止痛功效的药物是

- A. 川楝子、乌药
B. 大腹皮、陈皮
C. 佛手、陈皮
D. 香附、沉香

E.陈皮、青皮

【答案】A

【解析】选项 A 川楝子具有行气止痛,杀虫之功效;乌药有行气止痛,温肾散寒之功效。选项 B 大腹皮有行气宽中,利水消肿之功效;陈皮有理气健脾,燥湿化痰之功效。选项 C 佛手有疏肝解郁,理气和中,燥湿化痰之功效;陈皮有理气健脾,燥湿化痰之功效。选项 D 香附有疏肝解郁,调经止痛,理气调中之功效;沉香有行气止痛,温中止呕,纳气平喘。选项 E 陈皮有理气健脾,燥湿化痰之功效;青皮具有疏肝破气,消积化滞之功效。

涉及考点 | 川楝子、乌药的功效

29.大青叶具有的功效是

A.清热燥湿,泻火解毒

B.清热解毒,凉血消斑,清肝泻火,定惊

C.清热解毒,凉血消斑

D.清热解毒,凉血,利咽

E.清热解毒,利咽喉,散肿止痛

【答案】C

【解析】大青叶属于清热解毒药,其功效是清热解毒,凉血消斑,A、B、D、E 四个选项均与题意不符。

涉及考点 | 大青叶的功效

30.贯众具有的功效是

A.止血

B.止泻

C.止呕

D.止咳

E.止痒

【答案】A

【解析】贯众清热解毒、凉血止血、杀虫。并无止泻、止呕、止咳、止痒之功。

涉及考点 | 贯众的功效

2年 易错考题

(1~2 题共用备选答案)

A.山茱萸

B.五倍子

C.莲子

D.诃子

E.金樱子

1.具有补脾止泻,养心安神功效的药物是

【答案】C

2.具有益肾固精,养心安神功效的药物是

【答案】C

【解析】山茱萸补益肝肾,收敛固涩;五倍子敛肺降火,止咳止汗,涩肠止泻,固精止遗,收敛止血,收湿敛疮;莲子补肾固精缩尿,补脾止泻止带,养心安神;诃子敛肺止咳,利咽开音,涩肠止泻;金樱子固精缩尿止带,涩肠止泻。

涉及考点 | 莲子的功效

(3~4 题共用备选答案)

A.肝、脾经

B.肝、肾经

C.肺、肝、肾经

D.心、脾经

E.肝、心、肾经

3.熟地的归经是

【答案】B

4.白芍的归经是

【答案】A

【解析】熟地和白芍都属于补血药,但是归经不同,功效也不同。熟地归肝、肾经,功效是补血养阴,填精益髓;白芍归肝、脾经,功效是养血敛阴,柔肝定痛,平抑肝阳。

涉及考点 | 熟地、白芍的性味

(5~6 题共用备选答案)

A.祛寒除湿

B.祛风止痒

C.益肝明目

D.活血止痛

E.温脾止泻

5.补骨脂具有的功效是

【答案】E

6.仙茅具有的功效是

【答案】A

【解析】补骨脂补肾助阳,固精缩尿,温脾止泻,纳气平喘。仙茅温肾壮阳,祛寒除湿。

涉及考点 | 补骨脂、仙茅的功效

(7~8 题共用备选答案)

A.补肾助阳,固精缩尿,养肝明目

B.补肺益肾,纳气平喘,助阳益精

C.补肾阳,强筋骨,祛寒湿

D.补肾阳,强筋骨,祛风湿

E.补肝肾,强筋骨,止崩漏

7.沙苑子的功效是

【答案】A

8.淫羊藿的功效是

【答案】D

【解析】沙苑子和淫羊藿都属于补阳药。沙苑子药性甘,温,归肝、肾经,功效是补肾固精,养肝明目;淫羊藿药性辛、甘,温,归肾、肝经,功效是补肾壮阳,祛风除湿。

涉及考点 | 沙苑子、淫羊藿的功效

(9~10 题共用备选答案)

A.合欢皮

B.酸枣仁

C.远志

D.琥珀

E.磁石

9.既能活血消肿,又能解郁安神的药物是

【答案】A

10.既能活血散瘀,又能镇惊安神的药物是

【答案】D

【解析】合欢皮解郁安神,活血消肿;酸枣仁养心益肝,安神,敛汗;远志宁心安神,祛痰开窍,消散痈肿;琥珀镇惊安神,活血散瘀,利尿通淋;磁石镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气定喘。

涉及考点 | 合欢皮、琥珀的功效

第四章 方剂学



高频考点必背

1.方剂与治法之间的关系表现为“**以法组方**”“**以法遣方**”“**以法类方**”“**以法释方**”等四方面,而这四方面又可以简单概括为“**以法统方**”。

2.常用治法主要是**汗、吐、下、和、温、清、消、补**八法。

3.方剂的组成方法有君臣**佐使配伍**、**气味配伍**、**升降开合配伍**等。

4.君臣佐使配伍的方法是:

(1)君药:即针对**主病**或**主证**起**主要治疗**作用的药物。

(2)臣药有两种意义。①**辅助君药**加强治疗主病或主证的药物。②**针对重要的兼病或兼证**起主要治疗作用的药物。

(3)佐药有三种意义。①**佐助药**,即配合君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物。②**佐制药**,即用以消除或减弱君、臣药物的毒性,或能制约君、臣药物峻烈之性的药物。③**反佐药**,即病重邪甚,可能拒药时,配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物,以防止药病格拒。

(4)使药有两种意义。①**引经药**,即能引方中诸药至特定病所的药物。②**调和药**,即具有调和方中诸药作用的药物。

5.方剂的变化形式:①**药味**增减的变化。②**药量**增减的变化。③**剂型**更换的变化

6.解表剂主要适用于表证。多以辛散轻扬药物为主组方,不宜久煎,以免药性耗散,作用减弱。

7.麻黄汤中桂枝**既能**助麻黄**解表**,使发汗之力倍增;**又能畅行营阴**,使疼痛之症得解。麻黄、桂枝两药相须为用,是辛温发汗的常用组合。麻黄汤为辛温发汗之峻剂,是治疗外感风寒表实证的基础方。

8.桂枝汤主治:外感风寒表虚证。桂枝与芍药用量相等(1:1),寓意有三:一为针对营卫失调病机,体现营卫同治,祛邪扶正,邪正兼顾之意;二为相辅相成,桂枝得芍药相助则汗出有源,芍药得桂枝相助则滋而能化;三为相制相成,**散中有收,汗中寓补**。

9.九味羌活汤中细辛善止少阴头痛,白芷善解阳明头痛,川芎长于止少阳、厥阴头痛,此三味与羌活、苍术合用,为本方“**分经论治**”的基本结构。

10.半夏白术天麻汤主治:**风痰上扰证**。李东垣《脾胃论》云:“足太阴痰厥头痛,非半夏不能疗;眼黑头眩,风虚内作,非天麻不能除。”本方是在**二陈汤**燥湿化痰的基础上,加入健脾燥湿之**白术**、平肝息风之**天麻**而组成。

11.银翘散主治:温病初起。本方所用药物均系轻清之品,用法强调“香气大出,即取服,勿过煮”,体现了吴氏“**治上焦如羽,非轻莫举**”的用药原则。《温病条辨》称本方为“**辛凉平剂**”,是治疗外感风热表证的常用方。

12.麻黄杏仁甘草石膏汤主治:外感风邪,邪热壅肺证。麻黄与石膏相配,一辛温,一辛寒,一以宣肺为主,一以清肺为主,俱能透邪于外,合用则相反之中寓有相辅之意,消除致病之因,调理肺的宣发功能;由于本方石膏用量倍于麻黄,仍不失为**辛凉之剂**。

13.败毒散主治:气虚,外感风寒湿表证。川芎行气活血,并能祛风;柴胡解肌透邪,并能行

气。二药既可助君药解表逐邪,又可行气活血以加强宣痹止痛之力。

14.大承气汤主治:①阳明腑实证。②热结旁流证。乃属“**通因通用**”之法。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。为“**寒因寒用**”。

15.保和丸主治:**食积证**。方中重用山楂,能消一切饮食积滞,善于消肉食之积,为君药。**神曲**消食健脾,善于化酒食陈腐油腻之积;**莱菔子**下气消食除胀,善于消谷面之积,共为臣药。

16.温脾汤主治:阳虚冷积证。本方由温补脾阳药与寒下攻积药配伍组成,温通、泻下、补益三法兼备,温阳以祛寒、攻下不伤正,共奏攻下冷积、温补脾阳之功。

17.麻子仁丸主治:**脾约证**。蜂蜜,既助麻子仁润肠通便,又可缓和承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便,取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等,一则益阴增液以润肠通便,二则甘润可减缓小承气汤攻下之力。

18.济川煎主治:肾阳虚弱,精津不足证(肾虚便秘)。本方既可温肾益精治其本,又能润肠通便以治标,用药灵巧,补中有泻,降中有升,**寓通于补之中,寄降于升之内**。

19.乌梅丸主治:脏寒蛔厥证。脘腹阵痛,烦闷呕吐,时发时止,得食则吐,甚则吐蛔,手足厥冷,或久泻久痢。柯琴说“蛔得酸则静,得辛则伏,得苦则下”配伍特点:酸苦辛并进,使蛔虫“**得酸则静,得辛则伏,得苦则下**”;寒热并用,邪正兼顾。

20.四逆散主治:①阳郁厥逆证。手足不温,或腹痛,或泄利下重,脉弦。②肝脾气郁证。胁肋胀闷,脘腹疼痛,脉弦。

5年 历年真题

1.下列各项中,不属于“和法”范畴的是

- | | |
|--------|--------|
| A.透达膜原 | B.疏肝和胃 |
| C.分消上下 | D.调和营卫 |
| E.消食和胃 | |

【答案】E

【解析】选项 ABCD 都属于“和法”。“和法”是指通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃、表里双解等。

涉及考点 | 方剂学“八法”

2.病证较重或病情不稳定的患者宜选用的药物是

- | | |
|------|------|
| A.丸剂 | B.散剂 |
| C.汤剂 | D.针剂 |
| E.丹剂 | |

【答案】C

【解析】选项 A 吸收较慢,药效持久,节省药材,便于服用与携带。选项 B 是将药物粉碎,混合均匀后所制成粉末状的制剂。散剂制作简便,吸收较快,节省药材,便于服用及携带。选项 C 吸收快,能迅速发挥药效;而且可以根据病情需要进行加减,能照顾每个患者或具体病变的不同阶段,因而多适用于病证较重或病情不稳定的患者。选项 D 和 E 不在大纲范围内选项。

涉及考点 | 剂型的应用

3.由大承气汤化裁为小承气汤属于

- | | |
|--------------------|-----------|
| A.药味加减与药量增减变化的联合运用 | B.剂型更换的变化 |
|--------------------|-----------|

- C.药味加减的变化
D.药量增减的变化
E.药味加减与剂型更换变化的联合运用

【答案】A

【解析】方剂的变化形式有三种,药量增减、药味加减及剂型更换。大承气汤化裁为小承气汤是前两种变化均有。

涉及考点 | 方剂的组成与变化

4.桂枝汤中桂枝与芍药的比例为

- A.1 : 1
B.3 : 1
C.5 : 1
D.4 : 1
E.7 : 1

【答案】A

【解析】桂枝汤中桂枝9g,芍药9g,两药比例为1 : 1。桂芍等量合用的寓意有三:一为针对卫强营弱,体现营卫同治,邪正兼顾;二为相辅相成,桂枝得芍药,使汗有源,芍药得桂枝,则滋而能化;三为相制相成,散中有收,汗中寓补。

涉及考点 | 桂枝汤的配伍意义

5.下列各项中,麻黄用量最大的方剂是

- A.麻黄汤
B.大青龙汤
C.小青龙汤
D.麻杏石甘汤
E.麻黄细辛附子汤

【答案】B

【解析】麻黄附子细辛汤麻黄二两,麻黄汤、小青龙汤中麻黄三两,麻杏石甘汤中麻黄四两,唯大青龙汤麻黄六两,因其治风寒表实重证兼里有郁热者,需倍用麻黄,增强发汗之功。

涉及考点 | 大青龙汤的组成药物

6.被称为“辛凉平剂”的方剂是

- A.桂枝汤
B.麻杏石甘汤
C.白虎汤
D.桑菊饮
E.银翘散

【答案】E

【解析】《温病条辨》称银翘散为“辛凉平剂”,是治疗风温初起之常用方。“辛凉轻剂”为桑菊饮,“辛凉重剂”为白虎汤。

涉及考点 | 银翘散的运用

7.大黄牡丹汤的功用是

- A.攻下冷积,温补脾阳
B.润肠泄热,行气通便
C.温里散寒,通便止痛
D.泻热破瘀,散结消肿
E.泻热通便,补益气血

【答案】D

【解析】本方治疗肠痈初起,湿热瘀滞证。正如方名,大黄、牡丹皮共为本方君药,大黄苦寒攻下,泻热逐瘀,荡涤肠中湿热瘀结之毒;丹皮苦辛微寒,能清热凉血,活血化瘀,两药合用,泻热破瘀。

涉及考点 | 大黄牡丹汤的功用

8.主治“脾约”的方剂是

- A.温脾汤
B.健脾丸
C.归脾汤
D.实脾散
E.麻子仁丸

【答案】E

【解析】麻子仁丸主治“脾约”证。即肠胃燥热，脾约便秘证。蜂蜜，既助麻子仁润肠通便，又可缓和小承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便，取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等，一则益阴增液以润肠通便，二则甘润可减缓小承气攻下之力。

涉及考点 | 麻子仁丸的主治

9.大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是

- A.清热泻火，导热下行
B.清泻瘀热，分利二便
C.荡涤胃肠，泻热泻结
D.泻热除湿，通肠逐瘀
E.通肠泻热，以下代清

【答案】D

【解析】大黄牡丹汤可荡涤肠间湿热蕴结之毒，其意在泻肠中湿热，祛肠之瘀血。

涉及考点 | 大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义

10.逍遥散所主证候的病机要点是

- A.肝血不足，疏泄失常
B.肝气郁滞，耗伤阴血
C.肝郁血虚，脾失健运
D.营血虚滞，肝失疏泄
E.阴虚肝郁，横犯脾胃

【答案】C

【解析】逍遥散属于调和肝脾剂，有疏肝解郁，养血健脾的功效，可以治疗肝郁血虚脾弱证。

涉及考点 | 逍遥散的主治

11.往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦，治症宜首选的方剂是

- A.逍遥散
B.四逆散
C.大柴胡汤
D.小柴胡汤
E.半夏泻心汤

【答案】D

【解析】选项 A 主治肝郁血虚脾弱证。两胁作痛，寒热往来，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，月经不调，乳房作胀，脉弦而虚。选项 B 主治：①阳郁厥逆证。手足不温，或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者。②肝脾气郁（肝气乘脾）。胁肋胀闷，脘腹疼痛，脉弦。选项 C 主治少阳+阳明病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下满痛或心下痞硬，大便不解，舌苔黄，脉弦数有力。选项 D 主治：①伤寒少阳证。往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，苔白，脉弦。②妇人伤寒，热入血室，经水适断，寒热发作有时。③疟疾、黄疸以及内伤杂病而见少阳证等。选项 E 主治寒热错杂之痞证。心下痞，但满而不痛，呕吐，或肠鸣下利，舌苔薄腻而微黄。

涉及考点 | 小柴胡汤的主治证候

12.具有清胆利湿，和胃化痰功用的是

- A. 蒿芩清胆汤
B. 截疟七宝饮
C. 四逆散
D. 逍遥散
E. 小柴胡汤

【答案】A

【解析】蒿芩清胆汤主治少阳湿热痰浊证。方用青蒿清透少阳邪热，黄芩燥湿清胆热，共为君药。竹茹清胆胃之热，化痰止呕；枳壳下气宽中，除痰消痞；半夏燥湿化痰，和胃降逆；陈皮理气化痰，宽胸畅膈，共为臣药。赤茯苓、碧玉散清热利湿，为佐使药。诸药合用，达清胆利湿，和胃化痰之功。

涉及考点 | 蒿芩清胆汤的功用

13. 半夏泻心汤组成的药物中，除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有
- A. 黄连、黄柏
B. 栀子、连翘
C. 黄连、黄芩
D. 柴胡、枳壳
E. 黄芩、黄柏

【答案】C

【解析】本题考查的是重点方剂的组成。半夏泻心汤由半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣、黄芩、黄连组成。

涉及考点 | 半夏泻心汤配伍意义

14. 和解少阳的代表方剂是
- A. 四逆散
B. 逍遥散
C. 小柴胡汤
D. 大柴胡汤
E. 半夏泻心汤

【答案】C

【解析】小柴胡汤属于和解少阳的代表方，也是治疗少阳病证的基础方，可以治疗伤寒少阳证，妇人中风，热入血室，疟疾、黄疸等少阳证。

涉及考点 | 小柴胡汤的功用

15. 玉屏风散中黄芪配防风的意义，哪项不适合
- A. 调和营卫
B. 祛邪不伤正
C. 补中有散
D. 固表不留邪
E. 散中有收

【答案】A

【解析】黄芪和防风都为气分用药，调和营卫不是其配伍意义。

涉及考点 | 玉屏分散的配伍意义

16. 四逆散与四逆汤的组成中均含有的药物是
- A. 茯苓
B. 附子
C. 白术
D. 甘草
E. 人参

【答案】D

【解析】四逆散的组成：柴胡、枳实、芍药、甘草；四逆汤的组成：附子、干姜、甘草。两方中共同含有的药物是甘草。

涉及考点 | 四逆散与四逆汤的组成药物

17. 主治肝郁血虚脾弱证的方剂是

- A. 蒿芩清胆汤
B. 痛泻要方
C. 逍遥散
D. 小柴胡汤
E. 大柴胡汤

【答案】C

【解析】蒿芩清胆汤主治少阳湿热证。痛泻要方主治脾虚肝旺之痛泻。逍遥散主治肝郁血虚脾弱证。小柴胡汤主治：①伤寒少阳证。②热入血室证。③黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证。大柴胡汤主治少阳阳明合病。

涉及考点 | 逍遥散的主治证候

18. 清营汤证中舌象应是

- A. 舌绛起刺
B. 舌绛苔干
C. 舌绛苔滑
D. 舌绛苔白
E. 舌绛苔腻

【答案】B

【解析】清营汤主治热入营分证，舌绛苔干。

涉及考点 | 清营汤主治

19. 具有“透热转气”之功的方剂是

- A. 白头翁汤
B. 黄连解毒汤
C. 清瘟败毒饮
D. 清营汤
E. 犀角地黄汤

【答案】D

【解析】白头翁汤主治热毒痢疾。黄连解毒汤主治三焦火毒证。清瘟败毒散主治温疫热毒，气血两燔证。清营汤主治热入营分证，方以金银花、连翘、竹叶清热解毒，轻宣透泄，为“透热转气”的代表药物。犀角地黄汤主治热入血分证。

涉及考点 | 清营汤的全方配伍特点

20. 患者证见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。治宜选用的方剂是

- A. 大补阴丸
B. 清骨散
C. 右归饮
D. 六味地黄丸
E. 当归六黄汤

【答案】A

【解析】大补阴丸在补阴之中有强劲的清热泻火之力，所用药物是知母、黄柏。实为补泻同施。清骨散纯为清虚热之品组成，无补；六味地黄丸的主治与大补阴丸的主治十分接近，也是有补有泻，但是虚热不是十分亢进，即骨蒸潮热还不是很突出；右归饮补阳，完全不能使用；当归六黄汤治疗表虚而内有实火之证。

涉及考点 | 大补阴丸的主治

21. 黄连解毒汤的功用是

- A. 泻火通便
B. 清上泄下
C. 泻火解毒
D. 清热生津
E. 清热燥湿

【答案】C

【解析】黄连解毒汤属于清热解毒剂，具有泻火解毒的功效，可以治疗三焦火毒热盛证。

涉及考点 | 黄连解毒汤的功用

22. 瓜蒌根在仙方活命饮中的主要治疗作用是

- A. 生津止渴
- B. 清热润燥
- C. 清热散结
- D. 解毒消瘀
- E. 消肿生肌

【答案】C

【解析】仙方活命饮主治疮疡肿毒初起，配伍瓜蒌根意在清热散结。

涉及考点 | 瓜蒌根在仙方活命饮中的主要治疗作用

23. 患者，牙痛剧烈，痛引面颊，伴口气热臭，面颊发热，舌红苔黄脉滑数。治宜选用

- A. 玉女煎
- B. 白虎汤
- C. 清胃散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

【答案】C

【解析】根据患者的临床表现可以辨证出是胃火亢盛。方用清胃散：方中升麻，一取其清热解毒，以治胃火牙痛；一取其轻清升散透发，可宣达郁遏之伏火，有“火郁发之”之意。

涉及考点 | 清胃散的主治证候

24. 患儿，男，2岁。气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数，治宜选用

- A. 左金丸
- B. 葶苈汤
- C. 泻白散
- D. 麻杏甘石汤
- E. 以上都不适宜

【答案】C

【解析】选项 A 主治肝火犯胃；选项 B 主治肺痛；选项 C 主治小儿气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数；选项 D 主治表寒肺热。所以本题选择 C 选项。

涉及考点 | 泻白散的主治

25. 配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性的是

- A. 左金丸
- B. 蒿芩清胆汤
- C. 清骨散
- D. 清胃散
- E. 泻白散

【答案】E

【解析】泻白散中桑白皮甘寒性降，清泻肺热，止咳平喘，为君。地骨皮甘寒入肺，清降肺中伏火，为臣。炙甘草、粳米养胃和中，为佐使。本方配伍主以甘寒，清中有润，泻中寓补，培土生金，祛邪不伤正，清泻肺中伏火以适稚阴娇脏之性。

涉及考点 | 泻白散的配伍意义

26. 清暑益气汤的君药是

- A. 粳米、竹叶
- B. 石斛、麦冬
- C. 西洋参、石斛
- D. 荷梗、知母
- E. 西瓜翠衣、西洋参

【答案】E

【解析】本方主治暑热气津两伤证。方中西瓜翠衣清热解暑,西洋参益气生津,养阴清热,共为君药。荷梗助西瓜翠衣清热解暑;石斛、麦冬助西洋参养阴生津,共为臣药。黄连苦寒泻火,以助清热祛暑之功;知母苦寒质润,泻火滋阴;竹叶甘淡,清热除烦,共为佐药。甘草、粳米益胃和中,为使药。

涉及考点 | 清暑益气汤的配伍意义

27.胸胁支满,目眩心悸,或短气而咳,舌苔白滑,脉弦滑,治宜选用

- A.平胃散
- B.苓桂术甘汤
- C.实脾散
- D.真武汤
- E.藿香正气散

【答案】B

【解析】苓桂术甘汤功能温阳化饮,健脾利湿。主治中阳不足之痰饮证。症见胸胁支满,目眩心悸,或短气而咳,舌苔白滑,脉弦滑。

涉及考点 | 苓桂术甘汤功能主治

28.理中丸除温中祛寒外,还具有的功用是

- A.和中缓急
- B.和胃止呕
- C.降逆止痛
- D.养血通脉
- E.补气健脾

【答案】E

【解析】理中丸温中祛寒、补气健脾。无和中缓急、止呕、止痛、养血之功,排除A、B、C、D。

涉及考点 | 理中丸的功用

29.吴茱萸汤中吴茱萸的作用是

- A.温胃暖肝,降逆止呕
- B.温中补虚,和胃止呕
- C.疏肝解郁,和胃止呕
- D.温肾暖肝,降逆止呕
- E.温中补虚,疏肝解郁

【答案】A

【解析】吴茱萸汤主治肝胃虚寒,浊阴上逆证。方中吴茱萸味辛苦性热,归肝、脾、胃、肾经,上可温胃散寒,下可温暖肝肾,又能降逆止呕,一药而三经并治,《金镜内台方义》谓“吴茱萸能下三阴之逆气”,故以为君。

涉及考点 | 吴茱萸汤的配伍意义

30.手足厥寒,或腰、股、腿、足、肩臂疼痛,口不渴,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝,治疗宜选

- A.参附汤
- B.当归四逆汤
- C.金匮肾气丸
- D.活血逐瘀汤
- E.六味地黄汤

【答案】B

【解析】当归四逆汤温经散寒,养血通脉,主治血虚寒厥证。由营血虚弱,寒凝经脉,血行不利所致。素体血虚又经脉受寒,寒邪凝滞,血行不利,阳气不能达于四肢末端,营血不能充盈血脉,遂手足厥寒、脉细欲绝。

涉及考点 | 当归四逆汤的主治证候

2年 易错考题

1. 主治外感风寒湿邪, 内有蕴热证的方剂是

- A. 败毒散
- B. 九味羌活汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 柴葛解肌汤
- E. 麻黄杏仁甘草石膏汤

【答案】B

【解析】九味羌活汤以羌活为君, 散表寒, 祛风湿, 利关节, 止痹痛, 为治太阳风寒湿邪在表之要药。以苍术、防风解表除湿为臣。细辛、白芷、川芎“分经论治”头痛, 生地、黄芩清泄里热, 以上五味俱为佐药。甘草调和为使。诸药配伍, 既兼治内外, 又属六经, 协调表里而成发汗祛湿, 兼清里热之剂。

涉及考点 | 九味羌活汤的主治证候

2. 银翘散中辛而微温, 协君药开皮毛以助祛邪的是

- A. 薄荷、桔梗
- B. 芦根、竹叶
- C. 薄荷、牛蒡子
- D. 荆芥穗、淡豆豉
- E. 金银花、连翘

【答案】D

【解析】银翘散于辛凉之中配伍少量辛温之品。荆芥穗、淡豆豉辛而微温, 解表散邪, 虽属辛温, 但辛而不烈, 温而不燥, 配入辛凉解表方中, 增强辛散透表之力, 是为去性取用之法。

涉及考点 | 银翘散的配伍意义

3. 四逆散配伍中体现“一升一降, 升清降浊”作用的药物是

- A. 柴胡、芍药
- B. 甘草、枳实
- C. 枳实、芍药
- D. 柴胡、甘草
- E. 柴胡、枳实

【答案】E

【解析】四逆散中柴胡入肝胆经, 升发阳气, 疏肝解郁, 透邪外出, 为君药。佐以枳实理气解郁, 泄热破结, 与柴胡为伍, 一升一降, 加强舒畅气机之功, 并奏调和肝脾之效。

涉及考点 | 四逆散的配伍意义

4. 清营汤主治证候所见的热象是

- A. 但热不寒
- B. 往来寒热
- C. 夜热早凉
- D. 身热夜甚
- E. 日晡潮热

【答案】D

【解析】清营汤治热入营分证。邪热传营, 伏于阴分, 入夜阳气内归于营阴, 与热相合, 故身热夜甚。

涉及考点 | 清营汤的主治证候

5. 体现叶天士“入血就恐耗血动血, 直须凉血散血”的方剂是

- A. 清营汤
- B. 芍药汤
- C. 白虎汤
- D. 黄连解毒汤

E.犀角地黄汤

【答案】E

【解析】犀角地黄汤治热入血分证。热入血分，一则热扰心神；二则热邪迫血妄行，血不循经，溢于脉外则出血，离经之血则为瘀血；三则血分热毒耗伤血中津液，而成瘀。此时不清其热则血不宁，不散其血则瘀不去，不滋其阴则火不熄，故叶天士所谓“入血就恐耗血动血，直须凉血散血”，故组方配伍当以清热解毒，凉血散瘀为法。

涉及考点 | 犀角地黄汤的配伍意义

6.仙方活命饮中的君药是

- | | |
|-------|-------|
| A.赤芍 | B.当归 |
| C.陈皮 | D.天花粉 |
| E.金银花 | |

【答案】E

【解析】仙方活命饮主治痈疡肿毒初起。方中金银花善清热解毒疗疮，乃“疮疡圣药”，重用为君。

涉及考点 | 仙方活命饮的配伍意义

7.治疗凉燥的代表方剂是

- | | |
|--------|-------|
| A.银翘散 | B.桂枝汤 |
| C.香薷散 | D.杏苏散 |
| E.小青龙汤 | |

【答案】D

【解析】杏苏散属于清宣外燥剂，有清宣凉燥，理肺化痰的功效。可以治疗外感凉燥证。

涉及考点 | 杏苏散的主治证候

8.下列各项中，既能治疗自汗又能治疗盗汗的是

- | | |
|---------|-------|
| A.四物汤 | B.归脾汤 |
| C.六味地黄丸 | D.肾气丸 |
| E.镇肝息风汤 | |

【答案】B

【解析】归脾汤主治心脾气血两虚证之心悸怔忡，健忘失眠，盗汗食少；脾不统血证之便血，紫癜，崩漏，月经提前，或淋漓不止。其出处《正体类要》所写主治尚有跌仆损伤，自汗，大便不调。

涉及考点 | 归脾汤的主治

9.配伍中体现“阳中求阴”之法的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.百合固金汤 | B.八珍汤 |
| C.左归丸 | D.清瘟败毒饮 |
| E.右归丸 | |

【答案】C

【解析】左归丸是张介宾由六味地黄丸化裁而成，去“三泻”，加入枸杞、龟板胶、牛膝加强滋补肾阴之力，又加入鹿角胶、菟丝子温润之品。以补阳益阴，阳中求阴，即所谓“善补阴者，必阳中求阴，则阳得阴生而泉源不竭”之义。配伍特点为纯补无泻，阳中求阴。

涉及考点 | 左归丸的全方配伍特点

第五章 中医内科学



高频考点必背

1. 感冒四季均可发生,尤以**冬春两季**为多。
2. 感冒的基本病机是**卫表不和,肺失宣肃**。感冒病位在**肺卫**,主要在**卫表**。
3. 感冒临床常见**风寒、风热、暑湿**三证。
4. 感冒病程一般**3~7**日,普通感冒多不传变,时行感冒多呈**流行性**。
5. 感冒首先应辨别**普通、时行感冒**;其次须辨别**虚体、实体感冒**。
6. 感冒的病位在卫表肺系,治疗应因势利导,从表而解,采用**解表达邪**的治疗原则。
7. 感冒实证初期一般**忌用补敛之品**,以免留邪。
8. 咳嗽的基本病机为**邪犯于肺,肺气上逆**。
9. 咳嗽的病理因素主要为“**痰**”与“**火**”,病理性质多为虚实夹杂。
10. 咳嗽的病位在肺,与**肝、脾**有关,久则及**肾**。
11. 咳嗽首先应辨**外感、内伤**,其次要辨**虚实**,最后辨**咳嗽、痰液**的特点。
12. 咳声**粗浊**者,多为风热或痰热伤津所致。
13. 外感咳嗽,多为实证,应**祛邪利肺**。
14. **凉燥证**,乃燥证与风寒并见,表现为干咳少痰或无痰,咽干鼻燥。
15. 哮病的病因为**外邪侵袭,饮食不当,体虚病后**。
16. 哮病的病理因素以**痰**为主。
17. 哮病的病理性质,发作为**痰阻气闭**,以**邪实**为主。
18. 哮病的辨证首先辨哮证发病特点,其二辨哮之寒热偏盛,其三辨**肺脾肾**之虚。
19. 根据哮病的临床特点,分为**发作期**和**缓解期**。
20. 喘证的基本病机是**肺气上逆,宣降失职**,或**气无所主,肾失摄纳**。
21. 喘证的病位主要在**肺和肾**,涉及**肝脾**。
22. 喘指气息而言,哮指声响而言,必见喉中哮鸣有声。**喘未必兼哮,而哮必兼喘**。
23. 喘证的辨证首当分清**虚实**,实喘又当辨**外感内伤**,虚喘应辨**病变脏腑**。
24. 肺痈临床以**咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰**甚则脓血相兼为主要特征。
25. 肺痈的病位在**肺**。基本病机为邪热郁肺,蒸液成痰,邪阻肺络,血滞为瘀,痰热与瘀血互结,蕴酿成痈。
26. **溃脓期**是肺痈病情转归的关键点。
27. 肺痈治疗当以**祛邪**为原则,采用**清热解毒、化瘀排脓**的治法。
28. 肺癆的基本病机为**虚体虫侵,阴虚火旺**。
29. 肺癆应首辨病变之脏器,次辨虚损之性质,三辨**夹火、夹痰、夹瘀**之不同。
30. 肺胀的病因为久病肺虚,感受外邪。病变首先在**肺**,继则影响**脾、肾**,后期病及于**心**。

5年 历年真题

1. 治疗虚体感冒之气虚感冒证,首选的方剂是

- A.葱豉桔梗汤
B.加减葳蕤汤
C.荆防达表汤
D.新加香薷饮
E.参苏饮

【答案】E

【解析】气虚感冒证见恶寒较甚,气短乏力,自汗咳嗽,痰白,平素神疲体弱,易感冒。舌淡苔薄白,脉浮无力。治疗应当选用参苏饮;益气解表,调和营卫。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

2.阴虚感冒的治疗,应选用的方剂是

- A.银翘散
B.参苏饮
C.新加香薷饮
D.加减葳蕤汤
E.葱豉桔梗汤

【答案】D

【解析】选项 A 治疗的是风热感冒。选项 B 治疗的是气虚感冒。选项 C 治疗的是暑湿感冒。选项 D 治疗的是阴虚感冒。选项 E 治疗的是风热感冒。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

3.治疗常人感冒之风寒束表证,应首选的方剂是

- A.银翘散
B.加减葳蕤汤
C.荆防败毒散
D.新加香薷饮
E.参苏饮

【答案】C

【解析】感冒之风寒束表证治法为辛温解表。方剂可选用荆防达表汤或荆防败毒散加减。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

4.暑湿感冒临床表现为肢体酸重或疼痛,心烦口渴者,治疗应选用的方剂是

- A.三物香薷饮
B.黄连香薷饮
C.藿朴夏苓饮
D.新加香薷饮
E.藿香正气散

【答案】D

【解析】暑湿感冒,以身热,微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰黏,鼻流浊涕,心烦口渴等为主症,代表方剂是新加香薷饮加减。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

5.下列关于外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别点中,无意义是

- A.病程的长短
B.起病的缓急
C.咳痰的多少
D.是否兼有脏腑受损的兼症
E.是否兼有表证

【答案】C

【解析】外感咳嗽多为新病,起病急,临床以肺卫表证,实证为主。内伤咳嗽,多为久病,起病缓,伴有其他脏腑兼证,多为虚实夹杂。

涉及考点 | 咳嗽的鉴别诊断

6.下列各项,属热哮证临床表现的是

- A.喉中痰鸣如吼,面赤或有身热
B.喉中痰涎壅盛,寒热不显

- C.喉中哮鸣有声,发热恶寒
D.喉中哮鸣如水鸡声
E.短气息促,动则为甚

【答案】A

【解析】热哮是由于外感或内伤,肺热炽盛,导致肺失宣降,肺气上逆所致。其中B是痰的症状并无寒热偏盛。C是哮证病因,由于感受外邪,也无寒热偏盛。

涉及考点 | 喘证的辨证论治

- 7.治疗肺痈成痈期,应首选的方剂是
A.银翘散
B.《千金》苇茎汤
C.加味桔梗汤
D.沙参清肺汤
E.桔梗杏仁煎

【答案】B

【解析】肺痈成痈期治当清肺解毒,化痰消痈,方选《千金》苇茎汤加减。银翘散适用于肺痈初期,加减桔梗汤适用于肺痈溃脓期,沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

- 8.下列哪项不是肺痿的病因
A.营养不良
B.感染瘵虫
C.外感风寒
D.禀赋不足
E.久病体弱

【答案】C

【解析】肺痿的病因一方面为感染“瘵虫”;另一方面,由于禀赋不足、酒色劳倦、病后失调或营养不良导致正气虚弱,难抵“瘵虫”侵袭。外感风寒与肺痿发病无直接关系。

涉及考点 | 肺痿的病因

- 9.治疗心悸之阴虚火旺证,应首选的方剂是
A.黄连温胆汤
B.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸
C.桃仁红花煎
D.天王补心丹合朱砂安神丸
E.天王补心丹合炙甘草汤

【答案】D

【解析】心悸之阴虚火旺证治当滋阴清火养心安神,方选天王补心丹合朱砂安神丸加减。桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附丸适用于心阳不振证,桃仁红花煎适用于瘀阻心脉证,黄连温胆汤适用于痰火扰心证。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

- 10.治疗心悸之瘀阻心脉证,应首选的方剂是
A.黄连温胆汤合炙甘草汤
B.半夏泻心汤合当归活血饮
C.桃仁红花煎
D.参附汤
E.通窍活血汤

【答案】C

【解析】选项A用于心悸之痰火扰心证。选项B半夏泻心汤辛开苦降,寒热并调。选项D用于心悸之心阳虚证。心悸之瘀阻心脉证,治当活血化瘀,理气通络,方剂应选桃仁红花煎加减。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

11.胸痹标实的治法应选用下列哪一项

- A.益气固脱
B.补气温阳
C.活血化瘀
D.滋阴益肾
E.补益心气

【答案】C

【解析】胸痹发作期以标实为主,缓解期以本虚为主,其治疗原则应先治其标,后治其本,先从祛邪入手,然后再予扶正,必要时可根据虚实标本的主次,兼顾同治。标实当泻,针对气滞、血瘀、寒凝、痰浊而疏理气机,活血化瘀,辛温通阳,泄浊豁痰,尤重活血通脉治法。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

12.内伤头痛的发病与下列哪些脏腑关系密切

- A.心、脾、肾
B.肺、胃、肾
C.心、肺、肾
D.心、肝、肾
E.肝、脾、肾

【答案】E

【解析】肝主疏泄,性喜调达。头痛因于肝者,或因肝失疏泄,气郁化火,阳亢火升,上扰头窍而致;或因肝肾阴虚,肝阳偏亢而致;肾主骨生髓,脑为髓海。头痛因于肾者,多因房劳过度,或禀赋不足,使肾精久亏,无以生髓,髓海空虚,发为头痛。脾为后天之本,气血生化之源,头窍有赖于精微物质的滋养。头痛因于脾者,或因脾虚生化不足,气血亏虚,清阳不升,头窍失养而致头痛;或因脾失健运,痰浊内生,阻塞气机,浊阴不降,清窍被蒙而致头痛。所以内伤头痛之病机多与肝、脾、肾三脏的功能失调有关。

涉及考点 | 头痛的病机

13.胸痹之气阴两虚证的胸痛性质为

- A.心痛彻背
B.心痛憋闷
C.心胸隐痛
D.胸闷重而心痛微
E.心痛如绞

【答案】C

【解析】胸痹之气阴两虚证胸痛的特点是心胸隐痛,时作时休;心肾阴虚证胸痛的特点是心痛憋闷;痰浊闭阻证的胸痛特点是胸闷重而心痛微;寒凝心脉证胸痛的特点是猝然心痛如绞,心痛彻背,喘不得卧。

涉及考点 | 胸痹的辨证论治

14.治疗肝阳头痛,应首选的方剂是

- A.加味四物汤
B.天麻钩藤饮
C.通窍活血汤
D.半夏白术天麻汤
E.芎芷石膏汤

【答案】B

【解析】肝阳头痛治当平肝潜阳息风,方选天麻钩藤饮加减。加味四物汤用于治疗血虚头痛,通窍活血汤用于治疗瘀血头痛,半夏白术天麻汤适用于痰浊头痛,芎芷石膏汤用于治疗风热头痛。

涉及考点 | 头痛的辨证论治

15.中风之风痰瘀阻证,治疗应首选的方剂是

- A. 还少丹
B. 补阳还五汤
C. 温胆汤
D. 真方白丸子
E. 半夏白术天麻汤合桃仁红花煎

【答案】E

【解析】中风之风痰瘀阻证，治当息风化痰，活血通络，方选半夏白术天麻汤合桃仁红花煎加减。本方化痰通络，用于治疗风痰客于经络，症见口眼歪斜，舌强不语，手足不遂等症。

涉及考点 | 中风的辨证论治

16. 痫病之风痰闭阻证的治法是

- A. 息风开窍，化痰定志
B. 清肝泻火，化痰开窍
C. 涤痰开窍，化痰通络
D. 涤痰息风，开窍定痫
E. 化痰通络，镇心安神

【答案】D

【解析】痫病之风痰闭阻证是指风痰蒙闭心窍，壅塞经络，气机逆乱，元神失控而发病，与其余各项中分别提到的肝、心、痰的病变关系不密切。化痰定志法治疗程度弱于涤痰定痫法。

涉及考点 | 痫病的辨证论治

17. 痴呆之痰浊蒙窍证，治疗应选用的方剂是

- A. 涤痰汤
B. 半夏白术天麻汤
C. 天麻钩藤饮
D. 半夏厚朴汤
E. 黄连温胆汤

【答案】A

【解析】痴呆痰浊蒙窍证，治当豁痰开窍，健脾化痰，方用涤痰汤加减。本方重在豁痰开窍，兼以益气健脾，适用于痰浊蒙窍之痴呆的治疗。

涉及考点 | 痴呆的辨证论治

18. 治疗呕吐之肝气犯胃证，应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
B. 四七汤
C. 四磨汤
D. 逍遥散
E. 金铃子散

【答案】B

【解析】呕吐之肝气犯胃证治当疏肝理气，和胃降逆，方选四七汤加减。四七汤具有理气宽中，和胃，降逆止呕之功效，适用于因肝气郁结，气逆犯胃的呕吐。

涉及考点 | 呕吐的辨证论治

19. 泄泻的治疗方法是

- A. 健脾益气
B. 消食导滞
C. 运脾化湿
D. 清热利湿
E. 芳香化湿

【答案】C

【解析】泄泻的基本病机为脾虚与湿盛，致肠道功能失司而发为泄泻。病理因素主要是湿，湿为阴邪，易困脾阳。脾主运化，喜燥恶湿，若脾失健运导致小肠无以分清泌浊，则发为泄泻，所以泄泻的治疗方法是运脾化湿。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

20.治疗呃逆之胃火上逆证的方剂是

- A.麦门冬汤
- B.一贯煎
- C.增液汤
- D.竹叶石膏汤
- E.理中丸

【答案】D

【解析】呃逆之胃火上逆证,治当清胃泄热,降逆止呃,方选竹叶石膏汤加减。本方有清热生津、和胃降逆功能,用于治疗呃声洪亮、口臭烦渴、喜冷饮之呃逆。

涉及考点 | 呃逆的辨证论治

21.胃痛之胃阴亏耗证,其中医治法是

- A.疏肝理气,和胃止痛
- B.化瘀通络,脉络瘀滞
- C.温中健脾,和胃止痛
- D.清化热湿,理气和胃
- E.养阴益胃,和中止痛

【答案】E

【解析】胃痛之胃阴亏耗证,治法为养阴益胃,和中止痛;瘀血停胃证,治法为化瘀通络,理气和胃;脾胃虚寒证,治法为温中健脾,和胃止痛;湿热中阻证,治法为清化热湿,理气和胃;肝气犯胃证,治法为疏肝理气,和胃止痛。

涉及考点 | 胃痛的辨证论治

22.以下哪项不是噎膈初期的治法

- A.降火
- B.消瘀
- C.化痰
- D.散寒
- E.理气

【答案】D

【解析】噎膈初期重在治标,宜理气、化痰、消瘀、降火为主;后期重在治本,宜滋阴润燥,或补气温阳为主。

涉及考点 | 噎膈的辨证论治

23.黄疸最主要的辨证要点是下列哪一项

- A.急黄之病因
- B.黄疸病势轻重缓急
- C.辨阳黄和阴黄
- D.阳黄湿热之轻重
- E.阴黄之病因

【答案】C

【解析】黄疸的辨证以阴阳为纲,分为阳黄和阴黄。阳黄以湿热疫毒为主,有热重于湿、湿重于热、胆腑郁热及疫毒炽盛的不同;阴黄以脾虚寒湿为主,需注意有无血虚血瘀表现。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

24.便秘的基本病机是

- A.肝气郁结
- B.肺失肃降
- C.肝胃不和
- D.大肠传导失常
- E.脾失运化

【答案】D

【解析】便秘的基本病变属大肠传导失常,同时与肺、脾、胃、肝、肾等脏腑功能失调有关。如胃热过盛,津液耗伤,则肠失濡润;脾肺气虚,则大肠传送无力;肝气郁结,气机壅滞,或气郁

化火伤津,则腑失通利;肾阴不足,则肠道失润;肾阳不足,则阴寒凝滞,津液不通,故皆可影响大肠的传导。

涉及考点 | 便秘的病机

25.腹部可见块垒,但触之有积块,固定不移动,痛有定处,应诊断为

- A.积证
- B.聚证
- C.胃痞
- D.腹痛
- E.疟疾

【答案】A

【解析】积聚是腹内结块,或痛或胀的病证。分别言之,积属有形,结块固定不移,痛有定处,病在血分,是为脏病;聚属无形,包块聚散无常,痛无定处,病在气分,是为腑病。因积与聚关系密切,故两者往往一并论述。

涉及考点 | 积与聚的主症特点和病机的异同点

26.治疗久泻不止,不宜过用

- A.理气
- B.补肾
- C.升提
- D.分利
- E.固涩

【答案】D

【解析】久泻以脾虚为主,当以健脾。因肝气乘脾者,宜抑肝扶脾。因肾阳虚衰者,宜温肾健脾。中气下陷者宜升提。久泄不止者,宜固涩。暴泻不可骤用补涩,以免关门留寇。久泻不可分利太过,以防劫其阴液。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

27.治疗黄疸之阴黄寒湿证,应首选的方剂是

- A.麻黄连翘赤小豆汤
- B.栀子柏皮汤
- C.茵陈五苓散
- D.茵陈术附汤
- E.茵陈蒿汤

【答案】D

【解析】阴黄由寒湿所致,黄色晦暗如烟熏;治宜温中化湿、健脾和胃,方选茵陈术附汤治疗。而麻黄连翘赤小豆汤清热化湿兼解表,适用于湿热兼表型黄疸。栀子柏皮汤清热利湿,常用于伤寒身热发黄。茵陈五苓散利湿退黄,适用于阳黄,湿重于热,小便不利者。茵陈蒿汤清热利湿退黄,适用于阳黄,热重于湿者。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

28.治疗淋证之气淋,应首选的方剂是

- A.小蓟饮子
- B.程氏萆薢分清饮
- C.八正散
- D.沉香散
- E.补中益气汤

【答案】D

【解析】淋证之气淋病机为气机郁结,膀胱气化不利,治宜理气疏导,通淋利尿,方用沉香散。小蓟饮子主治血淋,八正散主治热淋,程氏萆薢分清饮主治膏淋,补中益气汤主治劳淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

29.治疗淋证之膏淋,应首选的方剂是

- A.小蓟饮子
- B.补中益气汤
- C.八正散
- D.石韦散
- E.程氏萆薢分清饮

【答案】E

【解析】膏淋病机为湿热下注,阻滞络脉,脂汁外溢,治宜清热利湿,分清泄浊,方选程氏萆薢分清饮加减。小蓟饮子主治血淋,补中益气汤主治劳淋,八正散主治热淋石韦散主治石淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

30.按照痰饮停积的部位分类、饮流胁下的是

- A.痰饮
- B.溢饮
- C.悬饮
- D.支饮
- E.伏饮

【答案】C

【解析】饮邪具有流动之性,饮留胃肠,则为痰饮;饮流胁下,则为悬饮;饮流肢体,则为溢饮;聚于胸肺,为支饮。

涉及考点 | 痰饮的分类

2年 易错考题

1.下列哪项不是时行感冒的特征

- A.传染性强
- B.证候相似
- C.集中发病
- D.老幼易感
- E.流行性强

【答案】D

【解析】本题是要求选择哪一项不是时行感冒的特征,时行感冒的特征是起病急,具有传染性,证候相似,集中发病;全身的症状较重,高热,全身酸痛,退热之后肺系症状明显。时行感冒可见于任何年龄。选项D老幼易感不是其特征。

涉及考点 | 感冒的诊断与病证鉴别

2.下列关于常人感冒的各项叙述中,哪项是错误的

- A.一般以风寒、风热、暑湿症状为主
- B.病程短,痊愈快
- C.无反复感邪、反复发病之势
- D.无气、血、阴、阳虚损症状
- E.治疗上当扶正解表

【答案】E

【解析】感冒的病位在卫表肺系,治疗应因势利导,从表而解,采用解表达邪的治疗原则。

涉及考点 | 感冒的辨证论治

3.哮病缓解期表现为肺肾两虚证候者,宜选用的方剂是

- A.六君子汤
- B.补中益气汤
- C.玉屏风散
- D.金匱肾气丸
- E.生脉地黄汤合金水六君煎

【答案】E

【解析】哮病缓解期之肺肾两虚证的治法应补肺益肾。方剂选用生脉地黄汤合金水六君煎。选项 A 六君子汤用于哮病缓解期表现为肺脾气虚证者。

涉及考点 | 哮病的辨证论治

4.咳嗽肺阴亏耗证,其咳嗽的特点是

- | | |
|--------------|------------|
| A.痰中带血有腥臭味 | B.痰多,色黄,质稠 |
| C.痰白,质稀 | D.痰黏腻,带灰色 |
| E.痰少,质黏,夹有血丝 | |

【答案】E

【解析】肺阴亏耗,肺失清润,则干咳痰少、质黏、夹有血丝;痰多色黄、质稠是痰热郁肺证的特点;痰白质稀,是由于寒邪袭肺。

涉及考点 | 咳嗽的辨证论治

5.虚喘证的病位在

- | | |
|-------|-------|
| A.肺、脾 | B.肺、肾 |
| C.心、肾 | D.肝、肾 |
| E.肺、心 | |

【答案】B

【解析】喘证的病理性质有虚实之分。实喘在肺,为外邪、痰浊、肝郁气逆、邪壅肺气,宣降不利所致;虚喘责之于肺、肾两脏,因阳气不足,阴精亏耗,而致肺肾出纳失常,且尤以气虚为主。

涉及考点 | 喘证的病因病机

6.肺痈初期的治疗,应首选的方剂是

- | | |
|---------|-----------|
| A.银翘散 | B.《千金》苇茎汤 |
| C.加味桔梗汤 | D.沙参清肺汤 |
| E.桔梗杏仁煎 | |

【答案】A

【解析】肺痈初期以表证为主,治法应当疏风散热,清肺化痰,方剂选银翘散加减。《千金》苇茎汤适用于肺痈成痈期的治疗,加味桔梗汤适用于肺痈溃脓期的治疗,沙参清肺汤和桔梗杏仁煎则适用于肺痈恢复期的治疗。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

7.治疗肺痈溃脓期,应首选的方剂是

- | | |
|-----------|---------|
| A.《千金》苇茎汤 | B.桔梗白散 |
| C.如金解毒散 | D.桔梗杏仁煎 |
| E.加味桔梗汤 | |

【答案】E

【解析】肺痈溃脓期热壅血瘀,血败肉腐,痈肿内溃,脓液外泄,治宜排脓解毒,可用加味桔梗汤。《千金》苇茎汤合如金解毒散用于成痈期,桔梗白散峻下逐脓,药性猛烈,一般不宜轻用,体弱者禁用。桔梗杏仁煎用于肺痈的恢复期。

涉及考点 | 肺痈的辨证论治

8.肺癆之肺阴亏损证的治疗,最佳选方为

- | | |
|-------|---------|
| A.保真汤 | B.月华丸 |
| C.八珍汤 | D.补天大造丸 |
| E.补肺汤 | |

【答案】B

【解析】肺阴亏虚所致肺癆者治当滋阴润肺,方选月华丸加减。本方功在补虚抗癆,养阴润肺止咳,化痰消瘀止血,是治疗肺癆的基本方剂,可用于阴虚咳嗽、咯血。

涉及考点 | 肺癆的辨证论治

9.心悸实证的治疗方法不包括下列哪项

- | | |
|------|------|
| A.祛痰 | B.行瘀 |
| C.化饮 | D.祛风 |
| E.清火 | |

【答案】D

【解析】心悸的治疗应分清虚实。虚证分别予以补气、养血、滋阴、温阳;实证则应祛痰、化饮、清火、行瘀。但本病以虚实错杂为多见,同时,由于心悸以心神不宁为其病理特点且虚实的主次、缓急各不相同,治疗当相应兼顾。故应酌情配合安神镇心之法。

涉及考点 | 心悸的辨证论治

10.治疗不寐之痰热扰心证,应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.黄连温胆汤 | B.朱砂安神丸 |
| C.安神定志丸 | D.六味地黄丸 |
| E.甘麦大枣汤 | |

【答案】A

【解析】不寐之痰热扰心证乃痰热内盛,扰乱心神所致,治疗应清化痰热,和中安神,方选黄连温胆汤。朱砂安神丸可清心泻火,安神宁心,适用于心火炽盛型不寐。安神定志丸有镇惊安神定志的功效,适用于心胆气虚型不寐。六味地黄丸可滋阴降火,适用于心肾不交型不寐。甘麦大枣汤养心安神,和中缓急,为治疗脏躁的主方,以精神恍惚,悲伤欲哭为证治要点。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

11.不寐的病机是

- | | |
|---------------|-------------|
| A.阴虚火旺,心肾不交 | B.脾虚不运,心神失养 |
| C.气血阴阳亏虚,心失所养 | D.邪扰心神,心神不宁 |
| E.阳盛阴衰,阴阳失交 | |

【答案】E

【解析】不寐的病因虽多,但其病理变化,总属阳盛阴衰,阴阳失交。一为阴虚不能纳阳;一为阳盛不得入于阴。病位主要在心,与肝、脾、肾密切相关。

涉及考点 | 不寐的病机

12.不寐的辨证首先要辨

- | | |
|------|------|
| A.病程 | B.阴阳 |
| C.寒热 | D.虚实 |
| E.年龄 | |

【答案】D

【解析】不寐辨证首分虚实。虚证,多属阴血不足,心失所养,临床特点为体质瘦弱,面色无华,神疲懒言,心悸健忘。实证为邪热扰心,临床特点为心烦易怒,口苦咽干,便秘溲赤。次辨病位,病位主要在心。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

13.不寐之心胆气虚证,治疗应首选的方剂是

- A.六味地黄丸
- B.交泰丸
- C.黄连温胆汤
- D.归脾汤
- E.安神定志丸合酸枣仁汤

【答案】E

【解析】不寐之心胆气虚证治当益气镇惊,安神定志,方选安神定志丸合酸枣仁汤加减治疗。六味地黄丸和交泰丸适用于心肾不交证的治疗。黄连温胆汤适用于痰热扰心证。归脾汤适用于心脾两虚证的治疗。

涉及考点 | 不寐的辨证论治

14.眩晕的辨证论治中,应首辨的要点是

- A.标本虚实
- B.寒热虚实
- C.病变脏腑
- D.虚实缓急
- E.外感内伤

【答案】C

【解析】眩晕病在清窍,与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。肝阳上亢之眩晕兼见头胀痛、面色潮红、急躁易怒、口苦脉弦等症状。脾胃虚弱,气血不足之眩晕,兼有纳呆、乏力、面色白等症状。脾失健运,痰湿中阻之眩晕,兼见纳呆呕恶、头痛、苔腻诸症。肾精不足之眩晕,多兼有腰酸腿软、耳鸣如蝉等症。所以应当首辨其相关脏腑。

涉及考点 | 眩晕的辨证论治

15.痴呆的基本病机为

- A.阴精不足,气血亏虚
- B.髓海不足,神机失用
- C.脏腑亏虚,痰瘀内阻
- D.以虚为本,虚实夹杂
- E.气滞血瘀,痰浊内阻

【答案】B

【解析】痴呆为一种全身性疾病,其基本病机为髓海不足,神机失用。由精、气、血亏损不足,髓海失充,脑失所养,或气、火、痰、瘀诸邪内阻,上扰清窍所致。

涉及考点 | 痴呆的病机

16.中风、厥证、痫病的共同症状是

- A.角弓反张
- B.四肢抽搐
- C.昏不知人
- D.喉中有声
- E.项背强直

【答案】C

【解析】中风与痫病典型发作均见突然仆倒,昏不知人。痫病与厥证、痉证均可见四肢抽搐和怪叫。痉证还可见角弓反张,身体强直。

涉及考点 | 痫病的病证鉴别

17. 中风之脱证的临床表现除下列哪项外均是

- A. 突然昏仆, 不省人事
B. 口噤不开, 牙关紧闭
C. 手撒肢冷, 二便自遗
D. 目合口开, 汗多不止
E. 舌痿, 脉微欲绝

【答案】B

【解析】中风之脱证属虚证, 乃为五脏真阳散脱, 阴阳即将离决之候, 临床可见突然昏仆, 不省人事, 目合口张, 鼻鼾息微, 手撒肢冷, 汗多, 大小便自遗, 肢体软瘫; 舌痿, 脉细弱或脉微欲绝。口噤不开, 牙关紧闭是中风闭证的临床表现。

涉及考点 | 中风的辨证论治

18. 治疗腹痛之中脏虚寒证, 应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸
B. 吴茱萸汤
C. 小建中汤
D. 少腹逐瘀汤
E. 理中丸

【答案】C

【解析】腹痛中脏虚寒证, 治当温中补虚, 缓急止痛, 方选小建中汤加减。枳实导滞丸适用于饮食积滞证, 少腹逐瘀汤适用于瘀血内停证, 理中丸适用于脾胃虚寒证, 吴茱萸汤适用于胃寒呕吐证。

涉及考点 | 腹痛的辨证论治

19. 噎膈的病位在

- A. 胃
B. 脾
C. 肾
D. 肝
E. 食管

【答案】E

【解析】噎膈的病因以内伤饮食、情志, 年老肾虚, 脏腑失调为主, 且三者之间常相互影响, 互为因果, 共同致病, 形成本虚标实的病理变化。噎膈的病位在食管, 属胃气所主, 与肝脾肾也有密切关系。

涉及考点 | 噎膈的病位

20. 治疗噎膈之痰气交阻证应首选的方剂是

- A. 通幽汤
B. 丁香散
C. 四七汤
D. 通关散
E. 启膈散

【答案】E

【解析】痰气交阻证, 治以开郁、化痰、润燥, 方用启膈散。通幽汤主治瘀血内结证; 丁香散主治胃中寒冷证; 通关散通关开窍; 四七汤主治七情之气, 结成痰涎。

涉及考点 | 噎膈的辨证论治

21. 治疗腹痛之饮食积滞证, 应首选的方剂是

- A. 保和丸
B. 越鞠丸
C. 枳实导滞丸
D. 枳术丸
E. 木香顺气丸

【答案】C

【解析】保和丸用于食积停滞，脘腹胀满，噎腐吞酸，不欲饮食，排除选项 A。越鞠丸用于六郁腹痛，或胸满吐酸，饮食不消，排除选项 B。枳术丸用于脾胃虚弱，食少不化，脘腹胀痞，排除选项 D。木香顺气丸用于脘腹胀痛，恶心，噎气，排除选项 E。枳实导滞丸用于腹痛饮食积滞重证。

涉及考点 | 腹痛的辨证论治

22. 泄泻的基本病机是

- A. 肝气郁结，胃失和降
- B. 肝脾湿热，络脉不和
- C. 脏腑气机阻滞，经脉痹阻
- D. 脾虚湿盛，肠道功能失司
- E. 邪滞于肠，气血壅滞，肠道传化失司

【答案】D

【解析】泄泻的基本病机变化为脾胃受损，湿困脾土，肠道功能失司，病位在肠，脾失健运是关键，同时与肝、肾密切相关。脾主运化，喜燥恶湿，大小肠司泌浊、传导；肝主疏泄，调节脾运；肾主命门之火，能暖脾助运，腐熟水谷。若脾运失职，小肠无以分清泌浊，大肠无法传化，水反为湿，谷反为滞，合污而下，则发生泄泻。

涉及考点 | 泄泻的病机

23. 关于泄泻的治疗，下列哪一项叙述是不正确的

- A. 急性泄泻不可骤用补涩
- B. 久泻不可分利太过
- C. 补虚不可纯用甘温
- D. 清热需大量使用苦寒
- E. 重度泄泻应防止津液亏损

【答案】D

【解析】泄泻的治疗方法为运脾化湿。急性泄泻多以湿盛为主，重在化湿，佐以分利，再根据寒湿和湿热的不同，分别采用温化寒湿与清化湿热之法。夹有表邪者，佐以疏解；兼有伤食者，佐以消导。久泻以脾虚为主，当重健脾。肝气乘脾者，宜抑肝扶脾；因肾阳虚衰者，宜温肾健脾。中气下陷者，宜升提；久泻不止者，宜固涩。暴泻不可骤用补涩，以免关门留寇；久泻不可分利太过，以防劫其阴液。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

24. 治疗寒湿痢，应首选的方剂是

- A. 平胃散
- B. 藿香正气散
- C. 不换金正气散
- D. 胃苓汤
- E. 香连丸

【答案】C

【解析】寒湿痢疾症见：下痢白多赤少或纯白冻，里急后重，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。病机是脾胃不和，痰湿中阻，不换金正气散用于温中燥湿，调和气血。

涉及考点 | 痢疾的辨证论治

25. 治疗便秘之热秘应首选的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 六磨汤
- C. 黄芪汤
- D. 增液承气汤
- E. 济川煎

【答案】A

【解析】便秘之热秘治当泻热导滞，润肠通便，方选麻子仁丸加减。六磨汤适用于便秘之

气秘,黄芪汤适用于便秘之气虚秘,增液承气汤适用于便秘之阴虚秘,济川煎适用于便秘之阳虚秘。

涉及考点 | 便秘的辨证论治

26.胁痛的基本病机为

- | | |
|--------|--------|
| A.气滞血瘀 | B.肝脾不调 |
| C.肝络失和 | D.不通则痛 |
| E.瘀阻心脉 | |

【答案】C

【解析】胁痛的基本病机为肝络失和,其病理变化可归结为“不通则痛”与“不荣则痛”两类。其病理性质有虚实之分,其病理因素,不外乎气滞、血瘀、湿热三者。因肝郁气滞、瘀血停着、湿热蕴结所导致的胁痛多属于实证,是为“不通则痛”。而因阴血不足,肝络失养所导致的胁痛则为虚证,属于“不荣则痛”。

涉及考点 | 胁痛的病机

27.治疗黄疸之胆腑郁热证,应首选的方剂是

- | | |
|---------|---------|
| A.茵陈术附汤 | B.龙胆泻肝汤 |
| C.茵陈五苓散 | D.茵陈蒿汤 |
| E.大柴胡汤 | |

【答案】E

【解析】黄疸胆腑郁热证是由湿热砂石郁滞,脾胃不和,肝胆失疏所致,治应疏肝泄热,利胆退黄,方用大柴胡汤加减。茵陈术附汤主治黄疸寒湿阻遏证;茵陈五苓散主治黄疸湿重于热证;茵陈蒿汤主治黄疸热重于湿证;龙胆泻肝汤主治肝胆湿热证。

涉及考点 | 黄疸的辨证论治

28.下列各项,不属于积证之瘀血内结证的表现的是

- | | |
|-----------------|--------------|
| A.腹部积块质软不坚,胀痛并见 | B.腹部积块大,质地较硬 |
| C.积块固定不移,隐痛或刺痛 | D.形体消瘦,面色晦暗 |
| E.纳谷减少,体倦乏力 | |

【答案】A

【解析】积证之瘀血内结证可见腹部积块明显,质地较硬,固定不移,隐痛或刺痛,形体消瘦,纳谷减少,面色晦暗黧黑,面颈胸臂或有血痣赤缕等。选项 A 腹部积块质软不坚,胀痛并见是积证之气滞血阻证的临床表现。

涉及考点 | 积聚的辨证论治

29.石淋的治法是

- | | |
|-------------|-------------|
| A.清热通淋,凉血止血 | B.清热利湿,分清泄浊 |
| C.清热利湿,排石通淋 | D.健脾益气,升清固摄 |
| E.理气疏导,通淋利尿 | |

【答案】C

【解析】石淋的病机为湿热蕴结下焦,尿液煎熬成石,膀胱气化失司。症见尿中夹砂石,排尿涩痛,或排尿时突然中断,尿道窘迫疼痛,少腹拘急;往往突发,一侧腰腹绞痛难忍,甚则牵及外阴,尿中带血,舌红苔薄黄,脉弦或带数。治宜清热利湿,排石通淋。

涉及考点 | 淋证的辨证论治

第六章 中医外科学

高频考点必背

1.消法:是运用不同治疗方法和方药,使初起肿疡得到消散,是一切肿疡初起的治法总则。适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病及各种皮肤性疾病。

2.托法:是用补益气血和透脓的药物,扶助正气,托毒外出,以免毒邪扩散和内陷的治疗法则。适用于外疡中期,即成脓期。

3.补法:是用补养药物,恢复其正气,助养其新生,使疮口早日愈合的治疗法则。适用于溃疡后期。凡气血虚弱者,宜补养气血;脾胃虚弱者,宜理脾和胃;肝肾不足者,宜补益肝肾等。但毒邪未尽之时,切勿用补法。

4.手术疗法常用的有切开法、烙法、砭镰法、挑治法、挂线法、结扎法等。

5.其他疗法有引流法、垫棉法、药筒拔法、针灸法、熏法、熨法、热烘疗法、漏渍法、冷冻疗法和激光疗法等。

6.垫棉法是用棉花或纱布折叠成块以衬垫疮部的一种辅助疗法。适用于溃疡脓出不畅有袋脓者;或疮孔窦道形成脓水不易排尽者;或溃疡脓腐已尽,新肉已生,但皮肉一时不能黏合者。

7.疔病好发于项后发际、背部、臀部。

8.疔的特点与种类:其特点是疮形虽小,但根脚坚硬,状如钉丁,病情变化迅速,易毒邪走散。发于颜面部的疔疮,易走黄而有生命危险;发于手足部的疔疮,易损筋伤骨而影响功能。

9.痈的特点:局部光软无头,红肿疼痛(少数初起皮色不变),结块范围多在6~9 cm左右,发病迅速,易肿、易脓、易溃、易敛,或伴恶寒、发热、口渴等症状。

10.发是病变范围较痛大的急性化脓性疾病。其特点是初起无头、红肿蔓延成片,中央明显,四周较淡,边界不清,灼热疼痛,有的3~5日后中央色褐腐溃,周围湿烂,全身症状明显。

11.常见的发有生于结喉处的锁喉痈、生于臀部的臀痈、生于手背部的手发背、生于足背的足发背。

12.丹毒有不同的病名,如生于躯干部的内发丹毒,发于头面部的抱头火丹,发于小腿足部的流火,多生于新生儿臀部的赤游丹毒等。

13.丹毒以血热火毒为患。发于头面部者,多夹风热;发于胸腹腰胯部者,多夹肝脾郁火;发于下肢者,多夹湿热;发于新生儿者,多有胎热火毒。

14.乳痈治疗当以消为贵。郁滞者以通为主,成脓者以彻底排脓为要。对并发脓毒败血症者,及时采用中西医结合综合疗法。

15.乳癖特点是单侧或双侧乳房疼痛并出现肿块,乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。乳房肿块大小不等,形态不一,边界不清,质地不硬,活动度好。本病好发于25~45岁的中青年妇女

5年 历年真题

1. 外科疾病辨证的总纲是

- A. 脏腑
B. 经络
C. 气血
D. 阴阳
E. 局部

【答案】D

【解析】外科疾病辨证的总纲是阴阳。

涉及考点 | 外科疾病辨证的总纲

2. 脓液不多且位于组织深部时,应采用的方法是

- A. 推拿法
B. 接触法
C. 穿刺法
D. 透光法
E. 点压法

【答案】C

【解析】确认成脓方法有接触法、透光法、点压法、穿刺法、B超。排除选项A、B。选项C适用于脓液不多且位于组织深部的辨脓。透光法适用于指、趾部甲下的辨脓。选项E适用于在指(趾)部,当病灶处脓液很少的情况下的辨脓。

涉及考点 | 辨脓

3. 疮面呈翻花如岩穴,在溃疡底部见有珍珠样结节,内有坏死组织,渗流血水,伴腥臭味。其溃疡属于

- A. 麻风性溃疡
B. 压迫性溃疡
C. 梅毒性溃疡
D. 岩性溃疡
E. 疮痍性溃疡

【答案】D

【解析】选项A呈穿凿形,常可深及骨部,并发出腐臭气味。选项B初期皮肤暗紫,很快变黑并坏死,滋水、液化、腐烂,脓液有臭味,可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项C其边缘削直而如凿成或略微内凹,基底高低不平。选项D疮面多呈翻花如岩穴,有的在溃疡底部见有珍珠样结节,内有紫黑坏死组织,渗流血水。选项E疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管,创面肉色不鲜,脓水清稀,并夹有败絮状物,疮口愈合缓慢或反复溃破,经久难愈。

涉及考点 | 辨溃疡

4. 乳房部脓肿切开引流正确的切口选择是

- A. 乳晕旁弧形切口
B. 乳晕处放射状切口
C. 乳房下缘弧形切口
D. 以乳头为中心弧形切口
E. 以乳头为中心放射状切口

【答案】E

【解析】成脓期局部按之有波动感或经穿刺抽脓抽得脓液者,应及时切开引流。一般采用与乳头方向呈放射状的切口,切口位置选择脓肿稍低的部位,切口长度与脓腔基底的大小基本一致,使引流通畅不致袋脓,但需避免手术损伤乳络形成乳漏。而乳晕部的浅表脓肿、乳房后的脓肿或乳房周边脓肿,则可在乳晕边缘或乳房周边作弧形切口。若脓腔较大者,必要时可在

脓腔最低部位作对口引流。脓肿小而浅者可用针吸穿刺抽脓。

涉及考点 | 切开法的具体应用

5. 溃疡脓腐已尽, 新肉已生, 但皮肉一时不能黏合者, 治疗应选用

- A. 结扎法
- B. 箍围法
- C. 针灸法
- D. 垫棉法
- E. 引流法

【答案】D

【解析】选项 A 适用于瘤、赘疣、痔、脱疽等病, 以及脉络断裂引起的出血之症。选项 B 均可用于外疡初起、成脓及溃后, 肿势散漫不聚, 而无集中之硬块者。选项 C 针灸法: 针刺适用于瘰疬、乳痈、乳癖、湿疮、瘾疹、蛇串疮、脱疽、内痔术后疼痛、排尿困难等。灸法适用于肿疡初起坚肿, 特别是阴寒毒邪凝滞筋骨, 而正气虚弱, 难以起发, 不能托毒外达者; 或溃疡久不愈合, 脓水稀薄, 肌肉僵化, 新肉生长迟缓者。选项 D 适用于溃疡脓出不畅有袋脓者; 或疮孔窦道形成脓水不易排尽者; 或溃疡脓腐已尽, 新肉已生, 但皮肉一时不能黏合者。选项 E: ①药线引流适用于溃疡疮口过脓水不易排出者; 或已成瘰管、窦道者。②导管引流适用于附骨疽、流痰、流注等脓腔较深、脓液多且不易畅流者。③扩创引流适用于疔、有头疽溃后有袋脓者, 瘰疬溃后形成空腔者, 脂瘤继发感染化脓时。

涉及考点 | 垫棉法的适应证

6. 哺乳期乳房疼痛有肿块, 按之痛甚。首先考虑的诊断是

- A. 乳癖
- B. 乳痈
- C. 乳癌
- D. 乳核
- E. 乳癆

【答案】B

【解析】乳痈多见于产后 3~4 周的哺乳期妇女。

涉及考点 | 乳痈

7. 下列各项不属于乳痈外治法初期的是

- A. 鲜菊花捣烂外敷
- B. 金黄散外敷
- C. 乳房按摩
- D. 及时切开排脓
- E. 局部外敷

【答案】D

【解析】乳痈外治法初期未成脓, 因此不包括切开排脓。

涉及考点 | 乳痈初期外治法

8. 红丝疔的好发部位是

- A. 面部
- B. 胸腹部
- C. 四肢后侧
- D. 四肢内侧
- E. 四肢外侧

【答案】D

【解析】红丝疔是发于四肢, 皮肤呈红丝显露, 迅速向上走窜的急性传染性疾病。好发于四肢内侧, 常有手足部生疔或皮肤破损等病史。

涉及考点 | 红丝疔

9. 下列各项, 不属于癰疽特征的是

- A.微有灼热
B.皮色不变
C.颈中两侧结块
D.疼痛牵引至耳后枕部
E.容易化脓

【答案】B

【解析】瘰疬特点是结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓，相当于西医的急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎。

涉及考点 | 瘰疬特点

10.蛇串疮的皮损特点是

- A.皮损为多形态,全身分布
B.皮疹为对称性分布
C.水疱散在性分布
D.水疱簇集呈带状分布
E.以上均不是

【答案】D

【解析】本病四季均发,尤以春秋季节多见。好发于成人,任何部位均发,尤以胸、胁、腰、面部多见。成群簇集的小水泡沿一侧神经呈带状分布,伴有患病区域神经疼痛为本病的主要症状特征。

涉及考点 | 蛇串疮的发病特点

11.乳痈初起的治疗方法

- A.清热消肿
B.疏肝解郁
C.疏肝清胃
D.凉血消肿
E.疏肝健脾

【答案】C

【解析】乳痈初起多见乳汁郁积结块,皮色不变或微红,肿胀疼痛。伴有恶寒发热,周身酸楚,口渴,便秘,苔薄,脉数。为气滞热壅证,治宜疏肝清胃,通乳消肿。

涉及考点 | 乳痈的治疗

12.首发药毒的潜伏期一般是

- A.10天以内
B.5~20天
C.1个月
D.24小时内
E.药后半小时

【答案】B

【解析】有一定的潜伏期,第一次发病多在用药后5~20天内,重复用药常在24小时内发生,短者甚至在用药后瞬间或数分钟内发生。

涉及考点 | 药毒的潜伏期

13.药毒之气阴两虚证的治疗方剂首选

- A.草薢渗湿汤
B.清营汤
C.增液汤合益胃汤
D.消风散
E.五神汤

【答案】C

【解析】药毒之气阴两虚证主症:药疹后期大片脱屑,伴低热,神疲乏力,口干欲饮,舌红少苔,脉细数。治法为益气养阴清热。方药为增液汤合益胃汤加减。

涉及考点 | 药毒气阴两虚证

14. 下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机
- A. 湿热秽浊由下焦前阴入侵, 阻于膀胱及肝经
 - B. 风热毒邪搏于肌肤而生
 - C. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
 - D. 秽浊之毒酿生湿热, 下注皮肤黏膜
 - E. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致

【答案】D

【解析】尖锐湿疣的中医病因病机是秽浊之毒酿生湿热, 下注皮肤黏膜。

涉及考点 | 尖锐湿疣的中医病因病机

15. 关于一次切开挂线法治疗肛痛的适应证, 错误的是
- A. 肛门旁皮下脓肿
 - B. 坐骨直肠间隙脓肿
 - C. 骨盆直肠间隙脓肿
 - D. 直肠后间隙脓肿
 - E. 马蹄形脓肿

【答案】A

【解析】一次切开挂线法: 适应证适用于高位脓肿, 如由肛隐窝感染而致坐骨直肠间隙脓肿, 骨盆直肠间隙脓肿, 直肠后间隙脓肿及马蹄形脓肿等。

涉及考点 | 挂线法

16. 肛漏手术成败的关键在于
- A. 切除瘻管管壁
 - B. 避免损伤内括约肌
 - C. 正确找到内口并切开或切除
 - D. 将外口及瘻管切除
 - E. 以上都不是

【答案】C

【解析】肛漏手术成败的关键在于正确找到内口并切开或切除。

涉及考点 | 肛漏手术特性

17. 子痰初起内治宜选
- A. 透脓散
 - B. 五味消毒饮
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 阳和汤
 - E. 滋阴除湿汤

【答案】D

【解析】子痰初起硬结期, 肾子处坠胀不适, 附睾硬结, 子系呈串珠状肿硬, 苔薄, 脉滑, 属浊痰凝结证, 应治以温经通络, 化痰散结。方药用阳和汤加减, 配服小金丹。

涉及考点 | 子痰的治疗

18. 睾丸及附睾的急性化脓性感染称为
- A. 子痰
 - B. 囊痈
 - C. 子痈
 - D. 脱囊
 - E. 卵子瘟

【答案】C

【解析】选项 A 是发生于肾子的疮疡性疾病, 相当于西医的附睾结核。选项 B 是发于睾丸以外的阴囊部位的急性化脓性疾病。选项 C 指睾丸及附睾的化脓性疾病。选项 D 指阴囊红肿溃破, 甚至睾丸外悬。选项 E 由腮腺炎病毒经血侵入睾丸所致, 患者忽然囊红发热, 睾丸一

C. 疮痍性溃疡

D. 梅毒性溃疡

E. 岩性溃疡

【答案】D

【解析】选项 A 初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。选项 B 发生于人体易摩擦的部位，如臀、背、足跟等处，疮面坏死不易脱落或疮口凹陷甚深，肉色不鲜，日久不易愈合。选项 C 疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，创面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。选项 D 创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底部高低不平，有稀薄臭秽分泌物。选项 E 疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水。

涉及考点 | 梅毒性溃疡

4. 蛇眼疔的成脓时间是

A. 2~3 天

B. 10 天左右

C. 7~10 天

D. 3~5 天

E. 2 周

【答案】A

【解析】蛇眼疔初起多局限于手指甲一侧边缘的近端处，有轻微的红肿疼痛，一般 2~3 天即成脓，可在指甲背面透现一点黄色或灰白色，或整个甲身内有脓液。待出脓后即肿退痛除，迅速愈合；严重者脓出不畅，甲下溃空或有胬肉突出，甚至指（趾）甲脱落。

涉及考点 | 手足部疔疮的临床表现

5. 发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是

A. 疔

B. 疔

C. 疖

D. 有头疽

E. 无头疽

【答案】C

【解析】疖是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。疔是一种发于皮肉之间的急性化脓性疾病。疔是一种发病迅速而危险性较大的急性化脓性疾病。以其形小根深坚硬，如钉钉之状而得名。有头疽是一种发于肌肤间的急性化脓性疾患。

涉及考点 | 疖的概念

6. 治疗颈痈初起应选用的方剂是

A. 牛蒡解肌汤

B. 黄连解毒汤

C. 仙方活命饮

D. 普济消毒饮

E. 五味消毒饮

【答案】A

【解析】颈痈初起多为风热痰毒证，治法为散风清热，化痰消肿。用牛蒡解肌汤或银翘散加减。

涉及考点 | 颈痈的治疗

7. 下列哪项不是乳岩肿块的特点

A. 无痛无热

B. 皮色不变

C. 表面光滑

D. 质地坚硬

E. 推之不移

【答案】C

【解析】初期肿块小，质地硬，表面不甚光滑，与周围组织分界不清，不宜被推动。肿块逐渐增大时，局部皮肤往往凹陷，乳房缩小变硬，乳头抬高内缩，同侧腋淋巴结变硬。发病至晚期，则肿块大且坚硬如石，表面凹凸不平，推之不移，皮肤呈橘皮样，甚则破溃形成溃疡。

涉及考点 | 乳岩的诊断

8. 湿疮湿热蕴肤证，应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- B. 龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤
- C. 小儿化湿汤
- D. 当归饮子
- E. 四物消风饮

【答案】B

【解析】湿疮湿热蕴肤证的治疗主方为龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤。脾虚湿蕴证，方药为除湿胃苓汤或参苓白术散加紫荆皮、地肤子、白鲜皮。血虚风燥证，方药为当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇。

涉及考点 | 湿疮湿热浸淫证

9. 患者，女，26岁。3天前突发生面、颈部红肿与水疱，自觉痒痛，伴恶寒兼发热，头痛，舌苔薄黄，脉浮数。怀疑接触过敏源引起，治疗应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 消风散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

【答案】C

涉及考点 | 接触性皮炎的治疗

10. 药毒之热毒入营证，应首选的方剂是

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 清营汤
- C. 增液汤合益胃汤
- D. 消风散
- E. 五神汤

【答案】B

【解析】药毒之热毒入营证主症：皮疹鲜红或紫红，灼热痒痛，伴高热，神志不清，舌红绛，镜面舌，脉洪数。治法为清热凉血，解毒护阴。方药为清营汤加减。选项 A 适用于湿毒蕴肤证。选项 C 适用于气阴两虚证。

涉及考点 | 药毒之热毒入营证

11. 尿道口有白色分泌物溢出，可诊断为

- A. 淋病
- B. 尿路感染
- C. 梅毒
- D. 阴道感染
- E. 尖锐湿疣

【答案】A

【解析】淋病特点：通常以尿道轻度不适起病，数小时后出现尿痛和脓性分泌物。当病变扩展至后尿道时可出现尿频、尿急。检查可见脓性黄绿色尿道分泌物，尿道口红肿，因细菌感染引起，腹股沟区淋巴结可肿大。

涉及考点 | 淋病的诊断

12. 肛漏的主要症状是

- A.便血,便秘,脱出
B.肛门肿物,剧痛,不出血
C.周期性疼痛,便血,便秘
D.肛周流脓,疼痛,瘙痒
E.肛门异物感,肿胀,疼痛

【答案】D

【解析】在非急性炎症期以流脓疼痛,瘙痒等局部症状为主;当出现急性炎症和反复发作的慢性复杂性肛漏时,则可伴有发热,消瘦,疲劳,面色无华等全身症状。

涉及考点 | 肛漏的主要症状

13.下列各项,不属于锁肛痔排便习惯改变的是

- A.排便次数增多
B.便秘
C.便血
D.便意频频
E.排便不尽感

【答案】C

【解析】锁肛痔排便习惯改变,也是直肠癌常见的早期症状。表现为排便次数增多,便意频繁,便不尽感等。有时为便秘,同时肛门内有不适或下坠感。

涉及考点 | 锁肛痔排便习惯改变

14.治疗子痲气滞痰凝证的代表方剂是

- A.小金丸
B.橘核丸
C.二陈汤
D.抵当丸
E.橘核汤

【答案】B

【解析】子痲气滞痰凝证表现为附睾结节,子系粗肿,轻微触痛,或牵引少腹不适,多无全身症状,舌淡苔薄白或腻,脉弦滑。应治以疏肝理气,化痰散结。方用橘核丸加减。

涉及考点 | 子痲的治疗

15.慢性前列腺炎的主要临床表现是

- A.无痛性血尿
B.精液中有血
C.尿中有血,并有腰部剧痛
D.尿频、进行性排尿困难
E.尿频急而痛,尿末常有白色分泌物

【答案】E

【解析】慢性前列腺炎临床表现不一,患者可出现轻微的尿频、尿急、尿痛、尿道内灼热不适或排尿不净之感。有的在排尿终末或大便秘结时,自尿道滴出少量乳白色的前列腺液。

涉及考点 | 慢性前列腺炎的诊断

16.尿石症患者小腹痛,尿流突然中断,尿频,尿急,尿痛,小便混赤,口干欲饮,舌红,苔黄腻,脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.金铃子散
B.石韦散
C.化坚二陈汤
D.三金排石汤
E.济生肾气丸

【答案】D

【解析】湿热蕴结证主症:腰痛或小腹痛,或尿流中断,尿频,尿急,尿痛,舌红苔黄腻,脉弦数。治法为清热利湿,通淋排石。方药为三金排石汤加减。

涉及考点 | 尿石症湿热蕴结证的治法方药

17.乳核的最好发年龄是

- A.10~15岁
B.15~20岁
C.20~25岁
D.25~30岁
E.30~45岁

【答案】C

【解析】乳核多发于20~25岁女性,其次是15~20岁和25~30岁女性。乳房内出现肿块,常为单发性,或多个在单侧或双侧乳房内同时或先后出现。

涉及考点 | 乳核的临床表现

18.顾步汤适用的脱疽证候是

- A.寒湿阻络
B.血脉瘀阻
C.湿热毒盛
D.热毒伤阴
E.气阴两虚

【答案】D

【解析】脱疽内治常见5个证型。选项A治宜温阳散寒,活血通络,用阳和汤加减。选项B治宜活血化瘀,通络止痛,用桃红四物汤加减。选项C治宜清热利湿,解毒活血,用四妙勇安汤加减。选项D治宜清热解毒,养阴活血,用顾步汤加减。选项E治宜益气养阴,用黄芪鳖甲汤加减。

涉及考点 | 脱疽的辨证论治

19.下列各项,属神经毒类的毒蛇是

- A.蝥蛇
B.竹叶青蛇
C.尖吻蝥蛇
D.海蛇
E.眼镜蛇

【答案】D

【解析】蝥蛇,竹叶青蛇,尖吻蝥蛇属于血循环毒类,眼镜蛇属于混合毒类。银环蛇、金环蛇、海蛇属于神经毒类。

涉及考点 | 毒蛇的分类

20.患者自行注射治疗后,出现臀部结块坚硬,漫肿不红病情进展缓慢,无全身症状,舌苔白腻,脉缓。其诊断是

- A.臀痈
B.肉瘤
C.流痰
D.内陷
E.无头疽

【答案】A

【解析】臀痈是发生于臀部肌肉丰厚处范围较大的急性化脓性疾病。由肌肉注射引起者俗称针毒,局部常有注射史。慢性者初起多有漫肿,皮色不变,红热不显而结块坚硬,有疼痛或压痛,患肢步行不便,进展较为缓慢,全身症状也不明显。

涉及考点 | 臀痈的临床特点

第七章 中医妇科学



高频考点必背

1. 新产妇人有三病是指产后**病痉, 病郁冒, 大便难**。
2. 新产妇人有三急是指产后**呕吐, 盗汗, 泄泻**。
3. 新产妇人有三冲是指产后败血上冲,**冲心, 冲胃, 冲肺**。
4. 产后三审为先审**小腹痛与不痛**,以辨有无恶露的停滞;次审**大便通与不通**,以验津液之盛衰,三审**乳汁的行与不行及饮食之多少**,以察胃气的强弱。
5. **阴户**又名四边,是女性外生殖器官的解剖术语,系指女性**外阴**,包括阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及前庭部位。
6. 阴户的功能是**防御外邪入侵的第一道门户**;是排月经、泌带下、排恶露之出口;是合阴阳之入口,又是娩出胎儿、胎盘之产门。
7. 阴道的功能是**防御外邪入侵的关口**;是排出月经、分泌带下的通道;是阴阳交合的器官;又是娩出胎儿的路径,故亦称产道。
8. 子宫的功能包括**产生、排出月经, 孕育、分娩胎儿**。另外,还有排出余血浊液、分泌生理性带下的功能。
9. 子宫的生理特点具有明显的**周期性、节律性**。
10. 非经期、妊娠期,子宫表现为“**藏精气而不泻**”似脏;行经期、分娩时,子宫又表现为“**传化物而不藏**”似腑。《内经》称之为“**奇恒之府**”。
11. 月经出血的第1天为月经周期的开始,两次月经第1天的间隔时间称为一个月经周期,一般为**28~30天**。
12. 月经持续时间,正常经期为**3~7天**,多数为**3~5天**。
13. 月经的量、色、质:月经量的多少难以准确统计,一般以每月经量**20~60 mL**为适中。经色暗红,经质不稀不稠,不凝固,无血块,无特殊臭气。
14. 绝经妇女一生中最后1次行经后,停经1年以上,称为绝经。一般为**45~55岁**,平均49.5岁。绝经表明即将步入老年期。
15. **并月**为身体无病而月经定期**两个月**来潮一次者。
16. **季经、居经**为身体无病月经**三个月**一潮者。
17. **避年**为身体无病月经**1年**一行者。
18. **暗经**为终生不潮但却能受孕者。
19. **激经**为受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者。
20. **天癸与月经**的关系:“天癸至”,则“月事以时下,故有子”,“天癸竭,地道不通,故形坏而无子也”。

5年 历年真题

1. 患者,女,36岁,已婚,孕妇。末次月经的时间为2019年8月29日,其预产期时间为

- A.2020年5月5日
B.2020年5月6日
C.2020年5月7日
D.2020年6月5日
E.2020年6月6日

【答案】D

【解析】现代推算预产期的公式是:按末次月经的第一天算起,月数加9(或减3),日数加7(阴历则加14)。

涉及考点 | 预产期的计算方法

2.妇人产后几天红恶露可干净

- A.1~2天
B.3~4天
C.4~5天
D.5~6天
E.6天

【答案】B

【解析】恶露是产后自子宫排出的余血浊液。先是暗红色的血性恶露,也称红恶露,持续3~4天干净;后渐变淡红,量由多渐少,称为浆液性恶露,7~10天干净;继后渐为不含血色的白恶露,2~3周干净。如果血性恶露10天以上仍未干净,应考虑子宫复旧不良或感染,当予以诊治。

涉及考点 | 产褥期生理

3.下列各项,不属于妊娠期生理现象的是

- A.脉滑
B.月经停闭
C.头痛
D.乳晕加大变黑
E.恶心欲呕,择食

【答案】C

【解析】妊娠初期出现饮食偏嗜、恶心作呕、晨起头晕等现象。早期孕妇可自觉乳房胀大。妊娠2个月,六脉平和滑利,按之不绝,尺脉尤甚。妊娠3个月,白带稍增多,乳头、乳晕的颜色加深。妊娠4个月,孕妇可自觉胎动,胎体逐渐增大,小腹部逐渐膨隆。妊娠6个月,可出现轻度肿胀。妊娠末期,可见小便频数、大便秘结。

涉及考点 | 妊娠的生理现象

4.胞宫的主要生理功能是

- A.主月经
B.主带下
C.主孕育胎儿
D.主月经和孕育胎儿
E.主经、带、胎、产

【答案】E

【解析】胞宫即是子宫,其主要的生理功能是经、带、胎、产。选项E更全面,所以本题选E。

涉及考点 | 子宫的功能

5.下列关于妊娠期的说法中,错误的是

- A.妊娠足月子宫容量增大至100倍
B.子宫增大变软,子宫颈呈紫蓝色而质软
C.妊娠8周时,子宫增大如非孕时的2倍
D.妊娠12周时,子宫增大如非孕时的3倍
E.妊娠12周时,可在耻骨联合上方触及子宫

【答案】A

【解析】孕后子宫变化最大,早孕40多天,可扪及子宫增大变软,子宫颈呈紫蓝色而质软。妊娠8周,子宫增大如非孕时的2倍。妊娠12周,子宫增大如非孕时的3倍,可在耻骨联合上方触及。非孕时子宫容量为5mL,至妊娠足月约为5000mL,增加1000倍。

涉及考点 | 妊娠的生理现象

6.与月经产生关系最密切的脏腑是

- | | |
|---------|---------|
| A.心、肝、脾 | B.肾、肺、脾 |
| C.肾、肝、心 | D.肾、肝、脾 |
| E.心、肝、肺 | |

【答案】D

【解析】肾藏精化气,为天癸之源、冲任之本,气血阴阳之根,肾气旺盛,使天癸泌至;肝肾同源,精血同源,相互化生,肝血充足,气机条达,则经候如期;脾主运化,气血生化之源,脾胃健运,则血海充盈,血循常道。

涉及考点 | 脏腑与月经的关系

7.妊娠月份已足,腹痛或作或止,腰不痛者,称为

- | | |
|------|------|
| A.临产 | B.盛胎 |
| C.试胎 | D.弄胎 |
| E.正产 | |

【答案】D

【解析】弄胎指妇女怀孕足月,腹痛或作或止,腰不痛的一种征兆。《医宗金鉴·妇科心法要诀》:“若月腹痛腰不痛,或作或止名弄胎”。

涉及考点 | 临产先兆

8.下列关于阴道功能的叙述,错误的是

- | | |
|--------|--------|
| A.排出月经 | B.分泌带下 |
| C.种子育胎 | D.排出恶露 |
| E.阴阳交合 | |

【答案】C

【解析】阴道,又称产道,意指胎儿分娩时所经之道路,位于子宫与阴户之间。阴道是防御外邪入侵的关口,是排出月经、分泌带下的通道,是阴阳交合的器官,又是娩出胎儿、排出恶露的路径,故亦称产道。种子育胎是胞宫的功能。

涉及考点 | 阴道的功能

9.阴户的功能不包括

- | | |
|-----------------|-------------|
| A.生育胎儿的关口 | B.孕育胎儿 |
| C.排出月经、带下、恶露的关口 | D.“合阴阳”的出入口 |
| E.防止外邪入侵的关口 | |

【答案】B

【解析】阴户,又名“四边”,是指女性阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前庭的部位。阴户是生育胎儿,排出月经、带下、恶露的关口,也是“合阴阳”的出入口。同时,《诸病源候论》云:“四边中于湿,风气从下上入阴里”。又云:“玉门、四边皆解散,子户未安……若居湿席,令人苦寒,洒洒入腹”。以上说明阴户又是防止外邪入侵的关口。孕育胎儿为胞宫的功能。

涉及考点 | 阴户的功能

10. 下列各项,属寒邪导致的妇科疾病是

- A. 子淋
- B. 痛经
- C. 经行吐衄
- D. 崩漏
- E. 月经先期

【答案】B

【解析】寒为阴邪,收引凝滞,易伤阳气,影响气血运行。寒邪伤人的具体病因归纳如下:若感受寒邪、冒雨涉水、过食生冷,则血为寒凝;血行不畅,胞脉阻滞,可出现月经后期、痛经、闭经、癥瘕等。若机体阳气不足,寒自内生,脏腑机能失常,影响冲任、胞宫的功能,可出现痛经、带下病、妊娠腹痛、宫寒不孕等。选项 A、C、D、E 为热邪所致。

涉及考点 | 寒热湿邪

11. 治疗月经后期之实寒证,应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 温经汤(《妇人大全良方》)
- C. 乌药汤
- D. 艾附暖宫丸
- E. 温经汤(《金匱要略》)

【答案】B

【解析】月经后期之实寒证。治法为温经散寒调经。方剂为温经汤(《妇人大全良方》)。选项 E 是月经后期之虚寒证。治法为扶阳祛寒调经。方剂为温经汤(《金匱要略》)或艾附暖宫丸。

涉及考点 | 月经后期的辨证论治

12. 疏肝清热利湿法的代表方剂是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 清肝止淋汤
- D. 宣郁通经汤
- E. 羚羊钩藤汤

【答案】C

【解析】疏肝清热利湿法,肝热与脾湿相合,治疗应疏肝清热利湿,常用药物有黄芩,夏枯草,龙胆草,栀子等,常用方剂有龙胆泻肝汤,清热止淋汤等。

涉及考点 | 妇科疾病调理脏腑的用药

13. 下列各项,属月经先期之阳盛血热证主症的是

- A. 经色暗淡,质清稀
- B. 经色淡红,质清稀
- C. 经色深红,质黏稠
- D. 经色暗红,有血块
- E. 经色淡红,质黏稠

【答案】C

【解析】月经先期之阳盛血热证的主症为月经先期,量多,色深红或紫红,质黏稠,或伴心烦,面红口干,小便短黄,大便燥结,舌质红,苔黄,脉数或滑数。

涉及考点 | 月经先期的辨证论治

14. 月经先后无定期的主要发病机理是

- A. 肝郁气滞,疏泄失调
- B. 肾气不足,封藏失职
- C. 脾气虚弱,统摄无权
- D. 湿热下注,任带不固
- E. 气血失调,血海蓄溢失常

【答案】E

【解析】月经先后无定期的发病机理,主要是肝肾功能失调,冲任功能紊乱,血海蓄溢失常。其病因多为肝郁、肾虚和脾虚。

涉及考点 | 月经先后无定期的病机

15. 中医妇科内治法中,温补肾阳法的代表方是

- A. 温经汤
- B. 左归丸
- C. 金匱肾气丸
- D. 参附汤
- E. 举元煎

【答案】C

【解析】肾虚,命门火衰,冲任失于温煦,导致经、带、胎、产、杂诸病,治疗以温肾助阳、温养冲任为主,常用的代表方剂为金匱肾气丸、温胞饮、右归丸之类。

涉及考点 | 调补脏腑

16. 属于产后常脉的是

- A. 滑利平和
- B. 弦细而数
- C. 沉细涩弱
- D. 虚缓和平
- E. 浮滑而数

【答案】D

【解析】滑利平和为妊娠常脉;弦细而数为妊娠病脉;沉细涩弱、浮滑而数均为产后病脉。产后冲任气血多虚,故脉多见虚缓和平。

涉及考点 | 切诊

17. 下列除哪项外,均是经期延长血瘀证的主症

- A. 经行 8~10 天始净
- B. 月经量少、色暗、有块
- C. 小腹疼痛拒按
- D. 腰酸腿软
- E. 舌紫暗,脉弦涩

【答案】D

【解析】经期延长血瘀证的主要证候为经行时间延长,量或多或少,经色紫暗,有块,经行小腹疼痛,拒按,舌质紫暗或有瘀点,脉弦涩。选项 D 腰酸腿软为肾虚证候。

涉及考点 | 经期延长的辨证

18. 经行头痛以头痛伴随月经周期性发作为辨证要点,其治疗方法为

- A. 滋阴潜阳,疏风止痛
- B. 调理气血,通络止痛
- C. 温经养血,疏络止痛
- D. 活血化瘀,温经止痛
- E. 益气养血,活络止痛

【答案】B

【解析】经行头痛其发作与月经密切相关,属于内伤性头痛。因头为诸阳之会,五脏六腑之气皆上荣于头,足厥阴肝经会于巅,肝为藏血之脏,经行时气血下注冲任而为月经,阴血相对不足,故凡外感、内伤均可在此时引起脏腑气血失调而为患。其病机变化以气血失调为本,治疗方法为调理气血,通络止痛。

涉及考点 | 经行头痛的治疗原则

19. 治疗痛经气滞血瘀证,应首选的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 身痛逐瘀汤

E.通窍活血汤

【答案】B

【解析】痛经之气滞血瘀证。治法为理气行滞,化瘀止痛。方剂为膈下逐瘀汤。选项 A 血府逐瘀汤用于闭经之气滞血瘀证。选项 C 少腹逐瘀汤用于痛经之寒凝血瘀证。选项 D 身痛逐瘀汤用于产后身痛之血瘀证。选项 E 通窍活血汤用于经行头痛之血瘀证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

20.治疗崩漏之实热证,应首选的方剂是

A.保阴煎

B.固本止崩汤

C.清热固经汤

D.清热调血汤

E.左归丸

【答案】C

【解析】崩漏实热证治以清热凉血,固冲止血,主方为清热固经汤。选项 A 保阴煎用于月经过多之血热证。选项 B 固本止崩汤用于崩漏之脾虚证。选项 E 左归丸用于崩漏之肾阴虚证。

涉及考点 | 崩漏的辨证论治

2年 易错考题

1.下列除哪项外均是玉门的别称

A.胞门

B.阴门

C.产门

D.子门

E.龙门

【答案】D

【解析】子门,是指子宫颈口的部位。又名子户。

涉及考点 | 宫颈口的名称

2.下列关于生理性带下的描述,错误的是

A.色白或无色透明

B.质地黏稠

C.其量适中

D.无特殊气味

E.从阴道内排出的一种阴液

【答案】B

【解析】生理性带下:色白或无色透明,其量适中,质地黏而不稠,滑润如膏,无异臭气味,色白或无色透明。

涉及考点 | 生理性带下的性状

3.血虚致冲任血海不能由满而溢,或失于濡养,不会发生下列哪种疾病

A.痛经

B.月经后期

C.月经过少

D.闭经

E.月经先期

【答案】E

【解析】血虚致冲任血海匮乏不能由满而溢,或失于濡养,可发生月经后期、月经过少、闭经、痛经、妊娠腹痛、胎动不安、滑胎、胎萎不长、产后缺乳、产后身痛、产后血虚、不孕。

涉及考点 | 血虚致病

4. 下列月经病的治疗, 错误的是
- A. 重在治本调经
B. 分清先病和后病
C. 急则治标, 缓则治本
D. 顺应不同年龄阶段论治
E. 多用辛温暖宫之品

【答案】E

【解析】月经病的治疗原则: ①治本调经。②分清先病和后病的论治原则。③本着“急则治其标, 缓则治其本”的原则。

涉及考点 | 月经病的治疗原则

5. 下列各项, 不属于痛经气血虚弱证主症的是
- A. 月经量少, 色淡, 质稀
B. 腹痛出现在行经之后
C. 神疲乏力, 面色无华
D. 头晕眼花, 腰痛如折
E. 头晕心悸, 舌质淡, 脉细无力

【答案】D

【解析】痛经气血虚弱证的表现: 经期或经后小腹隐痛喜按, 小腹及阴部空坠不适, 月经量少, 色淡质稀, 神疲乏力, 头晕心悸, 面色无华, 舌淡, 脉细无力。头晕眼花, 腰痛如折属于肾虚证。

涉及考点 | 痛经的辨证论治

6. 血虚引起经行头痛的特点是
- A. 头晕, 头部绵绵作痛
B. 巅顶掣痛, 头晕目眩
C. 头痛剧烈, 痛如锥刺
D. 头部胀痛重着
E. 头痛如裹, 头晕目眩

【答案】A

【解析】头部绵绵作痛血虚头痛特点。选项 B 巅顶掣痛, 头晕目眩是属于肝火头痛特点。选项 C 头痛剧烈, 痛如锥刺是血瘀特点。选项 D 头部胀痛重着属于气滞特点。选项 E 头痛如裹, 头晕目眩属于痰湿特点。

涉及考点 | 经行头痛

7. 下列各项, 不属于绝经前后诸证临床表现的是
- A. 烘热汗出, 烦躁易怒
B. 潮热面红, 眩晕耳鸣
C. 心悸失眠, 腰背酸楚
D. 面浮肢肿, 情志不宁
E. 四肢抽搐, 肌肉酸楚

【答案】E

【解析】妇女在绝经前后伴随月经紊乱或绝经出现如阵发型烘热汗出、烦躁易怒、潮热面红、眩晕耳鸣、心悸失眠、皮肤蚁行感; 或体倦乏力, 面浮肢肿等症状, 为绝经前后诸症。

涉及考点 | 绝经前后诸证的含义

8. 下列各项, 不属于妊娠病常见发病机理的是
- A. 冲气上逆
B. 瘀血内阻
C. 阴血虚
D. 气滞
E. 脾肾虚

【答案】B

【解析】妊娠病的发病机理有三：一是孕后阴血下聚冲任养胎，机体属于阴血偏虚，阳气偏亢的生理状态。二是胎儿逐渐长大，胎体上升影响气机的升降。三是素体脾胃虚弱，生化之源不足，胎失所养，或先天肾气不足，胞失所系。

涉及考点 | 妊娠病的发病机理

9. 下列各项，不属于放置宫内节育器禁忌证的是

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 月经过多
- C. 重度痛经
- D. 宫颈口松
- E. 足月产后 3 月

【答案】E

【解析】放置宫内节育器禁忌证：月经过多过频；生殖道急性炎症；生殖器官肿瘤；子宫畸形；宫颈过松、重度陈旧宫颈裂或子宫脱垂；严重全身性疾患。

涉及考点 | 宫内节育器禁忌证

10. 下列各项，不属于人工流产并发症的是

- A. 人流综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 人流后宫缩不良
- D. 人流不全
- E. 人流术后感染

【答案】C

【解析】人工流产综合征、子宫穿孔、人流不全、宫腔或颈管内口粘连、术后感染均属于人工流产并发症。

涉及考点 | 人工流产并发症

第八章 中医儿科学



高频考点必背

1. **胎儿期**指从男女生殖之精相合而受孕,直至分娩断脐,胎儿出生。
2. **新生儿期**指从出生后脐带结扎到出生后 28 天。
3. **婴儿期**指从出生后至满 1 周岁,其中包括新生儿期。生长发育迅速。
4. **幼儿期**指从 1 周岁至满 3 周岁。
5. **学龄前期**指从 3 周岁后到入小学前(6~7 岁)。
6. **学龄期**指从 6~7 周岁入小学至青春期来临(女 12 岁,男 13 岁)。
7. **青春期**指女孩从 11~12 岁到 17~18 岁,男孩从 13~14 岁到 18~20 岁。体格发育出现第二次高峰。
8. 公式推算小儿体重:①<6 个月体重(kg) = 3+0.7×月龄;②7~12 个月体重(kg) = 6+0.25×月龄;③1 岁以上体重(kg) = 8+2×年龄
9. 出生时身长约为 50 cm。生后第一年身长增长最快,约增长 25 cm,其中前 3 个月约增长 12 cm。第 2 年身长增长速度减慢,约增长 10 cm。
10. 2 岁后至 12 岁儿童的身高:身高(cm) = 75+7×年龄
11. 前囟在出生时约 1.5~2 cm,至 12~18 个月闭合。
12. 后囟是顶骨和枕骨之间的三角形间隙,部分小儿出生时就已闭合,未闭合者正常情况应在生后 2~4 个月内闭合。
13. 头小畸形指囟门早闭且头围明显小于正常者。
14. 囟门迟闭及头围大于正常者,常见于解颅(脑积水)、佝偻病、先天性甲状腺功能减低症等。
15. 囟门凹陷多见于阴伤液竭之失水或极度消瘦者,称囟陷。
16. 囟门凸出反映颅内压增高,多见于热炽气营之脑炎、脑膜炎等,称囟填。
17. 足月儿出生时头围为 33~34 cm;出生后前 3 个月和后 9 个月各增长 6 cm;1 周岁时约为 46 cm;2 周岁时约为 48 cm;5 周岁时约增长至 50 cm;15 岁时接近成人,为 54~58 cm。
18. 新生儿胸围约 32 cm;1 岁时约 44 cm,接近头围;2 岁后胸围渐大于头围,其差数(cm)约等于其岁数减 1。
19. 乳牙在 2~2.5 岁出齐。
20. 自 6~7 岁开始,乳牙按萌出先后逐个脱落,代之以恒牙。
21. 2 岁以内乳牙颗数公式推算:乳牙数 = 月龄 - 4(或 6)。
22. 小儿血压正常值公式推算(注:1kPa = 7.5 mmHg):收缩压(mmHg) = 80+2×年龄;舒张压(mmHg) = 收缩压×2/3。
23. 小儿动作发育遵循一定的规律,发育顺序是由上向下、由粗到细、由不协调到协调进展的。
24. 粗动作发育过程可归纳为“二抬四撑六会坐,七滚八爬周会走”。
25. 小儿的生理特点是脏腑娇嫩,形气未充;生机蓬勃,发育迅速。
26. “纯阳”学说中的“纯”指小儿初生,未经太多的外界因素影响,胎元之气尚未耗散;

“阳”指以阳为用,即生机。

27.小儿的病理特点是**发病容易,传变迅速;脏气清灵,易趋康复**。

28.小儿指纹分三关。自虎口向指端,第1节为**风关**,第2节为**气关**,第3节为**命关**。察指纹适用于**3岁以下**小儿。

29.小儿指纹的辨证纲要归纳为“**浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实,三关测轻重**”。

30.小儿的用药标准为新生儿用成人量的**1/6**;乳婴儿用成人量的**1/3**;幼儿用成人量的**1/2**;学龄期儿童用成人量的**2/3**或**接近成人量**。

5年 历年真题

1.新生儿期是指从出生后脐带结扎至生后

- A.7天
B.14天
C.28天
D.30天
E.60天

【答案】C

【解析】新生儿期指的是从出生后脐带结扎到出生后28天。

涉及考点 | 小儿年龄分期

2.按公式计算,1岁小儿正常身高是

- A.105cm
B.100cm
C.95cm
D.90cm
E.75cm

【答案】E

【解析】小儿出生时身长约50cm,生后一年身长增长最快,约25cm。

涉及考点 | 身高(高)测量方法

3.2周岁时正常头围是

- A.46cm
B.48cm
C.50cm
D.52cm
E.54cm

【答案】B

【解析】胎儿期脑的发育速度最快,故小儿出生时头围相对较大,平均为34cm。第1年的前三个月约增长6cm,与后9个月的增长值相当,即一岁出头围约为46cm。第2年增长减慢约为2cm,2岁时头围约为48cm。

涉及考点 | 小儿生长发育的体格生长

4.小儿5岁的收缩压应为

- A.70mmHg
B.85mmHg
C.90mmHg
D.105mmHg
E.110mmHg

【答案】C

【解析】不同年龄小儿血压正常值推算公式为:收缩压=80+2×年龄,舒张压=收缩压×2/3。5岁小儿的收缩压是80+2×5=90mmHg。

涉及考点 | 血压的正常值

5. 小儿的脏腑娇嫩, 尤其突出的是

- | | |
|----------|----------|
| A. 肝、脾、肾 | B. 肺、脾、肾 |
| C. 心、肺、肾 | D. 心、肝、肾 |
| E. 肺、肝、肾 | |

【答案】B

【解析】小儿脏腑娇嫩, 形气未充, 具体表现在肌肤柔嫩, 腠理疏松, 气血未充, 肺脾娇弱, 肾气未固, 神气怯弱, 筋骨未坚等方面。五脏六腑功能皆属不足, 尤其以肺、脾、肾三脏更为突出。

涉及考点 | 小儿的生理特点

6. 由于小儿为“纯阳之体”“稚阴之体”, 临床容易表现出的证候是

- | | |
|-------|-------|
| A. 瘀证 | B. 实证 |
| C. 寒证 | D. 虚证 |
| E. 热证 | |

【答案】E

【解析】由于小儿为稚阴稚阳之体, 脏腑娇嫩, 卫外功能较成人为弱, 又寒温不知自调, 因而更易被“六淫”邪气所伤, 产生各种肺系疾病; 小儿脏腑娇嫩, 又易被燥邪、暑邪所伤, 形成肺胃阴津不足、气阴两伤等病证; 小儿为纯阳之体, 六气易从火化, 小儿伤于外邪以热性病证为多。

涉及考点 | 小儿生理特点

7. 小儿望诊最重要的内容是

- | | |
|--------|--------|
| A. 察指纹 | B. 察斑疹 |
| C. 审苗窍 | D. 望神色 |
| E. 望形态 | |

【答案】D

【解析】凡精神振作, 二目有神, 表情活泼, 面色红润, 呼吸调匀, 反应敏捷, 为气血调和、神气充沛的表现, 是健康或病情轻浅之象; 反之, 若精神萎顿, 二目无神, 表情呆滞, 面色晦暗, 呼吸不匀, 反应迟钝, 谓之无神, 为体弱有病或病情较重之象。因此望神色是小儿望诊最重要的内容。

涉及考点 | 望诊特点

8. 小儿风寒表实证应见指纹是

- | | |
|----------|----------|
| A. 浮红而滞涩 | B. 沉紫而滞涩 |
| C. 浮紫而滞涩 | D. 浮红而色淡 |
| E. 沉而青紫 | |

【答案】A

【解析】指纹的辨证纲要归纳为“浮沉分表里, 红紫辨寒热, 淡滞定虚实, 三关测轻重”。 “浮”指指纹浮现, 显露于外, 主病邪在表; “沉”指指纹沉伏, 深而不显, 主病邪在里。正常小儿的指纹大多淡紫隐藏在风关以内。纹色鲜红浮露, 多为外感风寒; 纹色紫红, 多为邪热郁滞; 纹色淡红, 多为内有虚寒; 纹色青紫, 多为瘀热内结; 纹色深紫, 多为瘀滞络闭, 病情深重。指纹色淡, 推之流畅, 主气血亏虚; 指纹色紫, 推之滞涩, 复盈缓慢, 主实邪内滞, 如瘀热、痰湿、积滞等。

纹在风关,示病邪初入,病情轻浅;纹达气关,示病邪入里,病情较重;纹进命关,病邪深入,病情加重;纹达指尖,称透关射甲,若非一向如此,则示病情重危。

涉及考点 | 望诊特点及临床意义

9.正常小儿脉象平和,与成人比较具有的特点是

- A.软而稍数
- B.浮而稍数
- C.软而稍细
- D.浮而稍缓
- E.软而稍缓

【答案】A

【解析】小儿正常脉象较成人软而稍数,年龄越小,脉搏至数越快。

涉及考点 | 儿科切诊特点及临床意义

10.小儿“地图舌”是由于

- A.宿食内停
- B.胃之气阴不足
- C.脾失健运
- D.肺气虚弱
- E.脾阳亏虚

【答案】B

【解析】舌苔花剥,状如地图,时隐时现,经久不愈,多为胃之气阴不足所致。

涉及考点 | “地图舌”出现的机理

11.解颅、五迟五软、遗尿共同治法是

- A.益气养血法
- B.温补肾阳法
- C.培元补肾法
- D.益气养阴法
- E.滋补肾阴法

【答案】C

【解析】培元补肾法适用于小儿胎禀不足,肾气虚弱,及肾不纳气之证,如胎怯、五迟、五软、遗尿、解颅、哮喘等。

涉及考点 | 儿科常用内治法及其适应病证

12.新生女婴,乳房隆起如蚕豆大小的处理方法

- A.药物外治
- B.及早给氧
- C.不予处理
- D.供给足够能量和液体
- E.针灸疗法

【答案】C

【解析】女婴出生后3~5天乳房出现蚕豆到鸽蛋大小的隆起,可在2~3周后消退,属于新生儿的特殊生理状态,不需特殊处理。

涉及考点 | 新生儿的特殊生理现象

13.婴儿,4个月。前囟未闭,后囟已闭。其诊断是

- A.前囟晚闭
- B.闭合正常
- C.囟门早闭
- D.囟门晚闭
- E.后囟早闭

【答案】B

【解析】前囟应在小儿出生后的12~18个月闭合。后囟在部分小儿出生时就已经闭合。未闭合者应在生后2~4个月内闭合。

涉及考点 | 囟门的闭合时间

14. 生理性胎黄的特点是

- A. 早产儿黄疸轻, 消退早
- B. 黄疸常于生后 1 周内消退
- C. 早产儿与足月产儿无明显差别
- D. 早产儿 24 小时内出现黄疸
- E. 黄疸常于生后 2~3 天出现

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后 2~3 日出现, 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退, 早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

15. 下列各项, 新生儿生理性黄疸到达高峰期的时间是

- A. 16~20 天
- B. 11~15 天
- C. 4~6 天
- D. 2~3 天
- E. 7~10 天

【答案】C

【解析】生理性黄疸生后 2~3 日出现黄疸, 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退, 早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

16. 小儿咳嗽的主要内因是

- A. 肺脏娇嫩
- B. 肺脾虚弱
- C. 痰浊阻肺
- D. 阴常不足
- E. 阳常有余

【答案】B

【解析】小儿咳嗽的病因, 主要外因为感受风邪, 主要内因为肺脾虚弱。

涉及考点 | 咳嗽的主要病因

17. 肺炎喘嗽恢复期症见久咳、咳痰无力, 痰稀白易咯, 纳呆便溏, 面白少华, 神疲乏力。应首选的方剂是

- A. 人参五味子汤
- B. 人参乌梅汤
- C. 百合固金汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 生脉饮

【答案】A

【解析】久病不愈, 损伤肺脾, 肺气虚弱, 则咳痰无力, 脾虚不运则纳呆便溏。故辨证为肺气虚。方药应为人参五味子汤。

涉及考点 | 肺炎喘嗽的辨证

18. 治疗小儿寒性哮喘证, 应首选的方剂是

- A. 小青龙汤合三子养亲汤
- B. 射干麻黄汤合二陈汤
- C. 麻杏石甘汤合苏葶丸
- D. 大青龙汤合定喘丸
- E. 玉屏风散合都气丸

【答案】A

【解析】小儿寒性哮喘证多由外感风寒而诱发, 基本病机为外寒内饮。治法为温肺散寒, 涤痰定喘, 方用小青龙汤合三子养亲汤。

涉及考点 | 哮喘的辨证论治

19.泄泻的基本治疗原则是

- | | |
|--------|--------|
| A.健脾化湿 | B.运脾化湿 |
| C.祛风散寒 | D.清肠化湿 |
| E.消食化积 | |

【答案】B

【解析】泄泻治疗,以运脾化湿为基本法则。实证以祛邪为主,根据不同的证型分别治以清肠化湿、祛风散寒、消食导滞。虚证以扶正为主,分别治以健脾益气、温补脾肾。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

20.小儿湿热泻的首选方剂是

- | | |
|-------------|-----------|
| A.附子理中汤合四神丸 | B.葛根黄芩黄连汤 |
| C.保和丸 | D.参苓白术散 |
| E.藿香正气散 | |

【答案】B

【解析】湿热泻的治法为清肠解热,化湿止泻,方用葛根黄芩黄连汤;保和丸为伤食泻的代表方;藿香正气散为风寒泻的代表方;参苓白术散为脾虚泻的代表方;附子理中汤合四神丸为脾肾阳虚泻的代表方。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

2年 易错考题

1.按公式计算,9个月婴儿正常体重是

- | | |
|----------|---------|
| A.9.8kg | B.9.5kg |
| C.9kg | D.8.5kg |
| E.8.25kg | |

【答案】E

【解析】小儿体重公式: <6 个月,体重(kg) $=3+0.7\times$ 月龄, $7\sim12$ 个月体重(kg) $=6+0.25\times$ 月龄。 1 岁以上体重(kg) $=8+2\times$ 年龄。 9 个月体重(kg) $=6+0.25\times9=8.25$ 。

涉及考点 | 体重测量方法

2.小儿细动作的发育,正常会拇指、食指拾东西的年龄是

- | | |
|-----------|---------|
| A.13~14个月 | B.7~9个月 |
| C.11~12个月 | D.5~6个月 |
| E.9~10个月 | |

【答案】E

【解析】手指精细运动的发育过程为:新生儿时双手握拳; $3\sim4$ 个月时可自行玩手,并企图抓东西; 5 个月时眼与手的动作取得协调,能有意识地抓取面前的物品; $5\sim7$ 个月时出现换手与捏、敲等探索性的动作; $9\sim10$ 个月时可用拇指、食指拾东西; $12\sim15$ 个月时学会用匙,乱涂鸦; 18 个月时能摆放 $2\sim3$ 块方积木; 2 岁时会粗略地翻书页; 3 岁时会穿简单的衣服。

涉及考点 | 小儿的动作发育

3.“纯阳”学说是指小儿

- A.有阳无阴
C.形气未充
E.脏腑娇嫩
- B.发育迅速
D.阳亢阴亏

【答案】B

【解析】“纯阳”学说最早见于《颅囟经》，其提出“孩儿三岁以下，呼为纯阳，元气未散”。用“纯阳”一词来表述小儿时期的体质特点，即阳相对偏盛，生机比较旺盛，发育迅速，说明小儿时期机体的阴阳是以阳生为主导趋势。选项 C、E 是小儿的生理特点。选项 A、D 是对“纯阳”的曲解。

涉及考点 | 小儿生理特点

- 4.历代儿科医家对于小儿诊法特别重视
- A.四诊合参
C.闻诊
E.切诊
- B.望诊
D.问诊

【答案】B

【解析】历代儿科医家对于小儿诊法，既主张四诊合参，又特别重视望诊，诚如《幼科铁镜·望形色审苗窍从外知内》所说：“而小儿科，则惟以望为主。”所以本题选 B。

涉及考点 | 儿科四诊应用特点

- 5.小儿发生强烈传染性疾病的病邪很多，其中最重要的是
- A.风邪
C.燥邪
E.风寒
- B.湿热
D.疫疠

【答案】D

【解析】小儿肺常不足，腠理不密，肌肤疏松，病邪从口鼻皮毛而入，易感疫疠之气，而引起时行疾病，感受疫疠之气，病情常较危重，并有相互传染的特点。

涉及考点 | 儿科的病因特点

- 6.小儿食指脉络色紫黑，其证候是
- A.内有虚寒
C.外感风热
E.瘀热内结
- B.邪热郁滞
D.血络郁闭

【答案】D

【解析】指纹诊的辨证纲要归纳为“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实，三关测轻重”。指纹色紫黑，多为瘀滞络闭，病情深重。

涉及考点 | 儿科望诊特点及临床意义

- 7.不属于儿科中医学治疗用药原则的是
- A.处方轻巧灵活
C.注意顾护脾胃
E.重视先证而治
- B.稚阴稚阳之体，重在滋补阴阳
D.治疗要及时，正确和审慎

【答案】B

【解析】不属于儿科中医学治疗用药原则的是稚阴稚阳之体，重在滋补阴阳。

涉及考点 | 小儿用药原则

8.母乳喂养的原则是

- A.按时喂给
B.按需喂给
C.定量喂给
D.定次喂给
E.昼夜均喂

【答案】B

【解析】母乳喂养时,应由乳母细心观察婴儿的个体需要,按其所需哺乳,即“按需喂给”这是我国传统的也是当今世界卫生组织提倡的喂养原则。

涉及考点 | 母乳喂养的方法

9.胎儿期体重增长快的阶段是

- A.妊娠中期 15 周
B.妊娠晚期 13 周
C.妊娠中期 10 周
D.妊娠早期 4 周
E.妊娠早期 12 周

【答案】B

【解析】妊娠早期 12 周的胚胎期,从受精卵细胞至基本形成胎儿,最易受到各种病理因素,如感染、药物、劳累、物理、营养缺乏以及不良心理因素等伤害,造成流产、死胎或先天畸形。妊娠中期 15 周,胎儿各器官迅速增长,功能也渐成熟。妊娠晚期 13 周,胎儿以肌肉发育和脂肪积累为主,体重增长快。后两个阶段若胎儿受到伤害,易发生早产。

涉及考点 | 胎儿的体重增长

10.足月儿生理性黄疸正常消退的时间是

- A.生后 20~24 天
B.生后 4~6 天
C.生后 2~3 天
D.生后 15~18 天
E.生后 10~14 天

【答案】E

【解析】生理性黄疸生后 2~3 日出现黄疸,4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退,早产儿可延迟至 3~4 周消退。

涉及考点 | 胎黄的诊断

11.下列除哪项外,均属病理性胎黄

- A.黄疸持续加深
B.黄疸 3 周后仍不消退
C.黄疸退而复现
D.生后 24 小时内出现
E.黄疸 10~14 天左右消退

【答案】E

【解析】生理性胎黄大多在生后 2~3 天出现,4~6 天达高峰,2 周消退,早产儿持续时间较长,除有轻微食欲不振外,一般无其他临床症状。病理性胎黄常在生后 24 小时内出现黄疸,黄疸持续加深,或消退后复现,3 周后仍不消退。黄疸 10~14 天左右消退不属病理性胎黄。

涉及考点 | 胎黄的鉴别诊断

12.肺炎喘嗽常见的临床症状不包括

- A.发热
B.咳嗽
C.气促
D.呼吸困难
E.抽搐

【答案】E

【解析】肺炎喘嗽常见到起病急,有气喘、咳嗽、痰鸣、发热等症。重者可见张口抬肩、呼吸困难、面色苍白、口唇青紫等症。肺部听诊可闻及中细湿啰音。抽搐可见于变证。

涉及考点 | 肺炎喘嗽的诊断

13. 小儿哮喘反复发作,主要是因为

- | | |
|---------|---------|
| A. 肾阳亏虚 | B. 脾虚湿盛 |
| C. 肺气不足 | D. 感触外邪 |
| E. 宿痰伏肺 | |

【答案】E

【解析】哮喘的病机关键在痰伏于肺,形成夙根,遇触即发。夙痰久伏造成哮喘反复发作。哮喘发作的机制,在于外因引动伏痰,痰气相合。发作之时,痰随气升,气因痰阻,相互搏结,壅塞气道,气息不畅,因而产生呼吸喘促,呼气延长,痰随呼吸气息升降,发出哮鸣之声。

涉及考点 | 哮喘的病因病机

14. 大便澄澈清冷、完谷不化的病机是

- | | |
|---------|---------|
| A. 气阴两伤 | B. 脾肾阳虚 |
| C. 感受外邪 | D. 脾胃虚弱 |
| E. 伤于饮食 | |

【答案】B

【解析】大便澄澈清冷、完谷不化,为脾肾阳虚泻。感受外邪泄,大便呈水样。伤食泻,大便稀溏,夹有乳凝块或食物残渣。脾胃虚弱泻,大便稀溏,色淡不臭。气阴两伤泻,质稀如水,皮肤干燥等。

涉及考点 | 泄泻的病机

15. 参苓白术散治疗小儿泄泻的证候是

- | | |
|----------|--------|
| A. 脾虚泻 | B. 湿热泻 |
| C. 脾肾阳虚泻 | D. 风寒泻 |
| E. 伤食泻 | |

【答案】A

【解析】小儿泄泻脾虚证的治法为健脾益气,助运止泻,方用参苓白术散。风寒泻方用藿香正气散;湿热泻方用葛根芩连汤;伤食泻方用保和丸;脾肾阳虚泻方用附子理中汤合四神丸。

涉及考点 | 泄泻的辨证论治

第九章 针灸学



高频考点必背

1. 经络系统由**经脉和络脉**组成,其中经脉包括十二经脉、奇经八脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部。
2. **奇经八脉**包括:督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉。
3. 手经表示其外行路线分布于**上肢**,足经表示其外行路线分布于**下肢**。
4. 与六脏相配属的**六条阴经**(六阴经),分布于**四肢内侧和胸腹**,上肢内侧为手三阴经,下肢内侧为足三阴经。
5. 手足阳经分布规律为**阳明在前、少阳在中、太阳在后**。
6. 手足阴经分布规律为**太阴在前、厥阴在中、少阴在后**。
7. 其中足三阴经在足内踝上**8寸以下**为厥阴在前、太阴在中、少阴在后,至内踝上**8寸以上**,太阴交出于厥阴之前。
8. 十二经脉的循行走向与交接规律歌诀:**肺大胃脾心小肠,膀胱包焦胆肝藏**。
9. **督脉、任脉、冲脉**皆起于胞中,同出会阴,称为“**一源三歧**”。
10. **带脉**起于胁下,绕行腰间一周。
11. 阴维脉起于小腿内侧,沿腿股内侧上行,至**咽喉与任脉会合**。
12. 阳维脉起于足跗外侧,沿腿膝外侧上行,至**项后与督脉相会**。
13. 阴跷脉起于足跟内侧,随足少阴等经上行,至**目内眦与阳跷脉会合**。
14. 阳跷脉起于足跟外侧,伴足太阳等经上行,至**目内眦与阴跷脉会合**,再沿足太阳经上额,于**项后**会合足少阳经。
15. 任脉:任养六阴经,调节全身阴经经气,故称“**阴脉之海**”。
16. 督脉:督领六阳经,调节全身阳经经气,故称“**阳脉之海**”。
17. 冲脉具有涵蓄十二经气血的作用,有“**十二经脉之海**”和“**血海**”之称。
18. 带脉起于胁下,环腰一周,状如束带**约束纵行躯干的诸条经脉**。
19. 阳维脉主一身之表,阴维脉主一身之里,阴阳维脉具有**维系一身阴经和阳经**的作用。
20. 阴阳跷脉主肢体两侧的阴阳,**调节下肢运动与寤寐**。

5年 历年真题

1. 足三阳经的循行规律是

- A. 从胸走手
- C. 从头走足
- E. 从胸走足

- B. 从足走头
- D. 从足走腹胸

【答案】C

【解析】十二经脉的循行走向规律是:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹胸。

涉及考点 | 十二经脉的循行走向

2. 十二经脉的交接中, 阴经与阳经交接的部位是

- A. 腹部
- B. 胸部
- C. 头部
- D. 手足末端
- E. 下腿部

【答案】D

【解析】十二经脉的交接中, 相为表里的阴经与阳经在手足末端交接; 同名的阳经与阴经在头面部交接; 相互衔接的阴经和阴经在胸中交接。

涉及考点 | 十二经脉循行走向

3. 在胸部, 距前正中线 4 寸的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 足阳明胃经
- C. 手太阴肺经
- D. 足太阴脾经
- E. 手厥阴心包经

【答案】B

【解析】足阳明胃经在胸部距前正中线 4 寸, 在腹部距前正中线 2 寸。

涉及考点 | 胃经循行走向

4. 根据骨度分寸定位法, 脐中至耻骨联合上缘的长度是

- A. 5 寸
- B. 7 寸
- C. 8 寸
- D. 9 寸
- E. 2 寸

【答案】A

【解析】脐中至耻骨联合上缘的长度是 5 寸。

涉及考点 | 骨度分寸定位法

5. 下列哪项属于近部选穴

- A. 头痛取膈俞
- B. 脱肛取百会
- C. 咳嗽取列缺
- D. 鼻病选迎香
- E. 鼻病选合谷

【答案】D

【解析】迎香穴: 在鼻翼外缘中点旁开, 当鼻唇沟中, 治疗鼻病属近治选穴。

涉及考点 | 腧穴的主治特点

6. 在腧穴定位法中, 腰阳关的取穴依据是

- A. 简便取穴法
- B. 手指同身寸法
- C. 固定标志
- D. 活动标志
- E. 骨度分寸法

【答案】C

【解析】常用腧穴定位法有 4 种: 骨度分寸定位法、体表解剖标志定位法、手指同身寸定位法、简便定位法。其中体表解剖标志定位法依据解剖标志分为固定标志和活动标志, 固定标志是在自然姿势下可见的标志, 活动标志是在活动姿势下才会出现的标志。腰阳关位于后正中线上, 第 4 腰椎棘突下凹陷中, 约与髂嵴相平。第 4 腰椎与肌肉所形成的凹陷是在自然姿势下可见的标志, 为固定标志。

涉及考点 | 体表解剖标志定位法

7.手阳明大肠经的募穴是

- A.中腕
B.膻中
C.期门
D.天枢
E.中极

【答案】D

【解析】募穴记忆歌诀：肺募中府脾章门，大肠天枢焦石门，心募巨阙包膻中，小肠关元肝期门，胃募中脘胆日月，膀胱中极肾京门。

涉及考点 | 募穴

8.太溪穴的定位是

- A.在踝区，外踝尖与跟腱之间的凹陷处
B.在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处
C.在踝区，内踝下方的凹陷处
D.在踝区，外踝下方的凹陷处
E.在踝区，内踝与胫骨前肌腱之间的凹陷处

【答案】B

【解析】太溪穴在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷中。

涉及考点 | 太溪穴的定位

9.通里的定位是在

- A.腕掌侧远端横纹上，尺侧腕屈肌腱桡侧缘
B.腕掌侧远端横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘
C.腕掌侧远端横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘
D.腕掌侧远端横纹上 1.5 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘
E.腕掌侧远端横纹上 2 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘

【答案】C

【解析】通里：腕掌侧远端横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。神门：腕掌侧远端横纹上，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。阴郄：腕掌侧远端横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。

涉及考点 | 通里穴的定位

10.下列腧穴中，善治头面诸疾的是

- A.商阳
B.二间
C.合谷
D.阳溪
E.曲池

【答案】C

【解析】合谷(原穴)：在手背，第 2 掌骨桡侧的中点处。简便取穴法：以一手的拇指指间关节横纹，放在另一手拇、示指之间的指蹼缘上，当拇指尖下是穴；主治：①头痛、目赤肿痛、鼻衄、齿痛、口眼歪斜、耳聋等头面五官诸疾。②发热恶寒等外感病证。③热病无汗或多汗；④经闭、滞产等妇产科病证；⑤上肢疼痛、不遂；⑥牙拔除术、甲状腺手术等口面五官及颈部手术针麻常用穴。

涉及考点 | 合谷穴的主治

11.可治疗小儿惊风的选穴是

- A.悬钟
B.风市
C.阳陵泉
D.环跳
E.足临泣

【答案】C

【解析】可治疗小儿惊风的穴位有尺泽、涌泉、中冲、阳陵泉、太冲、大椎、印堂。

涉及考点 | 阳陵泉的主治

12.既能治疗肠腑病,又能治疗妇科病的腧穴是

- A.归来
- B.足三里
- C.丰隆
- D.天枢
- E.内庭

【答案】D

【解析】天枢(大肠之募穴)主治:①腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病证。②月经不调、痛经等妇科疾患。

涉及考点 | 天枢穴的主治

13.位于第9胸椎棘突下,旁开1.5寸的腧穴是

- A.膀胱俞
- B.大肠俞
- C.肝俞
- D.胃俞
- E.肾俞

【答案】C

【解析】肝俞位于第9胸椎棘突下,旁开1.5寸;膀胱俞位于第2骶椎棘突下,旁开1.5寸,约平第2骶后孔;大肠俞位于第4腰椎棘突下,旁开1.5寸;胃俞位于第12胸椎棘突下,旁开1.5寸;肾俞位于第2腰椎棘突下,旁开1.5寸。

涉及考点 | 肝俞的定位

14.脐下4寸,前正中线旁开2寸的腧穴是

- A.水道
- B.归来
- C.梁门
- D.天枢
- E.大横

【答案】B

【解析】归来:脐下4寸,前正中线旁开2寸。梁门:脐上4寸,前正中线旁开2寸。天枢:横平脐中,前正中线旁开2寸。大横:横平脐中,前正中线旁开4寸。

涉及考点 | 归来的定位

15.下列各项,属本经配穴法是

- A.太阳头痛取后溪、昆仑
- B.失眠取神门、太溪
- C.牙痛取颊车、内庭
- D.感冒咽痛取曲池、少商
- E.肝病取太冲、阳陵泉

【答案】C

【解析】此题需要知道各穴位归属的经脉。C颊车和内庭都属于足阳明胃经。

涉及考点 | 十二经络的腧穴

16.下列哪组腧穴被称为“四关”穴

- A.内关、外关
- B.合谷、太冲
- C.曲池、足三里
- D.外关、阳陵泉
- E.尺泽、委中

【答案】B

【解析】四关穴即合谷、太冲穴的总称。合谷穴是手阳明大肠经的原穴,四总穴之一。位

于第一、二掌骨之间,也就是俗称的“虎口”。太冲穴是足厥阴肝经的输穴和原穴。位于足背第一、二跖骨之间。合谷穴与太冲穴都是人体的重要保健穴位,两穴合称为“四关穴”,是人体生命的关口。

涉及考点 | 四关穴的腧穴组成

17.痛在腰脊中部,与之相关的经脉是

- A.足太阳膀胱经
- B.足少阴肾经
- C.足少阳胆经
- D.带脉
- E.督脉

【答案】E

【解析】腰痛病位在腰,腰为肾之府,肾经贯脊属肾,膀胱经夹脊络肾,督脉并于脊里,行于后背正中;本病与肾及足太阳膀胱经、督脉关系密切。根据疼痛部位进行经络辨证:疼痛在腰脊中部者为督脉病证,疼痛在腰脊两侧者为足太阳经证。

涉及考点 | 腰痛的辨证论治

18.隔蒜灸多用于治疗

- A.阳痿早泄
- B.呕吐腹痛
- C.未溃疮疡
- D.腹痛泄泻
- E.疮疡久溃

【答案】C

【解析】隔蒜灸有清热解毒、杀虫等作用,多用于治疗瘰疬、肺癆及肿疡初起等病证。

涉及考点 | 隔蒜灸

19.治疗丹毒、扭伤常选的拔罐法是

- A.留罐法
- B.走罐法
- C.闪罐法
- D.刺血拔罐法
- E.留针拔罐法

【答案】D

【解析】刺血拔罐法:多用于热证、实证、瘀血证及某些皮肤病,如神经性皮炎、痤疮、丹毒、扭伤、乳痈等。

涉及考点 | 拔罐的作用

20.太冲穴的定位是

- A.足背,当第1、2趾间的趾蹠缘上方纹头处
- B.足背,当第2、3趾间的趾蹠缘上方纹头处
- C.足背,第1、2跖骨结合部之前凹陷中
- D.足背,第2、3跖骨结合部之前凹陷中
- E.内踝前1寸,胫骨前肌腱内缘凹陷中

【答案】C

【解析】太冲(输穴;原穴):在足背,第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动处。

涉及考点 | 太冲穴的定位

2年 易错考题

1.足三阴经从开始部位至内踝上8寸以下的分布是

- A. 太阴在前,厥阴在中,少阴在后
 B. 厥阴在前,少阴在中,太阴在后
 C. 少阴在前,太阴在中,厥阴在后
 D. 厥阴在前,太阴在中,少阴在后
 E. 太阴在前,少阴在中,厥阴在后

【答案】D

【解析】手足三阴经为太阴在前,厥阴在中,少阴在后。其中足三阴经在足内踝上8寸以下为厥阴在前,太阴在中,少阴在后,至内踝8寸以上,太阴交出于厥阴之前。

涉及考点 | 十二经脉的分布规律

2. 下列穴位中,既是输穴,还是八会穴的是

- A. 太冲
 B. 太渊
 C. 太溪
 D. 神门
 E. 公孙

【答案】B

【解析】首先太渊为肺经原穴,阴经的原穴等于输穴,“以输为原”,并且是八会穴中的脉会,可以治疗“无脉症”。

涉及考点 | 八会穴

3. 股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是

- A. 14 寸
 B. 15 寸
 C. 16 寸
 D. 18 寸
 E. 19 寸

【答案】E

【解析】股骨大转子至腓横纹的骨度分寸是19寸。

涉及考点 | 骨度分寸定位法

4. 奇经八脉中,主一身之里的经脉是

- A. 任脉
 B. 督脉
 C. 冲脉
 D. 带脉
 E. 阴维脉

【答案】E

【解析】奇经八脉中,阳维脉主一身之表,阴维脉主一身之里,阴阳维脉具有维系一身阴经和阳经的作用。

涉及考点 | 奇经八脉的作用及临床意义

5. 体现“经脉所过,主治所及”腧穴治疗规律是

- A. 对症选穴
 B. 辨证选穴
 C. 远部选穴
 D. 近部选穴
 E. 辨病选穴

【答案】C

【解析】远部选穴是指选取距离病痛较远处部位的腧穴。这一选穴原则是根据腧穴具有远治作用的特点提出来的,体现了“经脉所过,主治所及”的治疗规律,是针灸处方选穴的基本方法。

涉及考点 | 腧穴治疗规律

6. 根据腧穴主治规律,手三阴经腧穴相同的主治病证是

- A.头面部疾病
B.颈项部疾病
C.胸部疾病
D.腹部疾病
E.神志疾病

【答案】C

【解析】手太阴经主治规律:肺、喉病、胸部病;手厥阴经主治规律:心、胃病、神志病、胸部病;手少阴经主治规律:心病;神志病、胸部病。

涉及考点 | 腧穴主治规律

7.治疗咽喉肿痛的首选穴是

- A.孔最
B.尺泽
C.列缺
D.太渊
E.少商

【答案】E

【解析】少商(井穴):在手指,拇指末节桡侧,指甲根角侧上方0.1寸(指寸)。主治:①咽喉肿痛、鼻衄等肺系实热证。②高热,昏迷,癫狂。③指肿,麻木。

涉及考点 | 少商穴的腧穴主治

8.肩髃穴归属的经脉是

- A.手阳明大肠经
B.手太阴肺经
C.手太阳小肠经
D.手少阳三焦经
E.手厥阴心包经

【答案】A

【解析】肩髃穴在三角肌区,肩峰外侧缘前端与肱骨大结节两骨间凹陷中,属手阳明大肠经。

涉及考点 | 手阳明循行的腧穴

9.提插补泻法中,泻法的操作手法是

- A.重插轻提,幅度大,频率快
B.重插轻提,幅度小,频率快
C.重插轻提,幅度小,频率慢
D.轻插重提,幅度小,频率快
E.轻插重提,幅度大,频率快

【答案】E

【解析】提插补泻法-泻法:针下得气后,先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快,操作时间长者为泻法。

涉及考点 | 泻法的操作手法

10.下关穴所属的经脉是

- A.手太阴肺经
B.手阳明大肠经
C.足阳明胃经
D.足太阴脾经
E.手少阴心经

【答案】C

【解析】下关穴在面部,颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中,属足阳明胃经。

涉及考点 | 足阳明胃经的腧穴

11.手太阳小肠经的郄穴是

- A.会宗
B.梁丘

- C.养老
E.金门
- D.阳交

【答案】C

【解析】会宗是三焦经的郄穴，梁丘是胃经的郄穴，养老是小肠经的郄穴，阳交是阳维脉的郄穴，金门是膀胱经的郄穴。

涉及考点 | 手阳明小肠经的腧穴

12. 面瘫伴麻木、味觉减退，除主穴外，还应选择的配穴是

- A.承浆
B.水沟
C.廉泉
D.翳风
E.风池

【答案】C

【解析】面瘫配穴：舌麻、味觉减退配廉泉、足三里。

涉及考点 | 面瘫的配穴

13. 十宣穴的定位是

- A.在足背侧，第1至第5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处
B.在手背侧，当第2、3掌骨间，指掌关节后约0.5寸处
C.在手背侧，微握拳，第1至第5指间，指蹼缘后方赤白肉际处
D.在第2至第5指掌侧，近端指关节的中央
E.在手十指尖端，距指甲游离缘0.1寸

【答案】E

【解析】十宣穴位于手十指尖端，距指甲游离缘0.1寸。选项A为八风。选项B为外劳宫。选项C为八邪。选项D为四缝。

涉及考点 | 十宣的定位

14. 治疗疮疡溃后不敛，适宜的灸法是

- A.灯火灸
B.隔姜灸
C.蒜泥灸
D.隔附子饼灸
E.白芥子灸

【答案】D

【解析】隔附子饼灸有温补肾阳等作用，多用于治疗命门火衰而致的阳痿、早泄或疮疡久溃不敛等病证。

涉及考点 | 隔附子饼灸

15. 胆囊穴的定位是在小腿外侧上部，当腓骨小头前下方凹陷处直下

- A.1寸
B.1.5寸
C.2寸
D.2.5寸
E.3寸

【答案】C

【解析】胆囊穴：在小腿外侧，腓骨小头直下2寸。主治：①急、慢性胆囊炎，胆石症，胆道蛔虫症等胆腑病证。②下肢痿痹。

涉及考点 | 胆囊穴的定位

第十章 诊断学基础



高频考点必背

1. **感染性发热**临床**最多见**,各种病原体所引起的急、慢性感染均能引起感染性发热。
2. **稽留热**体温持续于 $39\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上,24小时波动范围不超过 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$,达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。
3. **弛张热**体温在 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上,但波动幅度大,24小时内体温差达 $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上,最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核和化脓性炎症等。
4. **回归热**体温骤然升至 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上,持续数日后又骤然下降至正常水平,高热期与无热期各持续若干日后即有规律地交替一次。见于回归热、霍奇金病、周期热等。
5. **波状热**体温逐渐升高达 $39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或以上,数天后逐渐下降至正常水平,数天后再逐渐升高,如此反复多次。见于布氏杆菌病。
6. 呼吸幅度加深见于严重代谢性酸中毒时,病人可以出现节律匀齐,呼吸深而大,不感呼吸困难的呼吸,称为**库斯莫尔呼吸**(酸中毒大呼吸),见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒等。
7. **潮式呼吸**:特点是呼吸由浅慢逐渐变为深快,由深快逐渐变为浅慢,直至呼吸停止片刻,再开始上述周期性呼吸,形成如潮水涨落的节律,见于脑炎、脑膜炎、颅内压增高等。
8. 非化脓性肋软骨炎,多侵犯**第1、2肋软骨**;心绞痛与急性心肌梗死的疼痛常位于**胸骨后或心前区**,常牵涉至左肩背、左臂内侧;食管、膈和纵隔肿瘤常为**胸骨后疼痛**。
9. 胸痛的性质:带状疱疹呈阵发性的灼痛或刺痛;食管炎常呈灼痛或**灼热感**;心绞痛常呈**压榨样痛**,可伴有窒息感;心肌梗死则疼痛更为剧烈,并有**恐惧、濒死感**。
10. 干性胸膜炎常呈尖锐刺痛或撕裂痛,**呼吸时加重,屏气时消失**。
11. 心绞痛常因劳力后诱发,**含服硝酸甘油可迅速缓解**;心肌梗死的胸痛含服硝酸甘油**不能缓解**。
12. 急性腹膜炎由**胃、肠穿孔**引起者最常见,伴有腹部压痛、反跳痛与腹肌紧张,肠鸣音减弱或消失。
13. 胃、十二指肠疾病、急性胰腺炎疼痛多在**中上腹部**;肝、胆疾患疼痛位于**右上腹**;急性阑尾炎早期疼痛在**脐周或上腹部**,数小时后转移至右下腹。
14. 小肠绞痛位于**脐周**;结肠疾病疼痛多位于**下腹或左下腹**;膀胱炎、盆腔炎症及异位妊娠破裂引起的疼痛在**下腹部**;空腔脏器穿孔后引起弥漫性腹膜炎则为**全腹痛**。
15. 消化性溃疡常有**慢性、周期性、节律性中上腹隐痛或灼痛**,如突然呈剧烈的刀割样、烧灼样持续性疼痛,可能并发急性穿孔;并发幽门梗阻者为胀痛,于呕吐后减轻或缓解。
16. 咯粉红色泡沫痰为**急性左心衰竭**的表现。咯血量大而骤然停止可见于支气管扩张症。痰中带血多见于浸润型肺结核。多次少量反复咯血要注意除外支气管肺癌。
17. 吸气性呼吸困难表现为**胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙**在吸气时明显凹陷,称为“三凹征”,常伴有频繁干咳及高调的吸气性喘鸣音。
18. 心源性呼吸困难主要由左心衰竭引起,具有以下特点:**劳力性呼吸困难、端坐呼吸和夜间阵发性呼吸困难**。

19.代谢性酸中毒**呼吸深大而规则**,可伴有鼾声,称(Kussmaul)呼吸。见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒。

20.吗啡、巴比妥类、有机磷农药中毒时,致呼吸减慢,也可呈**潮式呼吸**。一氧化碳、氰化物中毒时均可引起**呼吸加快**。

21.心源性水肿特点:是**下垂性水肿**,严重者可出现胸腔积液、腹腔积液等,常伴有呼吸困难、心脏扩大、心率加快、颈静脉怒张、**肝颈静脉回流征阳性**等表现。

22.肾源性水肿特点:为**早期晨起时眼睑或颜面水肿**,以后发展为全身水肿,伴有血尿、少尿、蛋白尿、管型尿、高血压、贫血等表现。

23.肝源性水肿:常有**腹腔积液**,也可出现**下肢踝部水肿并向上蔓延**,头、面部及上肢常无水肿。常伴有肝功能受损及门静脉高压等表现,可见**肝掌**、**蜘蛛痣**等。

24.内分泌源性水肿:见于甲状腺功能减退症等黏液性水肿,特点是**非凹陷性**,颜面及下肢较明显,病人常伴有精神萎靡、食欲不振。

25.水肿伴颈静脉怒张、肝脏肿大和压痛、肝-颈静脉反流征阳性,见于**心源性水肿**;伴高血压、蛋白尿、血尿、管型,见于**肾源性水肿**。

26.贫血面容:**面色苍白,口唇色淡,表情疲惫**见于各种原因所致的贫血。

27.胸膜的任何部位均可出现胸膜摩擦感,但以**腋中线第5~7肋间隙**最易感觉到,临床意义同胸膜摩擦音。

28.**支气管呼吸音**正常人在喉部、胸骨上窝、背部第6颈椎至第2胸椎附近均可听到,如在肺部其他部位听到支气管呼吸音则为病理现象。

29.左心室肥大、甲亢、重症贫血、发热等疾病时**心尖搏动增强**;心包积液、左侧气胸或胸腔积液、肺气肿等,**心尖搏动减弱甚或消失**。

30.心尖区粗糙的吹风样收缩期杂音,常提示**二尖瓣关闭不全**。

5年 历年真题

1.下列疾病,表现为弛张热的是

- A.布氏杆菌病
- B.风湿热
- C.肺炎链球菌肺炎
- D.渗出性胸膜炎
- E.疟疾

【答案】B

【解析】选项A表现为波状热。选项C表现为稽留热。选项D表现为不规则热。选项E表现为间歇热。弛张热体温常在39℃以上,波动幅度大,24小时内波动范围超过2℃,但都在正常水平以内,常见于败血症、风湿热、肺结核及化脓性炎症等。

涉及考点 | 发热的临床表现

2.属于无菌性坏死物质吸收导致发热的是

- A.风湿热
- B.急性溶血
- C.脑出血
- D.甲状腺功能亢进症
- E.慢性心功能不全

【答案】B

【解析】选项A属于非感染性发热中的抗原-抗体反应。选项C属于非感染性发热中的体温调节中枢功能失常。选项D属于非感染性发热中的内分泌与代谢障碍。选项E属于非感

染性发热中的皮肤散热减少。选项 B 属于非感染性发热中的无菌性坏死物质吸收,除此之外还有大手术、内出血、大面积烧伤、恶性肿瘤、白血病、心肌梗死等属于非感染性发热中的无菌性坏死物质吸收。

涉及考点 | 发热的病因

3.胸痛常表现为呼吸时加重,屏气时消失的疾病是

- | | |
|---------|----------|
| A.食管癌 | B.急性心肌梗死 |
| C.干性胸膜炎 | D.支气管肺癌 |
| E.肋间神经痛 | |

【答案】C

【解析】选项 A 表现为胸骨后疼痛。选项 B 表现为剧烈疼痛,常有恐惧、濒死感。选项 D 表现为胸部闷痛,常伴有咯血。选项 D 表现为刺痛或灼痛,有沿肋间神经放射的特点。干性胸膜炎常呈尖锐刺痛或撕裂痛,伴呼吸时加重,屏气时消失。

涉及考点 | 胸痛的问诊要点

4.血尿伴剧烈腹痛最常见于

- | | |
|---------|--------|
| A.过敏性紫癜 | B.膀胱结核 |
| C.泌尿系结石 | D.肾炎 |
| E.肾肿瘤 | |

【答案】C

【解析】选项 A 常出现血尿、皮肤紫癜和关节肿痛,排除 A。选项 B 常出现血尿伴尿频、尿急和尿困难,排除 B。选项 D 常出现血尿伴有水肿、高血压、蛋白尿,排除 D。选项 E 常出现血尿伴肾肿块,排除 E。血尿伴肾绞痛是肾或输尿管结石的特征,所以本题选 C。

涉及考点 | 腹痛的问诊要点

5.犬吠样咳嗽,可见于

- | | |
|----------|---------|
| A.急性支气管炎 | B.肺结核 |
| C.肺癌 | D.支气管哮喘 |
| E.急性喉炎 | |

【答案】E

【解析】咳嗽的音色指咳嗽声音的特点。①咳嗽声音嘶哑,多为声带的炎症或肿瘤压迫喉返神经所致;②犬吠样咳嗽,表现为连续阵发性剧咳伴有高调吸气回声,多见于喉头炎症、水肿或气管异物,若带有鸡鸣样吼声常见于百日咳;③金属音咳嗽,常见于因纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌直接压迫气管所致的咳嗽;④咳嗽声音低微或无力,见于严重肺气肿、声带麻痹及极度衰弱者。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

6.可见干性咳嗽的疾病是

- | | |
|----------|-------|
| A.慢性咽喉炎 | B.胸膜炎 |
| C.慢性支气管炎 | D.肺脓肿 |
| E.肺炎 | |

【答案】B

【解析】湿性咳嗽见于慢性咽喉炎、慢性支气管炎、支气管扩张症、肺炎、肺脓肿、空洞型肺结核等,排除选项 A、C、D、E。干性咳嗽见于急性咽喉炎、急性支气管炎初期、胸膜炎、轻症肺

结核、肺癌等。

涉及考点 | 咳嗽与咳痰的问诊要点

7. Kussmaul 呼吸主要出现在下列各项中哪一项

- A. 脑炎
- B. 脑膜炎
- C. 脑干损伤
- D. 颅内压增高
- E. 代谢性酸中毒

【答案】E

【解析】代谢性酸中毒患者呼吸深大而规则，可伴有鼾声，称 Kussmaul 呼吸。见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

8. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 气胸
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 大块肺不张
- D. 气管肿瘤
- E. 支气管哮喘

【答案】D

【解析】吸气性呼吸困难：主要特点为吸气显著费力，严重者吸气时可见“三凹征”，表现为胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，此时亦可伴有干咳及高调吸气性喉鸣。常见于喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞。气管肿瘤可造成气管或大支气管的狭窄与阻塞。故选项 D 正确。呼气性呼吸困难：主要特点为呼气费力、呼气缓慢、呼吸时间明显延长，常伴有呼气期哮鸣音。主要是由于肺泡弹性减弱和（或）小支气管的痉挛或炎症所致。常见于慢性支气管炎（喘息型）、慢性阻塞性肺气肿、支气管哮喘、弥漫性泛细支气管炎等，因此排除选项 B、E。混合性呼吸困难：吸气与呼气均感费力，呼吸频率浅而快。见于重症肺炎、重症肺结核、大面积肺不张、大块肺梗死、大量胸腔积液和气胸等。因此排除选项 A、C。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

9. 大量胸腔积液的呼吸表现是

- A. 吸气困难
- B. 呼气困难
- C. 呼气吸气均费力
- D. 呼吸深快
- E. 呼吸深慢

【答案】C

【解析】大量胸腔积液的吸气与呼气均感费力，呼吸频率浅而快。

涉及考点 | 呼吸困难的临床表现

10. 小儿突发性气道阻塞的原因是

- A. 支气管肿瘤
- B. 气管异物
- C. 喉癌
- D. 气胸
- E. 慢性阻塞性肺炎

【答案】B

【解析】突发性呼吸困难可见于气管异物和气胸，而小儿突发性气道阻塞的病因多为气管异物。选项 D 多因肺部疾病或外力影响使肺组织和脏层胸膜破裂，或靠近肺表面的细微气肿泡破裂，肺和支气管内空气逸入胸膜腔引起。气管肿瘤无论良性、恶性，症状产生的主要原因是管腔受阻、通气障碍，在气管管腔被阻塞 1/2~2/3 时，才出现严重的通气障碍。但不是突然发生的，

因此排除选项 A。选项 C 表现为吸气性呼吸困难,但不是突然发生的,因此排除选项 C。气胸表现为吸气与呼气均感费力,呼吸频率浅而快。选项 E 不是突然发生的,因此排除选项 E。

涉及考点 | 气道阻塞的病因

11. 下列疾病,多表现为下垂性水肿的是

- | | |
|------------|-----------|
| A.肝硬化 | B.肾小球肾炎 |
| C.右心衰竭 | D.血管神经性水肿 |
| E.甲状腺功能减退症 | |

【答案】C

【解析】心源性水肿特点是下垂性水肿,心源性水肿见于右心衰竭、慢性缩窄性心肌炎等。选项 A 腹水为最常见表现。选项 B 多见眼睑及颜面先水肿。选项 D 为局部性水肿。选项 E 为黏液性水肿。

涉及考点 | 水肿的临床表现

12. 下列各项,对急性胰腺炎有诊断价值的是

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A.血清淀粉酶>800 U/L | B.血清淀粉酶<800 U/L |
| C.血清淀粉酶>5 000 U/L | D.血清淀粉酶>3 000 U/L |
| E.血清淀粉酶>1 800 U/L | |

【答案】C

【解析】急性胰腺炎大多数患者于发病后 6~12 h 血清淀粉酶开始升高,12~24 h 达高峰,3~5 天后恢复正常,达 3 500 U/L 应怀疑此病,超过 5 000 U/L 即有诊断价值。

涉及考点 | 血、尿淀粉酶测定

13. 引起上消化道出血最常见的原因是

- | | |
|------------|--------|
| A.肝硬化 | B.胃癌 |
| C.血小板减少性紫癜 | D.胆道感染 |
| E.消化性溃疡 | |

【答案】E

【解析】选项 A 是引起上消化道出血的常见病因,但不是最常见原因。选项 B 可引起上消化道出血,但不是最常见原因。选项 C 可引起上消化道出血,但不是最常见原因。选项 D 可引起胆道出血。引起上消化道出血的疾病,临床上前三位病因分别为:消化性溃疡、食管与胃底静脉曲张破裂、急性胃黏膜病变。

涉及考点 | 呕血与黑便的病因

14. 出血量达何值以上可出现黑便

- | | |
|---------|---------|
| A.5 mL | B.10 mL |
| C.20 mL | D.40 mL |
| E.60 mL | |

【答案】E

【解析】出血量达 5 mL 以上出现大便隐血试验阳性,达 50~60 mL 以上出现黑便。

涉及考点 | 呕血与黑便的问诊要点

15. 正常人血中胆红素主要来自

- | | |
|--------------|------------------|
| A.骨髓内血红蛋白分解 | B.骨髓内红细胞成熟前血红素分解 |
| C.骨髓内新生红细胞分解 | D.由肝、肾内铁卟啉蛋白产生 |

E.周围血中红细胞被破裂

【答案】E

【解析】血中的胆红素来源是血红蛋白。正常的情况下,衰老的红细胞是被单核巨噬细胞破坏,释放出来的血红蛋白就分解为胆红素、铁还原珠蛋白。

涉及考点 | 胆红素代谢检查

2年 易错考题

1.可引起全身性水肿的疾病是

- A.静脉炎
B.丝虫病
C.甲状腺功能减退症
D.淋巴管炎
E.肿瘤压迫

【答案】C

【解析】全身性水肿:①心源性水肿,见于右心衰竭、慢性缩窄性心包炎等。②肾源性水肿,多由各种肾炎、肾病综合征等引起。③肝源性水肿,见于肝硬化、重症肝炎等;④营养不良性水肿,见于低蛋白血症和维生素A缺乏;⑤内分泌源性水肿,见于甲状腺功能减退症、垂体前叶功能减退症等黏液性水肿。A、B、D、E均可见局限性水肿。

涉及考点 | 水肿的病因

2.患者,男性,35岁。40分钟前因情绪激动突发胸骨后闷痛,疼痛可向左臂放射,舌下含服硝酸甘油未见缓解。心电图检查存在室性心律失常。既往有冠心病病史。首先考虑

- A.心绞痛
B.心肌梗死
C.急性心功能不全
D.干性胸膜炎
E.肺梗死

【答案】B

【解析】本题考查的重点在于心绞痛及心肌梗死的鉴别,心绞痛与心肌梗死疼痛区域均位于胸骨后及心前区,均可由于情绪激动诱发,都能表现出疼痛放射。但心绞痛症状轻、时间短(3~5 min)、含服硝酸甘油有效;心肌梗死症状重,时间长(>30 min),硝酸甘油无效。而选项C、D、E其发作与情绪无明显关联,且症状均不相符。

涉及考点 | 心绞痛及心肌梗死

3.下列不表现出瞳孔扩大的是

- A.阿托品中毒
B.酒精中毒
C.氯丙嗪中毒
D.濒死状态
E.青光眼

【答案】C

【解析】病理情况下,瞳孔缩小(<2 mm)常见于虹膜炎、有机磷农药中毒、毒蕈中毒,以及吗啡、氯丙嗪、毛果芸香碱等药物影响;瞳孔扩大(>5 mm)见于外伤、青光眼绝对期、视神经萎缩、完全失明、濒死状态、颈交感神经刺激和阿托品、可卡因等药物影响。

涉及考点 | 瞳孔的变化情况

4.下列各项,可出现脉压减小的是

- A.主动脉瓣关闭不全
B.甲状腺功能亢进症

- C.动脉导管未闭
E.严重贫血
- D.缩窄性心包炎

【答案】D

【解析】脉压 <30 mmHg 称为脉压减小,见于主动脉瓣狭窄、心力衰竭、休克、心包积液、缩窄性心包炎等。A、B、C、E 均见于脉压增大。

涉及考点 | 血压变异的临床意义

5.下列各项,出现开瓣音的是

- A.二尖瓣脱垂
C.主动脉瓣狭窄
E.主动脉瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
D.二尖瓣关闭不全

【答案】B

【解析】开瓣音(二尖瓣开放拍击音)见于二尖瓣狭窄而瓣膜弹性尚好时,是二尖瓣分离术适应证的重要参考条件,故开瓣音为二尖瓣狭窄病变时出现的病理性杂音,所以本题选 B。

涉及考点 | 心音听诊

6.主动脉瓣关闭不全的杂音是

- A.舒张期隆隆样杂音
C.收缩期吹风样杂音
E.连续性机器样杂音
- B.舒张期叹气样杂音
D.乐音样杂音

【答案】B

【解析】选项 A 可见于二尖瓣狭窄。选项 B 可见于主动脉瓣关闭不全。选项 C 可见于二尖瓣关闭不全。选项 D 可见于感染性心内膜炎及梅毒性主动脉瓣关闭不全。选项 E 可见于先天性心脏病动脉导管未闭。

涉及考点 | 心脏杂音的特征

7.库瓦西耶征阳性可见于

- A.胰头癌
C.急性肠炎
E.急性胆囊炎
- B.急性阑尾炎
D.腹膜炎

【答案】A

【解析】胰头癌压迫胆总管导致阻塞,出现黄疸进行性加深,胆囊显著肿大,但无压痛,称为库瓦西耶征阳性。

涉及考点 | 腹内脏器触诊

8.肌力分几级

- A.7 级
C.5 级
E.3 级
- B.6 级
D.4 级

【答案】B

【解析】肌力分为 6 级,其中 0 级为全瘫,1~4 级为不完全瘫痪(轻瘫),5 级为正常肌力。

涉及考点 | 运动功能检查

9.糖尿病病人糖化血红蛋白的控制范围是

- A.10%~12%
B.8%~10%

C.5%~8%

D.4%~6%

E.2%~3%

【答案】D

【解析】血清糖化血红蛋白不受血糖浓度暂时波动的影响,是糖尿病诊断和监控的重要指标。其正常值为4%~6%。

涉及考点 | 糖类检查

10.尿沉渣镜检每高倍视野多少个白细胞即视为异常

A.>10个

B.>8个

C.>5个

D.>3个

E.>1个

【答案】C

【解析】尿沉渣镜检白细胞或脓细胞计数>5个/HP,称镜下脓尿多为泌尿系统感染,见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及肾结核等。

涉及考点 | 尿液显微镜检查

第十一章 内科学



高频考点必背

- 1.慢性阻塞性肺疾病(COPD)的最主要的病因是**吸烟**。
- 2.COPD 是我国导致**慢性肺心病及慢性呼吸衰竭**的最常见病因。
- 3.**感染因素**是 COPD 发病与病情发展的重要因素。
- 4.**气短及呼吸困难**为 COPD 的典型症状。
- 5.COPD 的体征为早期可无异常,随疾病进展出现一系列症状,如**桶状胸**,**呼吸变浅**、**频率增快**,**双肺语颤减弱**,叩诊呈**过清音**,心浊音界**缩小**等。
- 6.**慢性肺源性心脏病**是 COPD 的最终结局。
- 7.**不完全可逆的气流受限**是 COPD 诊断的必备条件,吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC < 70\%$ 最有助于诊断。
- 8.**细菌感染**是导致 COPD 急性加重最重要的原因,故选用敏感抗生素是极为重要的治疗措施。
- 9.**肺性脑病**是慢性肺心病首要死亡原因。
- 10.**控制感染**为治疗慢性肺心病的关键措施。
- 11.支气管哮喘的主要表现为**发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难**。
- 12.支气管哮喘痰液检查涂片镜检可见较多**嗜酸性粒细胞**。
- 13.左心衰竭临床表现为呼吸困难、发绀、咳嗽、**咳白色或粉红色泡沫痰**。
- 14.立即使患者**脱离变应原**的接触是防治哮喘最有效的方法。
- 15.**糖皮质激素**是控制哮喘最有效的药物。
- 16.**钙拮抗剂**可用于治疗运动性哮喘,**酮替芬**对过敏性哮喘有效,**曲尼司特**、**色甘酸钠**主要用于哮喘的预防。
- 17.肺炎链球菌肺炎初期为**刺激性干咳**,继而咳白色黏液痰或带血丝痰,经 1~2 天后,可咳出黏液血性或**铁锈色痰**。
- 18.痰直接涂片检查发现典型的**革兰氏染色阳性、带荚膜的双球菌**,即可初步作出肺炎链球菌肺炎病原学诊断。
- 19.肺炎链球菌肺炎早期仅见肺纹理增粗、紊乱。肺实变期呈肺叶、肺段分布的密度均匀阴影,并在实变阴影中可见支气管气道征,肋膈角可有少量胸腔积液征。**消散期**显示实变阴影密度逐渐减低,呈**散在的、大小不等的片状阴影**。
- 20.肺炎链球菌肺炎一经确诊即应予**抗生素治疗**,不必等待细菌培养结果。首选**青霉素**,对青霉素过敏者,可用红霉素或阿奇霉素、林可霉素等;重症患者可用氟喹诺酮类、头孢菌素类等。
- 21.**干咳**为肺炎支原体肺炎最突出的症状,咳嗽多为阵发性呛咳,咳少量黏液痰。
- 22.**吸烟**是原发性支气管肺癌最重要原因。
- 23.中央型肺癌生长在**段支气管以上位于肺门附近者**,约占肺癌的 3/4,以**鳞状上皮细胞癌和小细胞肺癌**较常见。
- 24.小细胞肺癌在原发性肺癌中恶性程度最高,较早发生**淋巴及血行转移**。
- 25.**胸部 X 线检查**是原发性肺癌常规检查方法。

26. **痰脱落细胞检查**是简单而有效的早期诊断方法,并能进行组织学检查。非小细胞肺癌的阳性率比小细胞肺癌者高,可高达 70%~80%。

27. **支气管镜检查**是确诊肺癌的重要检查方法。中央型肺癌确诊率可达 90%左右,周围型肺癌确诊率偏低。

28. **放射性核素扫描检查**可进行原发性支气管肺癌的定位、定性诊断。

29. **手术治疗**为非小细胞肺癌的主要治疗方法,主要适用于 I 期、II 期患者。**根治性手术切除**是首选的治疗措施,除 I 期患者,II~III 期的患者实施根治手术后需辅助化疗。

30. 小细胞肺癌对**化疗**最敏感,鳞癌次之,腺癌最差。

5年 历年真题

1. COPD 最主要的病因是

- A. 吸烟
- B. 职业粉尘
- C. 空气污染
- D. 感染
- E. 氧化应激

【答案】A

【解析】COPD 最常见的病因就是长期吸烟,因为吸烟可以导致支气管的痉挛、气管壁的损害,增加气道阻力,使肺功能下降导致肺气肿、慢阻肺的形成。

涉及考点 | 慢性阻塞性肺疾病的病因与发病机制

2. “沉默肺”指的是

- A. 轻度哮喘发作之哮鸣音
- B. 危重哮喘发作,哮鸣音消失
- C. 肺气肿呼吸音减弱
- D. 气胸患者呼吸音消失
- E. 肺炎患者呼吸音减弱

【答案】B

【解析】沉默肺:哮喘发作时典型的体征是双肺可闻及广泛的哮鸣音,呼气音延长。但非常严重的哮喘发作,由于气道阻塞,哮鸣音反而减弱,甚至完全消失,表现为“沉默肺”,是病情危重的表现。

涉及考点 | 哮喘的典型体征

3. 慢性肺源性心脏病最严重的并发症是下列哪一项

- A. 肺性脑病
- B. 心律失常
- C. 消化道出血
- D. 酸碱平衡失调
- E. 肾衰竭

【答案】A

【解析】肺性脑病是慢性肺源性心脏病的最严重并发症,也是本病最主要的死因。但本病最常见并发症为酸碱平衡失调。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的并发症

4. 患者,男,73 岁。患有肺心病 5 年,近日因受凉,咳、痰、喘加重,下肢浮肿,其关键性的治疗措施是

- A. 利尿
- B. 解痉
- C. 吸氧
- D. 使用洋地黄

E.控制呼吸道感染

【答案】E

【解析】控制感染为慢性肺心病急性加重期治疗的关键治疗措施。

涉及考点 | 慢性肺源性心脏病的治疗

5.哮喘急性发作首选的治疗用药是

A.福莫特罗

B.溴化异丙托品

C.糖皮质激素

D.氨茶碱

E.沙丁胺醇

【答案】E

【解析】β₂受体激动剂是缓解哮喘症状的首选药物。有短效-速效β₂受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林气雾剂,短效-迟效β₂受体激动剂如沙丁胺醇、特布他林片剂,长效-迟效β₂受体激动剂如沙美特罗气雾剂,长效-速效β₂受体激动剂如福莫特罗干粉吸入剂等。短效β₂受体激动剂可以迅速处理发作症状,缓解呼吸困难,长效β₂受体激动剂一般需联合激素一同应用,哮喘急性发作时起效较慢,故哮喘急性发作首选的治疗用药是沙丁胺醇、特布他林气雾剂。

涉及考点 | 支气管哮喘的治疗

6.大叶性肺炎患者的首选检查是

A.痰培养

B.胸部X线

C.血常规

D.肺功能检查

E.肺组织活检

【答案】B

【解析】各型肺炎的首选检查手段为胸部X线,其安全、方便、快捷的特点适合首选检查的需求。

涉及考点 | 大叶性肺炎的诊断

7.肺癌发病的最重要因素是下列哪一项

A.吸烟

B.电离辐射

C.室外空气污染

D.室内空气污染

E.长期接触石棉

【答案】A

【解析】吸烟是已被公认为肺癌的最重要危险因素。而职业、致癌因子、空气污染、电离辐射及饮食与营养因素虽和肺癌的发生有关系,但并不是最重要的因素。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的病因

8.肺癌由原发癌肿引起的症状是下列哪一项

A.胸痛

B.吞咽困难

C.厌食,肝区疼痛,黄疸

D.头痛,呕吐,共济失调

E.咳嗽,咯血,胸闷,气急

【答案】E

【解析】咳嗽是原发癌肿引起的肺癌最常见的早期症状,另外,咯血、喘鸣、胸闷、气急、体重下降、发热也是原发癌肿引起的主要症状。而胸痛、吞咽困难等是肿瘤局部扩展引起的症状;头痛、呕吐、厌食、肝区疼痛等是肝外转移引起的症状。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的临床表现

9. 对化疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A. 腺癌
- B. 类癌
- C. 小细胞肺癌
- D. 鳞状上皮癌
- E. 大细胞肺癌

【答案】C

【解析】小细胞肺癌对化疗最敏感，鳞癌次之，腺癌最差。化疗是治疗小细胞肺癌的主要方法。化学药物应根据癌肿细胞类型选择。如依托泊苷、替尼泊苷、卡铂及异环磷酰胺等对小细胞肺癌有较好的效果。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的治疗

10. 左心衰竭时，最早出现和最重要的症状是

- A. 乏力
- B. 咳痰
- C. 咯血
- D. 咳嗽
- E. 呼吸困难

【答案】E

【解析】左心衰竭以肺瘀血及心排量降低表现为主，其中呼吸困难是左心衰竭最早出现和最重要的症状。

涉及考点 | 慢性心力衰竭的临床表现

11. 支气管哮喘的主要特征为

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 哮喘持续状态
- C. 混合性呼吸困难
- D. 反复发作性的呼气性呼吸困难
- E. 非发作性的呼气性呼吸困难

【答案】D

【解析】主要表现为发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难，其发作常与吸入外源性变应原有关，大多呈季节性，春秋季节易发且日轻夜重。

涉及考点 | 支气管哮喘的诊断与鉴别诊断

12. 洋地黄中毒最重要的反应是

- A. 黄视
- B. 恶心
- C. 视力模糊
- D. 倦怠
- E. 心律失常

【答案】E

【解析】洋地黄中毒最重要的反应是各类心律失常及心力衰竭加重，其余包括胃肠道反应如恶心、呕吐，中枢神经的症状如视力模糊、黄视、倦怠等。

涉及考点 | 心力衰竭的治疗

13. 主动脉瓣狭窄的典型三联征表现是

- A. 呼吸困难-心绞痛-晕厥
- B. 心力衰竭-心绞痛-晕厥
- C. 呼吸困难-心律失常-晕厥
- D. 心力衰竭-心律失常-晕厥
- E. 心绞痛-心律失常-晕厥

【答案】A

【解析】主动脉瓣狭窄出现的症状较晚，轻度和中度主动脉瓣狭窄者可多年无症状，严重

者典型表现为呼吸困难-心绞痛-晕厥,称为主动脉瓣狭窄三联征,个别患者可能会发生猝死。

涉及考点 | 主动脉瓣狭窄的临床表现

14. 高血压伴糖尿病肾病,治疗应选用的药物是

- A. 利尿剂
- B. β 受体阻滞剂
- C. CCB
- D. ACEI
- E. ARB

【答案】D

【解析】抗高血压药 ACEI 作为血管扩张药,可降低外周阻力。它在血管紧张素转化酶参与的血管紧张素 I 转化为血管紧张素 II 过程起作用。目前 ACEI 主要用于各种类型高血压及各种程度的高血压,对伴有心力衰竭、左心室肥大、心肌梗死、糖耐量降低或糖尿病肾病蛋白尿等尤为适宜。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

15. 血管紧张素转换酶抑制剂的适应证是

- A. 轻、中度高血压
- B. 高血压伴心力衰竭
- C. 高血压合并心绞痛
- D. 老年高血压
- E. 糖尿病

【答案】B

【解析】血管紧张素转换酶抑制剂可改善胰岛素抵抗、逆转左心室肥厚,改善肾小球滤过率和肾脏血流量、减少蛋白尿,对肥胖、糖尿病和心、肾靶器官受损的高血压患者有较好的疗效,故特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死后、糖耐量异常或糖尿病肾病的高血压患者。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

2年 易错考题

1. 患者,男,25岁。发作性干咳3个月,伴有夜间胸闷,无发热、咯血,查体双肺未闻及干湿啰音。为明确诊断应首选的检查是

- A. 胃镜
- B. X线胸片
- C. 肺功能
- D. 心电图
- E. 心脏彩超

【答案】B

【解析】原发性肺癌常以阵发性刺激性干咳为首发症状,其预后取决于能否做到“三早”,即早发现,早诊断,早治疗。影像学、细胞学和病理学检查是诊断肺癌的重要方法。其中 X 线胸片为常规检查方法。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的实验室检查及其他检查

2. 患者,男,55岁。慢性支气管炎病史5年,近2~3个月咳嗽加重,痰中持续带血,伴胸闷、气急、胸线检查见肺门阴影增大。应首先考虑的是

- A. 肺炎
- B. 原发性支气管肺癌
- C. 肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 慢性支气管炎

【答案】B

【解析】该患者中老年男性,有慢性支气管炎病史,近期有咳嗽、痰中带血,并有胸闷、气急、胸痛等,X线见肺门阴影增大,考虑原发性支气管肺癌可能性大。选项A为肺纹理增粗、紊乱;选项C、D、E应有发热。

涉及考点 | 原发性支气管肺癌的诊断

3.患者,男,59岁。近1个月来,因上腹部不适,食欲减退,体重减轻而疑诊为胃癌。为确诊,首选的检查方法是

- A.癌胚抗原测定
- B.大便隐血试验
- C.X线钡餐检查
- D.胃液分析
- E.胃镜检查

【答案】E

【解析】胃癌不一定见癌胚抗原测定、胃液分析、大便隐血试验、X线钡餐异常,胃镜为诊断早期胃癌的特异性检查。

涉及考点 | 胃癌的实验室检查及其他检查

4.各类原因引起的休克的共同点是

- A.血压下降
- B.有效循环血量的急剧减少
- C.皮肤苍白
- D.四肢湿冷
- E.脉搏加速

【答案】B

【解析】休克是机体遭受强烈的致病因素侵袭后,由于有效循环血量锐减,组织和重要器官血液灌注不足,导致身体内细胞受损、代谢紊乱、器官功能障碍的一种病理状态。

涉及考点 | 休克的临床表现

5.我国肝硬化最主要的病因是

- A.病毒性肝炎
- B.营养不良
- C.慢性酒精中毒
- D.性心力衰竭
- E.慢性细菌性痢疾

【答案】A

【解析】肝硬化的病因:①病毒性肝炎,在我国最为常见,慢性乙型、慢性丙型肝炎均可发展成肝硬化,乙肝合并丙肝则可加速肝硬化的进程。②慢性酒精中毒,主要发生在欧美国家。③非酒精性脂肪性肝炎。④化学药物或毒物。⑤长期胆汁淤积。⑥遗传和代谢性疾病。⑦肝淤血,主要由慢性充血。⑧免疫紊乱。

涉及考点 | 肝硬化的病因病机

6.患者,男,60岁。高血压病史15年,突发剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐,失语。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg,神经反射正常。应首先考虑的是

- A.急进型高血压
- B.缓进型高血压
- C.高血压脑病
- D.高血压性脑出血
- E.高血压性心脏病

【答案】C

【解析】患者发病时血压力200/120 mmHg,结合发作时眩晕、失语的表现,可诊断为高血压脑病。肢体活动无障碍,神经反射正常,排除选项D;无心脏损伤的直接证据,排除选项E。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

7.患者,男,65岁。慢性支气管炎及高血压病史10年,近半年活动后自觉气短。检查:血压160/95 mmHg,心脏听诊未闻及器质性杂音,两肺听诊无异常,心电图及X线显示左心室增大,应首先考虑的是

- A.冠心病
B.高血压性心脏病
C.风心病
D.肺心病
E.病毒性心肌炎

【答案】B

【解析】患者有长期高血压病史,左心室增大,为长期后负荷增加所致。本患者亦有长期慢性支气管炎,但肺心病常导致右心室肥大、右心衰,排除D;A、C、E与本题关系不大。

涉及考点 | 原发性高血压的并发症

8.患者,男,50岁。高血压病史10年,今日剧烈头痛,眩晕,恶心,呕吐。查体:无肢体活动障碍,血压200/120 mmHg。为快速降压,应选择下列哪种药物治疗

- A.硝普钠
B.心得安
C.硝苯地平
D.降压灵
E.复方降压片

【答案】A

【解析】患者长期高血压病史,此次发病时血压200/120mmHg,结合发作时临床表现,可诊断为高血压危重症。此时为快速降压首选能直接扩张动静脉的硝普钠,降压迅速、效果显著。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

9.患者,男,60岁。高血压病史20年,近4个月常自觉乏力,时有颜面浮肿。查体:无肢体活动障碍,血压170/100 mmHg。尿常规示:蛋白尿(+),应选择下列哪种药物治疗

- A.卡托普利
B.硝苯地平
C.呋塞米
D.氢氯噻嗪
E.硝普钠

【答案】A

【解析】患者长期高血压病史,目前表现出了浮肿、乏力、蛋白尿的肾损伤迹象,其首选的降压药物应兼顾降压与保护肾功能,首选药物为ACEI或ARB。

涉及考点 | 原发性高血压的治疗

10.下列各项,不属于慢性肾炎基本的表现是

- A.蛋白尿
B.血尿
C.高血压
D.水肿
E.管型尿

【答案】E

【解析】慢性肾炎表现为血尿、蛋白尿、高血压、水肿、肾功能不全。具体情况如下:①血尿:以阶段性肉眼血尿,持续性镜下血尿为主要特点,相差镜检畸形红细胞比例较高。②蛋白尿:以球性蛋白尿为主,可见中大分子蛋白尿。重者表现为明显水肿,合并肾功能不全、感染等并发症,称为肾病综合征。③水肿:以面部水肿为主的肾炎性水肿,也可以下肢至全身的肾源性水肿为主。④肾性高血压。⑤肾功能不全:病程迁延,最终导致尿毒症。

涉及考点 | 慢性肾炎的临床表现

第十二章 传染病学

高频考点必背

1.在感染过程中出现的各种不同表现称为感染谱,有五种表现形式:**病原体被清除,隐性感染,显性感染,病原携带状态,潜伏性感染**。

2.**变态反应**,是机体对某些抗原初次应答后,再次接受相同抗原刺激时,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的**特异性免疫应答**。

3.**人群易感性增高的因素**:①新生儿增加、非流行区人口迁入、免疫人群减少等。②许多传染病(包括隐性感染)流行或人工免疫后经一段时间,其免疫力逐渐降低。③新的传染病出现或传入。

4.流行病学特征主要指传染病的**流行性、季节性、地方性和外来性**,还包括在不同人群(年龄、性别、职业等)中的分布特点。

5.发热是传染病的重要特征之一,具有鉴别诊断意义。常见热型有:**稽留热、弛张热、间歇热、回归热、波浪热和不规则热**等。

6.许多传染病在病程中有皮疹出现,称为发疹性传染病。皮疹的类型有**斑疹、丘疹、斑丘疹、出血疹、疱疹、脓疱疹、荨麻疹**等。

7.**麻疹**先见于耳后、面部,然后由躯干、四肢蔓延到手足心。**水痘**集中于躯干,呈向心性分布。**伤寒玫瑰疹**数量少,主要见于胸腹部。水痘、风疹多在病程的第1天出疹,猩红热于第2天,天花于第3天,麻疹于第4天,斑疹伤寒于第5天,伤寒于第6天出疹。

8.**白细胞总数正常或减少主要见于**:①部分革兰氏阴性杆菌感染,如布鲁菌病、结核病、伤寒与副伤寒。②多数病毒性感染性疾病,如流行性感冒、传染性非典型肺炎、高致病性禽流感病毒感染、登革热等。③原虫感染,如疟疾、黑热病等。

9.**病原体的直接检出或分离培养**是传染病病原学诊断的“金指标”。

10.《中华人民共和国传染病防治法》把传染病分为**甲类、乙类和丙类**,实行分类管理。甲类为强制管理传染病,包括**鼠疫和霍乱**,乙类为严格管理传染病,丙类属监测管理传染病。

11.**切断传播途径**通常是起主导作用的预防措施。

12.肝炎病毒是指侵入机体后主要感染肝脏并以引发肝脏炎性损害为主的病毒。目前已知的肝炎病毒有**甲、乙、丙、丁、戊**5型。

13.肝细胞是**HCV复制**的主要场所,但也可在外周血单个核细胞内复制及存储。

14.甲、戊型肝炎的传染源主要是急性期患者和亚临床感染者。病毒主要通过粪便排出体外,**发病前2周至发病后2~3周内**具有传染性,而以**发病前后各1周的传染性最强**。

15.乙、丙、丁型肝炎的传染源是**相应的急、慢性患者及病毒携带者**。

16.甲、戊型肝炎主要经**粪-口途径传播**。粪便中排出的病毒通过污染手、水、食物等经口感染。

17.急性肝炎见肝脏肿大,**肝细胞气球样变和嗜酸性变**,形成点状坏死,汇管区炎症细胞浸润,坏死区肝细胞增生,网状支架和胆小管结构正常。

18.淤胆型肝炎有轻度急性肝炎的组织学改变,伴以明显的肝内淤胆现象:毛细胆管及小

胆管内有胆栓形成,肝细胞浆内亦可见到**胆色素淤滞**。

19.急性重型肝炎肉眼见**肝脏体积明显缩小**,边缘锐薄,质地柔软,**包膜皱缩**。

20.**肝硬化的影像学表现**:B超检查可见肝脏缩小,肝表面明显凹凸不平,呈锯齿状或波浪状,肝边缘变钝,肝实质回声不均、增强,门静脉和脾静脉内径增宽,腹腔内可见液性暗区。

21.肝病时氨基转移酶测定实际上是反映肝细胞损伤情况,且较敏感,**ALT**为目前诊断肝炎最有价值的酶活力测定。

22.**抗-HD IgM 阳性是 HDV 现症感染的标志**,急性 HDV 感染者抗-HD IgM 一过性升高;慢性 HDV 感染者抗-HD IgM 升高多为持续性,并有高滴度的抗-HD IgG 阳性。

23.干扰素:目前常用的是**IFN**,具有抗病毒及免疫调节作用,包括普通干扰素和聚乙二醇干扰素。

24.**利巴韦林(病毒唑)**与**IFN**合用可明显增加丙型肝炎的疗效,但单用利巴韦林治疗无清除病毒的作用。

25.Peg-IFN 与利巴韦林联合应用是目前治疗**慢性丙型肝炎**的最佳方案。

26.流感病毒不耐热,**100 ℃1 分钟或 56 ℃30 分钟灭活**,对常用消毒剂及紫外线敏感,耐低温和干燥,真空干燥或-20 ℃以下仍可存活。

27.甲型流感常引起**暴发流行**,乙型流感呈**局部流行或散发**,亦可大流行,丙型以**散发**为主。

28.流感在流行病学上最显著的特点为:**突然暴发,迅速蔓延,波及面广,具有一定的季节性**,一般流行 6~8 周后会自然停止。

29.布鲁菌病又称波状热,是布鲁菌感染引起的自然疫源性疾病,临床上以**长期发热、多汗、乏力、肌肉和关节疼痛、肝、脾及淋巴结肿大**为主要特点。

30.抗流感病毒药物治疗:离子通道 M₂ 阻滞剂(**金刚烷胺和甲基金刚烷胺**),神经氨酸酶抑制剂(**奥司他韦**)。

5年 历年真题

1.隐性感染病例增加的临床主要意义是

- A.轻症病例增加
- B.免疫人群增加
- C.病原携带病例增加
- D.典型病例增加
- E.潜在感染病例增加

【答案】B

【解析】隐性感染病例增加的主要临床意义是在传染病流行期间,对防止流行的扩散有积极意义,因为隐性感染者增多,人群对某一种传染病的易感性就会降低,该种传染病的发病率下降,也就是增加了免疫人群。

涉及考点 | 降低人群易感性的因素

2.病原体侵入人体后,仅诱导机体产生特异性免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤,因而在临床上不显示任何症状、体征甚至生化改变,只能通过免疫检查才能发现。此种表现属于

- A.机会性感染
- B.隐性感染
- C.显性感染
- D.病原携带状态
- E.潜伏性感染

【答案】B

【解析】隐性感染又称亚临床感染,是指病原体侵入人体后,仅诱导机体产生特异性免疫应答,而不引起或只引起轻微的组织损伤,因而在临床上不显示任何症状、体征甚至生化改变,只能通过免疫检查才能发现。

涉及考点 | 传染源

3.下列有关感染的叙述,错误的是

- A.机体的免疫应答对感染过程的表现起重要作用
- B.感染过程要有病原体、人体和外环境
- C.病原体侵入人体,只要发病就是感染过程的开始
- D.感染是病原体对人体的一种寄生过程
- E.病原体的致病力包括毒力、侵袭力、病原体数量和变异性

【答案】C

【解析】病原体通过各种途径进入人体后就开始了感染的过程。

涉及考点 | 感染过程的表现

4.下列各项中,不属于传染病基本特征的是

- A.有发热
- B.有传染性
- C.有流行病学特征
- D.有病原体
- E.有感染后免疫性

【答案】A

【解析】传染病与其他疾病相区别的基本特征有病原体、有传染性、有流行病学特征和有感染后免疫是传染病与其他疾病相区别的基本特征。发热可以由感染性原因也可以由非感染性原因引起,并不是传染病的基本特征。

涉及考点 | 传染病的基本特征

5.病原携带者的特点是

- A.病原体侵入机体后发生了免疫反应但未引起明显的组织损伤
- B.病原体引起了明显的免疫反应和组织损伤
- C.病原体寄生在机体组织内,不引起组织损伤,但在机体免疫功能下降时可引起损伤,出现症状和体征
- D.机体无明显症状但病原体可长期存在并可排出体外
- E.病原体被特异性免疫反应清除

【答案】D

【解析】病原携带状态是指病原体侵入人体后,可以停留在入侵部位或侵入较远的脏器继续生长、繁殖,而人体不出现任何的疾病状态,但能携带并排出病原体,成为传染病流行的传染源。

涉及考点 | 传染源

6.大流行是指

- A.某传染病流行范围广,甚至超过国界或洲界
- B.某种传染病在某地区近几年发病率的一般水平
- C.某种传染病在某地区的发病率高于一般水平
- D.某种传染病病例的发病时间分布高度集中于一个短时间之内

E.某种传染病在某一地区的发病率明显增加

【答案】A

【解析】大流行是指某疾病的发病蔓延迅速,涉及地域广,人口比例大,在短时间内可以越过省界国界甚至洲界形成世界性流行。

涉及考点 | 传染病的流行病学特征

7.可经母婴途径传播的疾病是

A.乙型肝炎

B.流行性脑脊髓膜炎

C.霍乱

D.细菌性痢疾

E.伤寒

【答案】A

【解析】乙型肝炎的传播途径包括:①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺器具等传播。②母婴传播。③性接触传播。④其他,如日常生活密切接触传播。流行性脑脊髓膜炎经呼吸道传播,霍乱、细菌性痢疾、伤寒经消化道传播。

涉及考点 | 传播途径

8.下列属于乙类传染病的是

A.鼠疫

B.流行性腮腺炎

C.麻风病

D.布鲁菌病

E.霍乱

【答案】D

【解析】传染病分为甲、乙、丙三类传染病。乙类传染病共有 26 种,主要的是包括病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、艾滋病、淋病、梅毒、麻疹、百日咳、白喉、狂犬病、流行性出血热、猩红热、黑热病、登革热、脊髓灰质炎、流行性和地方性斑疹伤寒、流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、疟疾、钩端螺旋体病、伤寒和副伤寒、炭疽、布鲁菌病、人感染高致病性禽流感、人感染 H7N9 禽流感等。

涉及考点 | 传染病分类

9.丁型肝炎的潜伏期是

A.2~6 周

B.2~9 周

C.2~26 周

D.4~20 周

E.4~24 周

【答案】D

【解析】不同类型病毒引起的肝炎潜伏期不同,甲肝 2~6 周;乙肝 1~6 个月;丙肝 2 周~6 个月;丁肝 4~20 周;戊肝 2~9 周。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

10.黄疸伴胆囊增大不会见于

A.胆总管结石

B.胰头癌

C.胆囊结石

D.急性肝炎

E.壶腹癌

【答案】D

【解析】急性肝炎大多有轻中度肝大,质地软,常有触痛或叩击痛,脾可轻度肿大,部分有黄疸,没有胆囊增大。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

11. 皮肤结核菌素试验或 γ 干扰素释放试验阳性而无活动性结核的临床表现和影像学改变,可诊断为

- A. 肺外结核
- B. 原发性肺结核
- C. 潜伏性结核感染
- D. 结核性胸膜炎
- E. 气管、支气管结核

【答案】C

【解析】涂阴肺结核,即三次痰涂片阴性,同时需符合下列条件之一者:①胸部影像学检查显示与活动性肺结核相符的病变且伴有咳嗽、咳痰、咯血等肺结核可疑症状;②胸部影像学检查显示与活动性肺结核相符的病变且结核菌素试验强阳性或 γ 干扰素释放试验阳性;③胸部影像学检查显示与活动性肺结核相符,且肺外病灶的组织病理学检查提示为结核病变者;④三次痰涂片阴性的疑似肺结核病例经诊断性治疗或随访观察可排除其他肺部疾病者。

涉及考点 | 结核病的诊断

12. 下列不属急性重型肝炎典型表现的是

- A. 急性肾功能不全
- B. 出血倾向明显
- C. 黄疸迅速加深
- D. 肝大
- E. 出现烦躁、谵妄等神经系统症状

【答案】D

【解析】急性重型肝炎病情发展迅速,2周内出现极度乏力,严重消化道症状,出现神经、精神症状,表现为嗜睡、烦躁和谵妄等,排除E;黄疸急剧加深,胆酶分离,排除C;有出血倾向,排除B;出现急性肾衰竭,排除A;肝浊音界进行性缩小,所以本题选D。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

13. 下列各项不符合淤胆型肝炎临床表现的是

- A. 黄疸深
- B. 血清胆固醇升高
- C. 皮肤瘙痒
- D. 大便颜色变浅
- E. 自觉症状重

【答案】E

【解析】淤胆型肝炎主要表现为较长时期的肝内梗阻性黄疸,临床自觉症状轻微,常表现为皮肤瘙痒、粪便颜色变浅,肝功能检查血清胆红素明显升高,以直接胆红素为主。A、B、C、D等均符合淤胆型肝炎的临床表现。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

14. 提示病毒复制,传染性强,持续阳性,表明肝细胞损害较重,且可转为慢性乙型肝炎的指标是

- A. HBcAg
- B. 抗-HBs
- C. HBsAg
- D. HBeAg
- E. 抗-HBc

【答案】D

【解析】HBsAg表示体内是否存在乙肝病毒,无症状携带者和慢性患者体内可持续存在多年,甚至终身;抗-HBs阳性表示对HBV有免疫力,见于乙肝恢复期、既往感染及乙肝疫苗接种后;HBeAg表示患者处于高感染低应答期,说明病毒是否复制及具有传染性;HBcAg较少用于

临床常规检测;抗 HBc 提示急性期或慢性肝炎急性发作。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查

15. 下列各项,既是重型肝炎的诊断依据,也是判断其预后的敏感指标的是

- A. 天冬氨酸氨基转移酶
- B. 胆碱酯酶
- C. 凝血酶原活动度
- D. 血氨
- E. 丙氨酸氨基转移酶

【答案】C

【解析】凝血酶原活动度下降与肝损害严重程度密切相关。凝血酶原活动度 $\leq 40\%$ 是诊断重型肝炎或肝衰竭的重要依据,凝血酶原活动度数值越小出血倾向越严重,可据其判断预后。

涉及考点 | 病毒性肝炎的实验室检查及其他检查

2年 易错考题

1. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

【答案】C

【解析】指从病原体侵入机体至出现临床症状前的一段时间。各种传染病的潜伏期不同,数小时、数天、数月甚至数年不等。

涉及考点 | 潜伏期的概念

2. 肝炎患者发病 20 日出现精神症状及明显出血倾向,此时其诊断为

- A. 急性肝衰竭
- B. 亚急性肝衰竭
- C. 慢加急性肝衰竭
- D. 慢性肝衰竭
- E. 肝硬化

【答案】B

【解析】急性肝衰竭,又称暴发型肝炎,特征是起病急,发病 2 周内出现以 II 度以上肝性脑病为特征的肝衰竭综合征;亚急性肝衰竭起病较急,2~26 周出现肝衰竭表现;慢加急性肝衰竭是在慢性肝病基础上出现的急性或亚急性肝功能失代偿;慢性肝衰竭是在肝硬化基础上,肝功能进行性减退导致的以腹水或门脉高压、凝血功能障碍和肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿。故本题肝炎患者发病 20 日出现精神症状及明显出血倾向符合亚急性肝衰竭。

涉及考点 | 病毒性肝炎的临床表现

3. HIV 中要侵犯的靶细胞是

- A. CD38 细胞
- B. CD4 细胞
- C. CD8 细胞
- D. CD3 细胞
- E. CD27 细胞

【答案】B

【解析】HIV 主要侵犯人体免疫系统,包括 CD4 细胞、巨噬细胞和树突状细胞,主要表现为 CD4 淋巴细胞数量不断减少,导致免疫功能缺陷。

涉及考点 | 艾滋病的发病机制

4. 下列各项, 艾滋病早期诊断的临床表现中不包含
- | | |
|-------|---------|
| A. 腹泻 | B. 体重减轻 |
| C. 盗汗 | D. 便血 |
| E. 发热 | |

【答案】D

【解析】艾滋病临床表现以发热最为常见, 可伴盗汗、腹泻和体重减轻, 无便血。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

5. 艾滋病可出现持续全身淋巴结肿大的时期是
- | | |
|---------------|---------|
| A. 任何病期 | B. 艾滋病期 |
| C. 无症状感染期 | D. 恢复期 |
| E. 急性 HIV 感染期 | |

【答案】B

【解析】艾滋病期临床表现为持续 1 个月以上的发热、盗汗、腹泻、体重减轻 10% 以上, 部分患者表现精神症状, 还可出现持续性全身淋巴结肿大。

涉及考点 | 艾滋病的临床表现

6. 可经母婴途径传播的疾病是
- | | |
|----------|-------------|
| A. 伤寒 | B. 艾滋病 |
| C. 霍乱 | D. 流行性脑脊髓膜炎 |
| E. 细菌性痢疾 | |

【答案】B

【解析】细菌性痢疾主要通过“粪-口”传播, 传播途径包括: 接触传播、食物媒介传播、水媒传播、蝇媒传播; 流行性脑脊髓膜炎主要传播途径为病原菌借咳嗽、喷嚏、说话等飞沫直接从空气中传播; 霍乱、伤寒主要传播途径是通过水、食物、日常生活接触和苍蝇传播; 艾滋病传播方式主要有性传播, 血液传播, 母婴传播。

涉及考点 | 细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、霍乱、艾滋病、伤寒的传播途径

7. 乙型脑炎的主要传染源是
- | | |
|---------|------------|
| A. 蚊虫 | B. 乙脑病毒携带者 |
| C. 乙脑患者 | D. 猪 |
| E. 野鼠 | |

【答案】D

【解析】流行性乙型脑炎主要分布在亚洲远东和东南亚地区, 经蚊传播, 多见于夏秋季, 临床上急起发病, 有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等, 重型患者病后往往留有后遗症。猪是本病主要传染源, 蚊虫叮咬是主要传播途径。野鼠是流行性出血热的传染源。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的流行病学

8. 下列选项中, 中毒型菌痢区别于流行性乙型脑炎最主要的是
- | | |
|-----------------|------------------|
| A. 起病急 | B. 粪便镜检可见大量脓、白细胞 |
| C. 10 岁以下儿童发病率高 | D. 高热、抽搐、昏迷 |
| E. 多见于春、夏季 | |

【答案】B

【解析】乙脑与中毒型菌痢均多见于夏、秋季,且10岁以下儿童发病率较高。中毒型菌痢起病较乙脑更急,常于发病24h内出现高热、抽搐、昏迷等,一般无脑膜刺激征,脑脊液多正常,粪便镜检可见大量脓、白细胞,中毒型菌痢与流行性乙型脑炎最主要区别为粪便镜检可见大量脓、白细胞。

涉及考点 | 流行性乙型脑炎的鉴别诊断

9.流行性脑脊髓膜炎的病原菌是

- | | |
|----------|----------|
| A.抗酸杆菌 | B.革兰阴性杆菌 |
| C.革兰阴性弧菌 | D.革兰阳性球菌 |
| E.革兰阴性球菌 | |

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。病原学为脑膜炎双球菌,属奈瑟菌属,革兰染色阴性。临床表现为发热,头痛,呕吐,皮肤黏膜瘀点、瘀斑及颈项强直等脑膜刺激征。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的病原学

10.流行性脑脊髓膜炎常见的皮疹是

- | | |
|---------|----------|
| A.单纯疱疹 | B.玫瑰色斑丘疹 |
| C.坏疽 | D.脓疱疹 |
| E.瘀点、瘀斑 | |

【答案】E

【解析】流行性脑脊髓膜炎败血症期出现皮肤黏膜瘀点、瘀斑,初呈鲜红色,迅速增多,扩大。

涉及考点 | 流行性脑脊髓膜炎的临床表现

第十三章 医学伦理学



高频考点必背

1. 医学伦理学是研究**医学道德**的一门科学,是运用伦理学的理论、方法研究医学领域中人与人、人与社会、人与自然关系的道德问题的一门学科。
2. 医学伦理学的研究对象是医学领域中的**医学道德现象和医学道德关系**。
3. 医学模式反映人们对医学的总体认识,它是医学临床实践活动和医学科学研究的指导思想 and 理论框架,它**反映医学科学总的特征**。
4. 医务人员的情感有三个特点:医学职业**的特殊性、理智性、纯洁性**。
5. 医德良心的作用:医疗行为前的**选择**作用,医备标为中的**监督**作用,医疗行为的**评价**作用。
6. **诊治急症病人的道德要求**:随机性强,时间性强,协作性强;争分夺秒,全力抢救;及时与家属沟通,敢于承担风险;与相关科室医务人员密切配合。
7. **心理治疗的道德要求**:掌握和运用心理治疗的知识、技巧,给患者以心理支持;以健康、稳定的心理状态去影响和帮助患者;为患者的隐私保密。给患者以心理支持;给患者家属以安慰。
8. 对人体进行的基因检测和基因治疗,都必须遵守**知情同意**的原则。
9. 医学人道主义的核心内容是**尊重患者的生命;尊重患者的人格;尊重患者的权利**。
10. 医德品质的内容:**仁爱、严谨、诚挚、公正、奉献**。

5年 历年真题

1. 属于医德活动现象的是
- | | |
|---------|---------|
| A. 医德情感 | B. 医德意志 |
| C. 医德理论 | D. 医德修养 |
| E. 医德原则 | |

【答案】D

【解析】医德修养是医务人员在医德方面勤奋学习和涵养锻炼的功夫及进行过长期医疗实践和自我锻炼所达到的一种能力和思想品质。属于医德活动现象的一种。

涉及考点 | 医德道德修养

2. 下列属于现代医学目的的是
- | | |
|-------------|-----------|
| A. 重治疗轻预防 | B. 提高生命质量 |
| C. 过度追求技术发展 | D. 克服疾病 |
| E. 避免死亡 | |

【答案】B

【解析】现代医学目的是,致力于预防疾病,减少发病率,促进和维护健康;治疗疾病,解除由疾病引起的痛苦;照料患者,维护患者尊严,延长寿命,追求安详死亡;提高生命质量,优化生存环境,增进身心健康。

涉及考点 | 现代医学目的

3. 在使用辅助检查手段时, 不适宜的是
- A. 应从患者的利益出发决定该做的项目 B. 必要检查能尽早确定诊断和进行治疗
- C. 认真严格地掌握适应证 D. 有利于提高医生诊治疾病的能力
- E. 可以广泛积极地依赖各种辅助检查

【答案】E

【解析】医学辅助检查是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科, 主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。但所有的方法都有其适用范围, 并非是诊断所必需的主要的依赖条件, 对疾病的诊断还是需要结合疾病的特点。

涉及考点 | 辅助检查的道德要求

4. “我们诊治病人时就要有‘如临深渊, 如履薄冰’的态度, 一定要认真仔细, 避免误诊漏诊、延误病情。病人以性命相托, 我们怎能不诚惶诚恐”。他的临床思维和诊治模式是
- A. 为病家谋利益 B. 和病人在一起
- C. 平等对待病人 D. 不伤害病人
- E. 不为妇人施堕胎术

【答案】B

【解析】张孝骞被尊为“医圣”、“协和”泰斗、“湘雅”轩辕, 对患者极端负责, 以诊治疑难病症闻名内科学界。他将“戒、慎、恐、惧”作为自己的座右铭, 教导学生: “我们诊治病人就要有‘如临深渊, 如履薄冰’的态度, 一定要认真仔细, 避免误诊漏诊、延误病情。病人以性命相托, 我们怎能不诚惶诚恐?” 他的临床思维和诊治式是“和病人在一起”, 他说: “在患者面前, 我们永远是个小学生。”

涉及考点 | 中国现代医学家的道德境界

5. 下列各项, 不属于中国古代医德思想内容的是
- A. 不畏权贵、忠于医业的献身精神 B. 认真负责、一丝不苟的服务态度
- C. 仁爱救人、赤诚济世的事业准则 D. 救死扶伤、一视同仁的道德准则
- E. 清廉正直、不图钱财的道德品质

【答案】B

【解析】救死扶伤、一视同仁的道德准则, 仁爱救人、赤诚济世的事业准则, 清廉正直、不图钱财的道德品质, 不畏权贵、忠于医业的献身精神属中国古代医德思想内容。

涉及考点 | 中国医学道德的优良传统

6. 医生义务和权利中不包括
- A. 保证治疗效果 B. 保证患者平等的医疗权
- C. 保证患者医疗权的实现 D. 促进和维护患者身心健康
- E. 履行自己的义务

【答案】A

【解析】医生的权利有: 诊断的权利; 了解患者隐私的权利; 对患者进行各种检查的权利; 对患者进行医学治疗的权利; 死亡判定权; 参与医学司法活动的权利; 从事医学研究和参与医学学术交流的权利; 获得劳动报酬的权利。医生的义务有: 人道主义的义务; 告知义务; 为患者保密的义务; 健康教育的义务; 为患者提供其他医学资源的义务。所以不包括保证治疗效果。

涉及考点 | 医生的权利和义务的内容

7. 被尊称为“万婴之母”的中国近代医家是

- A. 林巧稚
- B. 岳美中
- C. 张孝骞
- D. 王绍棠
- E. 施今墨

【答案】A

【解析】林巧稚是著名妇产科专家，亲自接生了 50 000 多个婴儿，被尊称为“万婴之母”。

涉及考点 | 中国现代医学家的道德境界

8. “上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中可保身长全”体现的医疗活动的原则是

- A. 尊重原则
- B. 公益原则
- C. 审慎原则
- D. 公正原则
- E. 保密原则

【答案】D

【解析】《伤寒杂病论》指出：“上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中可保身长全。”公正原则是指以形式公正与内容公正的有机统一为依据分配和实现医疗和健康利益的伦理原则，即具有同样医疗需要以及同等社会贡献和条件的患者应得到同样的医疗待遇。医学道德原则包括行善原则、尊重原则、公正原则、无伤原则。公正原则主要体现在两个方面，即医疗卫生资源分配公正和医学人际交往公正。患者虽有千差万别，但人人享有平等的生命健康权和医疗保健权。

涉及考点 | 公正原则的含义、内容

9. 下列各项，不属于医患冲突原因的是

- A. 医疗事故
- B. 患者不愿支付医疗费用
- C. 医疗管理方面因素
- D. 医疗服务态度
- E. 无法满足患者需求

【答案】B

【解析】影响医患关系的主要因素：①管理、社会方面：医疗卫生管理制度不到位，国家财政对医疗卫生投入不足；医疗保险制度不健全；医疗损害赔偿诉讼实行“举证责任倒置”的负面影响；医药流通领域的问题，媒体宣传的主观性影响。②医生方面：医方自身的缺如，医院管理的缺陷；医务人员自身素质问题；“防御性医疗”的负面效应。③患者方面：患方自身的缺如，患者期望值过高与医疗实际不符；个别患者不履行义务；个别患者利用现有体制的纰漏及社会同情，夸大事实，毫无理由地索赔。

涉及考点 | 影响医患关系的主要因素

10. 医生参加专业培训，学习新知识、新技能，行使的权利是

- A. 医生的特殊干涉权
- B. 医生对自己的保护权
- C. 医生的健康教育权
- D. 医生接受继续教育权
- E. 医生的诊疗权

【答案】D

【解析】现代社会和科学技术的不断发展，要求医师及时更新知识，调整知识结构，不断提高道德修养和业务水平，属于医师的继续教育权。这是医师的权利，也是医师的义务。在注册的执业范围内，医师有权根据患者的情况进行必要的医学诊疗检查，选择恰当的医疗方案、预防措施、保健方法帮助患者恢复健康；有权依据病情、疫情的需要进行疾病确诊或流行病学调

查,采取预防措施和必要的医学处置;同时医师有权根据患者的需要和医疗结果出具相应的医学证明,属于医疗诊治权。这是医师从事执业活动享有的基本权利。

涉及考点 | 医生的权利内容

2年 易错考题

1.对无伤原则的解释,正确的是

- A.对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害
- B.无伤原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害
- C.无伤原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内
- D.因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害,所以无伤原则是做不到的
- E.无伤原则就是消除任何医疗伤害

【答案】C

【解析】无伤原则是指在医疗活动中,应该避免对患者的任何身心伤害。从严格意义上讲,无伤害是相对而言的,医疗过程也是一把双刃剑,几乎所有的诊疗措施或治疗手段都有两面性,都难以避免对患者的身心造成不同程度的损伤。这里所说的无伤是医务人员面对患者的治疗要时刻谨记的是考虑以最小的损伤为代价去获取最好的治疗效果。

涉及考点 | 无伤原则

第十四章 卫生法规



高频考点必背

1.《宪法》是国家的**根本大法**,是法律的母法。是国家最高权力机关——全国人民代表大会依照法定程序制定的具有最高法律效力的规范性文件,是各部门法的**立法依据和基准**。

2.现行的由全国人民代表大会常务委员会制定的**卫生非基本法律**有 10 部:《食品安全法》《药品管理法》《执业医师法》《国境卫生检疫法》《传染病防治法》《红十字会法》《母婴保健法》《献血法》《职业病防治法》和《人口与计划生育法》。

3.**预防为主**是我国卫生工作的基本方针和政策,也是卫生法必须遵循的**基本原则**。

4.患者自主原则是指患者经过深思熟虑就有关自己疾病的医疗问题作出合理的、理智的并负责的**自我决定权**。维护患者权利、尊重患者自主意识也是卫生法的**基本原则之一**。

5.卫生法中的法律责任可分为**卫生民事责任、卫生行政责任和卫生刑事责任**3 种。

6.卫生民事责任的特征,主要是**财产责任**。

7.卫生法所涉及的民事责任以“**赔偿损失**”为主要形式。

8.**行政处分**的种类主要有警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看、开除等形式。

9.根据我国《刑法》规定,**实现刑事责任的方式是刑罚**。刑罚包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。它们只能单独适用。附加刑有罚金、剥夺政治权利、没收财产。

10.具有高等学校医学专业**本科以上学历**,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满**一年**的,可以参加执业医师资格考试。

5年 历年真题

1.根据传染病发生、流行趋势的预测,及时发出传染病预警,根据情况予以公布的部门是

- A.国务院
- B.公安部
- C.医疗机构
- D.全国人大常委会
- E.国务院卫生行政部门

【答案】E

【解析】国家建立传染病预警制度。国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府根据传染病发生、流行趋势的预测,及时发出传染病预警,根据情况予以公布。县级以上地方人民政府应当制定传染病预防控制预案,报上一级人民政府备案。

涉及考点 | 国家建立传染病预防的相关制度

2.我国卫生法规中所涉及的民事责任的主要承担方式是

- A.恢复原状
- B.支付违约金
- C.停止侵害
- D.赔偿损失
- E.消除危险

【答案】D

【解析】卫生法规中民事责任是指医疗机构和卫生工作人员或从事与卫生事业有关的机构违反法律规定侵害公民的健康权时,应向受害人承担损失赔偿的责任。承担民事责任的方式有:①停止侵害;②排除妨碍;③消除危险;④返还财产;⑤恢复原状;⑥修理、重做、更换;⑦赔偿损失;⑧支付违约金;⑨消除影响、恢复名誉;⑩赔礼道歉。卫生法所涉及的民事责任以赔偿损失为主要形式。

涉及考点 | 卫生法规中民事责任的承担方式

3.不属于卫生法基本原则的是

- | | |
|----------------|------------|
| A. 兼顾经济与社会效益 | B. 卫生工作社会化 |
| C. 中医学与现代医学相结合 | D. 预防为主 |
| E. 保护公民身体健康 | |

【答案】C

【解析】卫生法的基本原则是卫生保护原则、预防为主原则、公平原则、保护社会健康原则、患者自主原则(此处大纲变化较大)。

涉及考点 | 卫生法的基本原则

4.受理申请医师注册的卫生行政部门除执业医师法第 15 条规定的情形外,应当自收到申请之日起多少日内准予注册,并发给由国务院卫生行政部门统一印制的医师执业证书

- | | |
|---------|---------|
| A. 45 日 | B. 20 日 |
| C. 15 日 | D. 40 日 |
| E. 30 日 | |

【答案】B

【解析】《医师法》第十三条规定,国家实行医师执业注册制度。取得医师资格的,可以向所在地县级以上地方人民政府卫生健康主管部门申请注册。医疗卫生机构可以为本机构中的申请人集体办理注册手续。除有本法规定不予注册的情形外,卫生健康主管部门应当自受理申请之日起二十个工作日内准予注册,将注册信息录入国家信息平台,并发给医师执业证书。未注册取得医师执业证书,不得从事医师执业活动。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

5.我国依法制定卫生行政法规的国家机构是

- | | |
|-----------|--------------|
| A. 最高人民法院 | B. 全国人大及其常委会 |
| C. 卫生行政部门 | D. 国务院 |
| E. 地方人民政府 | |

【答案】D

【解析】卫生行政法规是国务院发布的关于卫生行政管理方面的规范性文件,如《医疗机构管理条例》《中医药条例》《麻醉药品管理办法》《医疗纠纷预防和处理条例》等。

涉及考点 | 卫生法的渊源

6.某医科大学医学专业研究生 1999 年 7 月毕业后分配到三级医院从事临床工作,同年 12 月擅自另行开设诊所独立行医。依《中华人民共和国执业医师法》,其行为属于

- | | |
|-------------|----------------|
| A. 个体行医 | B. 未办理手续非法行医 |
| C. 执业助理医师行医 | D. 未取得医师资格非法行医 |
| E. 执业医师行医 | |

【答案】D

【解析】《执业医师法》第十二条规定,医师资格考试成绩合格,取得执业医师资格或者执业助理医师资格。医师资格考核的目的是检验、评价申请医师资格者是否具备从事医学实践所必需的基本专业知识与能力。经医师资格考试合格的人员即可依法取得相应的医师资格(执业医师资格或执业助理医师资格)。取得医师资格即具有法律规定的医师行业的准入资格,按照法律及有关规定,经注册取得医师执业证书等法定证件者,可从事医师工作。不具有医师资格的人员,不得以任何形式开展诊疗活动(即开展医师执业活动),否则即为非法行医。《执业医师法》第十九条规定,申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年,并按照国家有关规定办理审批手续,未经批准,不得行医。该医生在未取得医师资格的情况下,个体行医,属于非法行医。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

7.李某 2016 年于中医药大学毕业分配到市级中医院工作,并于 2017 年取得了中医师执业资格,《中华人民共和国执业医师法》施行当年,其依照有关开办医疗机构的规定申请个体开业。依据我国执业医师法的规定,卫生行政部门应

- A.要求其能保证个体行医质量,才能予以受理申请
- B.要求其应具备主治医师资格
- C.要求其经执业医师注册后在医疗机构中执业满 5 年
- D.批准其个体行医资格申请
- E.要求其参加国家临床中医专业技术资格考试

【答案】C

【解析】《中华人民共和国执业医师法(2009 修正)》第十九条规定,申请个体行医的执业医师,须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年,并按照国家有关规定办理审批手续;未经批准,不得行医。县级以上地方人民政府卫生行政部门对个体行医的医师,应当按照国务院卫生行政部门的规定,经常监督检查,凡发现有本法第十六条规定的情形的,应当及时注销注册,收回医师执业证书。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

- 8.某药业公司将其他药品冒充感冒药销售,该药属于
- A.特殊管理药品
 - B.失效药品
 - C.劣药
 - D.假药
 - E.非处方药

【答案】D

【解析】《中华人民共和国药品管理法》第四十八条规定,禁止生产(包括配制,下同)、销售假药。有下列情形之一的,为假药:①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的;②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的;③变质的药品;④药品所标明的适应证或者功能主治超出规定范围。《中华人民共和国药品管理法》第四十九条规定,禁止生产、销售劣药。有下列情形之一的药品,为劣药:①药品成分的含量不符合国家药品标准;②被污染的药品;③未标明或者更改有效期的药品;④未注明或者更改产品批号的药品;⑤超过有效期的药品;⑥擅自添加防腐剂、辅料的药品;⑦其他不符合药品标准的药品。

涉及考点 | 禁止生产、销售假药

- 9.医疗机构药剂人员调配处方的错误行为是

- A.对有配伍禁忌的处方,应当拒绝调配
- B.必要时,经处方医师更正或重新签字,方可调配
- C.处方必须经过核对,对处方所列药品不得擅自更改
- D.处方所列药品缺货时用同类药品代用
- E.对有超剂量的处方,应当拒绝调配

【答案】D

【解析】《药品管理法》第二十七条规定,医疗机构的药剂人员调配处方,必须经过核对,对处方所列药品不得擅自更改或者代用。对有配伍禁忌或者超剂量的处方,应当拒绝调配;必要时,经处方医师更正或者重新签字,方可调配。

涉及考点 | 药品必须符合法定要求

10.管理本行政区域医师工作的机构是

- A.各级医师协会
- B.各级政府
- C.县级以上人民政府劳动人事部门
- D.县级以上人民政府卫生行政部门
- E.县级以上人民政府工商行政部门

【答案】D

【解析】《执业医师法》第四条规定,国务院卫生行政部门主管全国的医师工作。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责管理本行政区域内的医师工作。

涉及考点 | 执业医师注册的条件及办理

2年 易错考题

1.下列各项,属于行政处罚的是

- A.降级
- B.赔礼道歉
- C.罚款
- D.赔偿损失
- E.撤职

【答案】C

【解析】行政处罚的种类:①警告。②罚款。③没收违法所得。④没收非法财物。⑤责令停产、停业整顿。⑥暂扣或者吊销执照。

涉及考点 | 卫生行政处罚的种类

2.依照《麻醉药品管理办法》的规定,麻醉药品的处方剂量,每张处方注射剂不得超过多少日的常用量

- A.14日
- B.7日
- C.5日
- D.3日
- E.2日

【答案】E

【解析】对麻醉药品的规定,①对普通患者:每张处方最大量注射剂不得超过2日常用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过3日常用量。②对领有麻醉药品专用卡患者:每张处方最大量注射剂不得超过3日用量,片剂、酞剂、糖浆剂等不得超过7日用量,控释缓释剂不得超过15日用量。

涉及考点 | 麻醉药品管理的相关规定