

## 口腔执业（含助理）医师资格考试 100 考题

1. 后堤区属于无牙颌功能分区的

A. 缓冲区

B. 舌侧翼缘区

C. 副承托区

D. 主承托区

E. 边缘封闭区

答案：E

2. 男，65 岁。舌癌行右侧颈淋巴清扫术，正确的创口处理是

A. 片状引流

B. 管状引流

C. 纱条引流

D. 闭式引流

E. 不放引流

答案：D

3. 新生儿唇腭裂的患病率大约在

A. 1:100

B. 1:1000

C. 1:5000

D. 1:10000

E. 1:100000

答案：B

4. 三角瓣成活后断蒂的时间为术后

A. 8-10 天

B. 14-21 天

C. 45-60 天

D. 28-35 天

E. 5-7 天

答案：B

5. 黏液性细胞的组织学特点

- A. 胞质内含嗜酸性颗粒
- B. 胞质内含角质颗粒
- C. 胞质内含嗜碱性颗粒
- D. 胞质透明呈网状结构
- E. 细胞内含酶原颗粒

答案：D

6. 关于固定桥基牙选择标准，错误的是

- A. 桥基牙（牙合）力比值的总和应等于或大于桥基牙及缺失牙（牙合）力比值的总和
- B. 基牙支持力不足时，增加的桥基牙应放在较弱的基牙侧
- C. 多根牙的根分叉高宽者较融合根的支持力强
- D. 牙根的横断面呈椭圆，扁圆或哑铃形的基牙支持作用较好
- E. 基牙牙周膜面积的总和等于或大于缺失牙牙周膜面积的总和

答案：A

7. 口腔医务人员使用的个人防护用品不包括

- A. 手套
- B. 工作服
- C. 面罩
- D. 口罩
- E. 鞋套

答案：E

8. 不做初期缝合的创口是

- A. 无菌创口
- B. 污染窗口
- C. 感染创口
- D. 切开拔牙创口
- E. 有组织缺损的无菌创口

答案：C

9. 与金瓷结合强度无关的是

- A. 基底冠厚度
- B. 预氧化处理基底
- C. 金、瓷的化学组成
- D. 金、瓷热膨胀系数
- E. 基底冠合金种类

答案：A

10. 最易导致呼吸困难的是

- A. 眶下间隙感染
- B. 咬肌间隙感染
- C. 下颌下间隙感染
- D. 颞下颌间隙感染
- E. 口底蜂窝织炎

答案：E

11. 复发性单纯疱疹性口炎与复发有关的有因不包括

- A. 局部机械损伤
- B. 过度疲劳
- C. 妇女月经期
- D. 微量元素缺乏
- E. 感冒

答案：D

12. 腮腺多行性腺瘤的临床表现不包括

- A. 不影响面神经功能
- B. 表面光滑呈结节状
- C. 常有消长史
- D. 常以耳垂为中心生长
- E. 肿瘤生长缓慢

答案：C



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

13. 铸造金属全冠颈部简台宽度不小于

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 1.5mm
- D. 2mm
- E. 2.5mm

答案：A

14. 男，25 岁与人斗殴时面部被刀砍伤，患者临床检查发现同侧额纹消失考虑可能受损的面神经分支为

- A. 颞支
- B. 颧支
- C. 颊支
- D. 下颌缘支
- E. 颈支

答案：A

15. 关于孕妇口腔治疗的描述，不正确的是

- A. 妊娠后期避免拔牙
- B. 妊娠前 3 个月仅限处理急症
- C. 妊娠后 3 个月应以保守治疗为主
- D. 妊娠前期避免复杂口腔治疗
- E. 妊娠 4-6 个月禁止拍 X 线片

答案：E

16. 拔上颌磨牙时牙根完整拔除，拔牙后发现口腔上颌窦瘘，穿孔小于 1mm 时

- A. 必须做瘘口修补术
- B. 使拔牙创面充满血块
- C. 冲洗拔牙创面
- D. 填塞明胶海绵
- E. 行上颌窦根治

答案：B

17. 临床上对乳牙近髓深龋的治疗最好采用

A. 直接盖髓

B. 间接盖髓

C. 冠髓切除术

D. 干髓术

E. 根管治疗

答案：B

18. 牙内陷最严重的情况是

A. 畸形舌侧窝

B. 牙中牙

C. 畸形根面沟

D. 畸形舌侧尖

E. 锥形牙

答案：B

19. 牙膏成分中起到降低表面张力作用的是

A. 摩擦剂

B. 胶粘剂

C. 防腐剂

D. 洁净剂

E. 润湿剂

答案：D

20. 在口腔健康调查中由于调查对象的代表性差，导致调查结果与实际情况不符，这属于

A. 随机误差

B. 无应答偏倚

C. 选择性偏倚

D. 检查者之间偏性

E. 检查者本身偏性

答案：C

21. 固定义齿修复时，一端基牙若有倾斜可设计

- A. 一端为活动连接
- B. 两端为活动连接
- C. 两端为固定连接
- D. 增加一端基牙数
- E. 增加两端基牙数

答案：A

22. 黏膜支持式可摘局部义齿和牙支持式可摘局部义齿的主要区别是

- A. 卡环的多少
- B. 有无间接固位体
- C. 有无（牙合）支托
- D. 缺牙的多少
- E. 寄托面积的大小

答案：C

23. 关于釉质的描述，错误的是

- A. 是人体中最硬的组织
- B. 无机物占釉质总重量的 96%~97%
- C. 有机物约占釉质总重量的 1%
- D. 大部分水是以游离水的形式存在
- E. 主要由钙、磷离子组成的羟基磷灰石晶体的形式存在

答案：D

24. 生长线、横纹均明显的早期釉质龋的病理改变位于

- A. 表层
- B. 透明层
- C. 暗层
- D. 脱钙层
- E. 病损体部

答案：E

25. 口腔黏膜上皮的生发层是指

- A. 基底层和颗粒层
- B. 基底层和棘层
- C. 颗粒层和棘层
- D. 颗粒层和角质层
- E. 角质层和基底层

答案：B

26. 能调节唾液的量及渗透压的结构是

- A. 浆液性腺泡
- B. 粘液性腺泡
- C. 闰管
- D. 分泌管
- E. 排泄管

答案：D

27. 下列为白斑的临床分型，除外

- A. 颗粒型
- B. 增殖型
- C. 均质型
- D. 溃疡型
- E. 疣状型

答案：B

28. 正中颌位时

- A. 上下牙达到最大面积接触
- B. 咀嚼肌处于最松弛状态
- C. 上下切牙间有1-4mm间隙
- D. 下颌骨处于被动的位置
- E. 只有前牙接触，后牙不接触

答案：A



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



29. 正常小开口运动时，运动的轴心在

- A. 髁突
- B. 下颌孔
- C. 喙突
- D. 下颌小舌
- E. 关节盘

答案：A

30. 应用鹰嘴钳拔下前牙时，术者应站在患者

- A. 右侧后方
- B. 右侧前方
- C. 左侧后方
- D. 左侧前方
- E. 正后方

答案：B

31. 下颌骨最不易发生骨折的部位是

- A. 下颌角
- B. 下颌体
- C. 髁状突颈
- D. 正中联合
- E. 颏孔区

答案：B

32. 舌杆位于下颌舌侧龈缘与舌系带或黏膜皱襞之间，距牙龈缘

- A. 1mm
- B. 2-3mm
- C. 3-4mm
- D. 5-6mm
- E. 7mm

答案：C

33. 可摘局部义齿卡环的数量一般为

- A. 2-4 个



B. 5-6 个

C. 7-8 个

D. 尽量少

E. 尽量多

答案：A

34. 干槽症发生在拔牙术后的几天

A. 马上

B. 1 天

C. 3 天

D. 5 天

E. 10 天

答案：C

35. 感染创口去除引流的时间一般是无脓液排出

A. 即刻去除

B. 12 小时后

C. 24 小时后

D. 36 小时后

E. 24-48 小时后

答案：E

36. 间隔抽样或机械抽样方法又称为

A. 单纯抽样

B. 系统抽样

C. 分层抽样

D. 整群抽样

E. 多阶段抽样

答案：B

37. 根据唇腭裂序列治疗的原则，进行腭形成术的年龄应在

A. 3-6 个月



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

B. 12-18 个月

C. 2-3 岁

D. 4-5 岁

E. 6-7 岁

答案：B

38. 进行窝沟封闭时乳牙酸蚀时间是

A. 20 秒

B. 30 秒

C. 40 秒

D. 50 秒

E. 60 秒

答案：E

39. 出生后，第一次做口腔检查的时间是

A. 3 个月，乳牙未萌出

B. 6 个月，第一颗乳牙萌出

C. 1 岁，下中、侧切牙萌出

D. 2 岁，多数乳牙已萌出

E. 2 岁半，乳牙全部萌出

答案：B

40. 婴儿创伤性溃疡最好发的部位是

A. 舌缘

B. 颊黏膜

C. 舌系带附近

D. 前庭沟黏膜

E. 舌背

答案：C

41. 颈囊的形成是由于以下哪个鳃弓生长速度快并与颈部组织融合形成的

A. 第一鳃弓

B. 第二鳃弓

C. 第三鳃弓

D. 第四鳃弓

E. 第五鳃弓

答案：B

42. 神经嵴可衍化为下列细胞，除了

A. 成釉细胞

B. 成牙本质细胞

C. 成牙骨质细胞

D. 牙髓细胞

E. 牙周膜成纤维细胞

答案：A

43. 口腔颌面部发育基本上在哪期发育完成

A. 受孕后 1 周

B. 受孕后 2 周

C. 受孕后 10 周

D. 受孕后 3~8 周

E. 受孕后 9 周

答案：D

44. 唇裂发生的原因是

A. 上颌突和下颌突未联合或部分联合

B. 中鼻突和侧鼻突未联合或部分联合

C. 上颌突和侧鼻突未联合或部分联合

D. 球状突和上颌突未联合或部分联合

E. 两侧侧腭突未融合或部分融合

答案：D

45. 上颌尖牙来源于哪个突起

A. 上颌突

B. 下颌突

C. 球状突

D. 中鼻突

E. 侧鼻突

答案：A

46. 形成牙釉质的细胞为

A. 外釉上皮细胞

B. 内釉上皮细胞

C. 星网状层细胞

D. 中间层细胞

E. 成牙本质细胞

答案：B

47. 牙发育过程中最先形成的硬组织是

A. 牙髓

B. 牙本质

C. 牙骨质

D. 牙槽骨

E. 牙釉质

答案：B

48. 形成牙周膜的结构是

A. 成釉器

B. 牙乳头

C. 牙囊

D. 牙板

E. 前庭板

答案：C

49. 关于牙齿的发生不正确的是

A. 成釉器形成釉质



- B. 牙乳头形成牙本质、牙骨质
- C. 牙囊形成牙周膜
- D. 牙乳头形成牙髓
- E. 牙囊形成固有牙槽骨

答案：B

50. 釉质基质形成时矿物质占有

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%
- E. 50%

答案：C

51. 因磨损、酸蚀或龋等较重的刺激，使成牙本质细胞突起变性、分解，小管内充满空气，形成

- A. 修复性牙本质
- B. 第三期牙本质
- C. 透明牙本质
- D. 反应性牙本质
- E. 死区

答案：E

52. 正常情况下，最易引起牙本质敏感症的釉质牙骨质界结构为

- A. 少量牙骨质覆盖在釉质表面
- B. 多量牙骨质覆盖在釉质表面
- C. 釉质与牙骨质端端相接
- D. 釉质与牙骨质分离
- E. 牙骨质全部覆盖在釉质表面

答案：D

53. 胶原纤维排列与牙本质小管平行的牙本质是

- A. 管周牙本质
- B. 管间牙本质

C. 前期牙本质

D. 球间牙本质

E. 罩牙本质

答案：E

54. 下列口腔黏膜中不属于被覆黏膜的是

A. 唇黏膜和颊黏膜

B. 硬腭黏膜和舌背黏膜

C. 口底黏膜和舌腹黏膜

D. 软腭黏膜和唇红黏膜

E. 牙槽黏膜和口底黏膜

答案：B

55. 下列腺体中属于纯浆液腺的是

A. 腮腺

B. 下颌下腺

C. 舌下腺

D. 唇腺

E. 磨牙后腺

答案：A

56. Kappa 值为 0.61~0.80 时可定为

A. 完全不可靠

B. 可靠度不合格

C. 可靠度中等

D. 可靠度优

E. 完全可靠

答案：D

57. 现况调查样本含量估计常用以下公式： $N = K^2 Q/P$ ，其中 K 值是根据研究项目的允许

误差大小而确定，当允许误差为 10% (0.1P) 时，K 为

A. 50

B. 100

C. 200

D. 400

E. 800

答案：D

58. 我国进行第二次全国口腔流行病学抽样调查属于

A. 横断面研究

B. 纵向研究

C. 常规资料分析

D. 病例对照研究

E. 群组研究

答案：A

59. 早期釉质龋病损区分层不包括

A. 表层

B. 透明层

C. 暗层

D. 脂肪变性层

E. 病损体层

答案：D

60. 年轻恒牙备洞时敏感的原因是

A. 牙髓疏松，纤维少

B. 硬组织薄，矿化度低

C. 牙本质小管粗大，周围钙化低

D. 磨耗少，点隙清楚

E. 牙根发育未完成

答案：C

61. 釉质龋中脱矿最严重的区域是

A. 透明层

B. 暗层

C. 病损体部



D. 表层

E. 脱矿层

答案：C

62. 急性牙髓炎的主要病理变化是

A. 淋巴细胞浸润

B. 浆细胞浸润

C. 肉芽组织形成

D. 巨噬细胞浸润

E. 中性粒细胞浸润

答案：E

63. 不用于防龋的蔗糖代用品是

A. 山梨醇

B. 木糖醇

C. 甜菊糖

D. 果糖

E. 甘露醇

答案：D

64. 中度张口受限是指切牙距

A. 小于 1cm

B. 大于 1cm, 小于 2cm

C. 大于 2cm, 小于 3cm

D. 大于 3cm, 小于 4cm

E. 大于 4cm

答案：B

65. 根尖肉芽肿内的上皮成分绝大多数来自

A. 异位的腺上皮

B. 口腔上皮

C. 缩余釉上皮

D. Malassez 上皮剩余

E. 牙板上皮

答案：D

66. 唇舌病变使用双合诊检查时，应该

A. 双手置于病变上下或两侧

B. 双手食指置于病变上下或两侧

C. 一手的食指和拇指置于病变上下或两侧

D. 一手的食指和中指置于病变上下或两侧

E. 一手的食指和另一手拇指置于病变上下或两侧

答案：C

67. 用于口内消毒的氯己定浓度是

A. 0.1%

B. 0.2%

C. 0.5%

D. 1.0%

E. 1.5%

答案：A

68. 口腔颌面部创伤活动性出血时，最可靠的止血方法是

A. 指压止血

B. 包扎止血

C. 填塞止血

D. 结扎止血

E. 药物止血

答案：D

69. 正常人每日唾液总量为 1000~1500ml，其中腮腺和下颌下腺的分泌量占

A. 75%

B. 80%

C. 85%

D. 90%

E. 95%

答案：D

70. 利多卡因一次最大用量为

- A. 10~50mg
- B. 80~100mg
- C. 300~400mg
- D. 800~1000mg
- E. 1500mg

答案：C

71. 布比卡因麻醉时间可达

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 4 小时
- D. 5 小时
- E. 6 小时

答案：E

72. 主要用扭转力拔除的牙是

- A. 上颌第三磨牙
- B. 下颌中切牙
- C. 上颌中切牙
- D. 上颌前磨牙
- E. 下颌前磨牙

答案：C

73. 颞下颌关节功能检查项目中不包括

- A. 关节活动度
- B. 下颌侧方运动
- C. 开口型
- D. 有无关节弹响
- E. 叩齿动作

答案：E

74. 义齿修复前, 对口腔软组织的处理措施中不包括

- A. 松软牙槽修整



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- B. 义齿性口炎治疗®
- C. 黏膜扁平苔癣治疗
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇系带修整

答案：D

75. 眶下间隙感染向颅内扩散，并发海绵窦血栓性静脉炎，其扩散途径通常是

- A. 面前静脉，颈内静脉
- B. 颞浅静脉，内眦静脉
- C. 面前静脉，颞浅静脉，颈内静脉
- D. 面前静脉，内眦静脉，眼静脉
- E. 眶内静脉，面前静脉

答案：D

76. 咬肌间隙感染如未及时切开引流，最常引起的并发症是

- A. 败血症
- B. 脓毒血症
- C. 下颌骨中央性骨髓炎
- D. 颈间隙感染
- E. 下颌骨边缘性骨髓炎

答案：E

77. 最可能含有静脉石的是

- A. 血管瘤
- B. 静脉畸形
- C. 微静脉畸形
- D. 动静脉畸形
- E. 混合型脉管畸形

答案：B

78. 属发育性囊肿的是

- A. 甲状舌管囊肿



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

B. 舌下腺囊肿

C. 唾液腺囊肿

D. 皮脂腺囊肿

E. 根端囊肿

答案：A

79. 舌癌最少发生于

A. 舌侧缘

B. 舌尖

C. 舌背

D. 舌腹

E. 舌根

答案：D

80. 以下不宜行组织活检术的恶性肿瘤为

A. 舌癌

B. 唇癌

C. 恶性淋巴瘤

D. 恶性黑色素瘤

E. 肉瘤

答案：D

81. 修复体粘固后患牙长时间持续疼痛，最可能

A. 已发展为牙髓炎

B. 存在牙龈炎或牙周炎

C. 已发展为根尖周炎

D. 牙本质过敏

E. 已有继发龋，但未发展为牙髓炎

答案：A

82. 不属于蔓状血管瘤临床表现的是

A. 体位移动试验阳性

- B. 表面皮温高
- C. 扪诊有震颤感
- D. 听诊有吹风样杂音
- E. 肿瘤高起呈念珠状

答案：A

83. 上前牙 3/4 冠邻沟的方向为

- A. 与唇面切 1/3 平行
- B. 与唇面切 2/3 平行
- C. 与唇面龈 2/3 平行
- D. 与舌隆突平行
- E. 与牙长轴平行

答案：B

84. 多形性腺瘤最常发生于

- A. 腮腺
- B. 下颌下腺
- C. 舌下腺
- D. 腭腺
- E. 唇腺

答案：A

85. 铸造全冠最常用的颈缘形态为

- A. 直角肩台型
- B. 斜面型
- C. 刃状型
- D. 凹面型
- E. 凹斜面

答案：D

86. 下列不属于口腔二级预防的是

- A. 口腔 X 线片辅助诊断



- B. 龋病的早期充填®
- C. 龋病的早期诊断
- D. 定期口腔检查
- E. 窝沟封闭

答案：E

87. 关于病例-对照研究特点不包括哪一项

- A. 观察时间短
- B. 需要研究的对象少
- C. 适合研究一些病程较长的慢性病和一些比较多见的疾病
- D. 尤其适合那些原因未明疾病的研究
- E. 准确性低，可靠性较差，回忆偏倚较大

答案：C

88. 儿童复发性腮腺炎最常见的发病年龄是

- A. 7 岁左右
- B. 5 岁左右
- C. 3 岁左右
- D. 2 岁左右
- E. 1 岁左右

答案：B

89. 急性化脓性腮腺炎的主要感染途径是经

- A. 腮腺导管逆行感染
- B. 口内破损黏膜
- C. 牙源性途径
- D. 血源性途径
- E. 淋巴途径

答案：A

90. 描述性口腔流行病学最常用的研究方法是

- A. 横断面调查



B. 纵向调查

C. 常规资料分析

D. 疾病监测

E. 群组研究

答案：A

91. 男孩，15 岁。因双侧颞下颌关节强直已行颞下颌关节假关节成形术，开始张口训练的  
时间应是术后

A. 1 天

B. 2~3 天

C. 7~10 天

D. 2 周

E. 1 个月

答案：C

92. 单侧颞下颌关节强直导致面部两侧不对称，具体表现为

A. 颈部偏向患侧，患侧下颌支正常，健侧面部丰满

B. 颈部偏向健侧，患侧下颌支正常，健侧面部丰满

C. 颈部偏向健侧，患侧下颌支正常，患侧面部丰满

D. 颈部偏向患侧，患侧下颌支短小，患侧面部丰满

E. 颈部偏向患侧，患侧下颌支短小，健侧面部丰满

答案：D

93. 口腔保健咨询时，对于第一恒磨牙窝沟封闭的适宜时间为

A. 6~7 岁

B. 6~9 岁

C. 7~8 岁

D. 7~9 岁

E. 8~9 岁

答案：A

94. 最常见的颞下颌关节脱位类型是

- A. 急性上方脱位
- B. 急性前方脱位
- C. 陈旧性侧方脱位
- D. 复发性后方脱位
- E. 陈旧性前方脱位



答案：B

95. 在深龋中，细菌可以通过暴露的牙本质小管感染牙髓，下列说法正确的是

- A. 牙本质厚度 $<2\text{mm}$ ，牙髓内可找到细菌
- B. 牙本质厚度 $<1\text{mm}$ ，牙髓内可找到细菌
- C. 牙本质厚度 $<0.5\text{mm}$ ，牙髓内可找到细菌
- D. 牙本质厚度 $<0.2\text{mm}$ ，牙髓内可找到细菌
- E. 牙本质厚度 $<1.5\text{mm}$ ，牙髓内可找到细菌

答案：D

96. 典型的三叉神经痛疼痛的性质是

- A. 持续性隐痛
- B. 阵发性剧痛
- C. 间歇性隐痛
- D. 持续性剧痛
- E. 持续性刀割样疼痛

答案：B

97. 确定面瘫病人是否有膝状神经节受损，应做

- A. 定分支检查
- B. 听觉检查
- C. 味觉检查
- D. 泪液检查
- E. 唾液检查

答案：D

98. 面瘫的贝尔征是指

- A. 用力紧闭眼睑，则眼球转向外上方
- B. 患侧口角下垂，健侧向上歪斜
- C. 不能鼓腮、吹气
- D. 脸裂过大，闭合不全
- E. 下结膜腔内常有泪液积滞

答案：A

99. 隐性唇裂是指

- A. 红唇完全裂开
- B. 红唇及白唇完全裂开，但鼻底未裂
- C. 红唇、白唇及鼻底完全裂开
- D. 红唇、白唇、鼻底、牙槽突及腭部全部裂开
- E. 红唇、白唇皮肤、黏膜虽完整，但肌肉层连接性中断

答案：E

100. 龋损形成的过程如下。除外

- A. 硬组织脱矿、崩解
- B. 色素沉着
- C. 牙釉质的再矿化
- D. 修复性牙本质形成
- E. 腐坏牙本质再矿化

答案：E

