

中药学综合知识与技能

一、最佳选择题、

- 1.某女 35 岁，因家庭纠纷，情志不畅导致肝气有郁结，影响脾胃运化功能，X 疾病传变是
A.相克
B.子病及母
C.相乘
D.母病及子
E.相侮急
- 2.脏腑经理功能减退血液生成不及，运行迟缓水液在体内滞留等病变，与气机功能失常密切相关的是
A.温煦作用
B.推动作用
C.防御作用
D.固摄作用
E. 气化作用
- 3.某女 35 岁。出现表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，可笑无常等症状，其临床意义是
A.失神
B.少神
C.假神
D.神乱
E.无神
- 4.八纲辨证中，寒热症候主要辩证的是
A.疾病部位
B.疾病原因
C.疾病性质
D.病势趋向
E.疾病传变
- 5.表热证用辛凉解表方药。里热证用清热泻火方药质量，体现的治法是
A.者热之
B.热者寒之
C.用热远热
D.寒因寒用
E.热因热用
- 6.某男，32 岁。近 3 天所在单位多人发热，患者 1 套天前突然发热，高热不退，周身酸痛，无汗，口干咽喉疼痛，舌质红，苔黄，脉浮数，应选用的中医治法是
A.辛凉解表
B.辛温解表
C.益气解表

- D.解表除湿
- E.清热解毒

21.某男，66岁。长期吸烟，喘促气短20年，加重10天。症见喘促气短，动则尤甚，呼多吸少，气不得续，形寒肢冷，面唇青紫；舌质淡苔薄，脉沉弱。其中医证候是

- A.风寒团肺
- B.风热犯肺
- C.肺脾气虚
- E.肝气郁结

22.某女，27岁。妊娠5个月，因上火导致咽喉肿病。身小便黄赤，便秘；舌红，苔薄黄，脉弦数。该患者应慎用的中成药是

- A.咽喉消炎丸
- B.牛黄上清丸
- C.华黄消炎片
- D.芩翘口服液
- E.蒲地蓝消炎口服液

23.某女，29岁。因全身浮肿就诊，经系统检查诊为肾病综合征，中医诊断为肾阳亏虚证水肿采用中西药综合治疗。结合病情，既符合中医辨证、又能增加西药利尿效果的方剂是

- A.六味地黄汤
- B.五苓散
- C.真武汤
- D.参苓白术散
- E.越婢加半夏汤

二、配伍选择题

[51~52]

- A.清炒品
- B.蜜炙品
- C.生品
- D.醋炙品

某女，28岁。皮肤出现红色风团，灼热剧痒，遇热加剧得冷则减，伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌红，苔薄白，脉浮数。中医诊断为瘾疹，证属风热犯表，治以消风散加减，开具的处方为：荆芥9g，防风9g，当归6g，地黄12g，苦参6g，蝉蜕6g，牛蒡子9g，知母10g，石膏（捣碎、先煎）30g

- 51.该处方中的牛蒡子，调配时应付
- 52.该处方中的知母，调配时应付

[53~54]

- A.升麻
- B.麦芽
- C.桃仁
- D.麻黄

E. 黄芪急

有无证候禁忌是处方审核的一项重要内容。医生为患有高血压、不寐、多汗的病人开具了包含上述中药的处方，执业药师在审核时应告知医生。

53. 体虚多汗者忌用

54. 高血压及失眠患者慎用

[63~65]

A. 蟾酥场

B. 白降丹

C. 生干金子

D. 雄黄

E. 生马钱子

毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。蒙因此执业药师在审核或调剂含有特殊管理毒性中药的处方时，掌握其用法用量非常重要。

63. 仅供外用的毒性中药是

64. 内服用量 0.05~0.1g，入丸散用的毒性中药是

65. 内服，用量 0.3~0.6 炮制后入丸散用的毒性中药是

[66-67]

A. 涂膜剂

B. 气雾剂

C. 贴膏剂

D. 凝胶剂

E. 流浸膏剂

中成药因剂型不同，采用的贮存养护方法也不同。

66. 除另有规定外，应避光。密闭贮存，并应防冻的中成药剂型是

67. 除另有规定外，应置遮光容器内密封和阴凉处贮存的中成药剂型是

[68~69]

A. 黏腻停滞

B. 阻遏气机

C. 收缩牵引

D. 凝结阻滞

E. 沉重移浊

68. 某男，36岁。胸闷脘痞，小便短涩，大便不爽，属于湿邪所致。其病因的性质是

69. 某女，55岁。全身关节肌肉疼痛较剧烈，阴雨天加重，属于寒邪所致。其病因性质是