

1. 患者，男，56岁，因感冒出现咳嗽的症状，自服芒果止咳片三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 维生素 C
- C. 吡罗昔美
- D. 盐酸氯苯那敏
- E. 右美沙芬

2. 与地西洋合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是

- A. 维生素 B₆
- B. 铝碳酸镁
- C. 伏立康唑
- D. 阿司匹林
- E. 利福平

3. 某患者胃痛到药店购买吗丁啉，药师应给予

- A. 西咪替丁
- B. 甲氧氯普胺
- C. 胃乐新颗粒
- D. 复方氢氧化铝片
- E. 多潘立酮片

4. 双歧三联活菌制剂说明书标明“冷处”贮存，其贮存条件是指

- A. 温度不超过 20°C
- B. 温度 10°C~30°C
- C. 温度不超过 20°C且避光
- D. 温度不超过-5°C且避光
- E. 温度在 2°C~10°C之间

5. 以下药物贮存过程中需注意避免震荡的是

- A. 胰岛素
- B. 硝苯地平
- C. 人促红素
- D. 双歧三联活菌制剂
- E. 阿托品

6. 因可使运动员情绪高涨、斗志昂扬并提高攻击力，因而被列为兴奋剂管理的药物是

- A. 甲睾酮
- B. 可卡因
- C. 可待因
- D. 人促红细胞生成素
- E. 麻黄碱

7. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h。已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是

- A. 7 滴
- B. 15 滴
- C. 25 滴
- D. 50 滴
- E. 60 滴

8. 下列属于一级信息源的是

- A. 药物信息手册
- B. 中药学文摘
- C. 药学杂志
- D. 中国药典
- E. 医学索引

9.急性胰腺炎伴脂代谢紊乱的患者不宜静脉滴注的药物是

- A. 胰岛素注射液
- B. 生长抑素注射液
- C. 葡萄糖注射液
- D. 乌司他丁注射液
- E. 脂肪乳注射液

10.增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

- A. 头孢哌酮
- B. 拉氧头孢
- C. 利巴韦林
- D. 加替沙星
- E. 尼美舒利

11.细菌性脑膜炎患者应用万古霉素治疗，快速大剂量静脉滴注后可能会产生

- A. “胰岛素样自体免疫综合征”
- B. “灰婴综合征”
- C. “药源性流感样综合征”
- D. “手足综合征”
- E. “红人综合征”

12.下列药物中，适宜在睡前服用的是

- A. 泼尼松
- B. 美洛昔康
- C. 多潘立酮
- D. 辛伐他汀
- E. 奥利司他

13.应在餐前服用的药物是

- A. 氨茶碱片
- B. 吡罗昔康片
- C. 呋塞米片
- D. 甲氧氯普胺
- E. 头孢呋辛酯片

14.会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应，用药期间不宜饮酒的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 阿奇霉素
- C. 阿司匹林
- D. 甲硝唑
- E. 伊曲康唑

15.在指导合理用药时，应交代服药后限制饮水的药物是

- A. 辛伐他汀
- B. 双磷酸盐
- C. 苯妥英钠
- D. 硫酸亚铁
- E. 硫糖铝

16.一般含服 5 分钟左右，用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的剂型是

- A. 咀嚼片
- B. 舌下片
- C. 含漱剂
- D. 阴道栓剂
- E. 鼻用喷雾剂

17. 根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》，体重指数（BMI）判断为肥胖的标准是

- A. $BMI \leq 18.5$
- B. $BMI \geq 28.0$
- C. $BMI \leq 21.5$
- D. $BMI \geq 24.0$
- E. $BMI \geq 25.0$

18.患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数（BMI）是

- A. 18.0
- B. 20.0
- C. 27.8
- D. 30.2
- E. 34.2

19.患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给予阿莫西林胶囊治疗。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A. 肯定
- B. 很可能
- C. 可能
- D. 可能无关
- E. 无法评价

20.下列药物使用方式，正确的是

- A. 酵母片在餐后整片用水送服
- B. 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水服用
- C. 氧氟沙星滴眼液打开使用后，继续使用 3 个月
- D. 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温水浸泡溶解后服用
- E. 红霉素软膏涂敷于眼睑内，每晚睡前一次

21.容易通过被动扩散透过胎盘屏障的药物特点是

- A. 分子量大、弱碱性
- B. 弱酸性、蛋白结合率低、半衰期长
- C. 脂溶性高、分子量小
- D. 蛋白结合率高、具有手性、分布容积大
- E. 蛋白结合率高、分子量大

22.下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

- A. 青霉素 G
- B. 头孢呋辛
- C. 华法林
- D. 地西泮
- E. 氨苄西林

23.患者，女，35岁，在怀孕的 6 个月情况下服用诺氟沙星胶囊。该用药行为对胎儿可能造成的影响是

- A. 骨骼发育异常
- B. 流产或发育成正常胚胎
- C. 牙齿色素沉着
- D. 腭裂
- E. 耳聋

24.美国食品药品监督管理局（FDA）根据药品对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，利巴韦林属于

- A. A 级
- B. D 级
- C. C 级
- D. B 级
- E. X 级

25. 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是

- A. 右美沙芬
- B. 阿昔洛韦
- C. 伪麻黄碱
- D. 布洛芬
- E. 氨溴索

26. 水痘患者在生化指标中常出现

- A. 血红蛋白减少
- B. 中性粒细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 血小板计数增多
- E. 淋巴细胞增多

27. 患者，男，58岁，患有高胆固醇血症，长期服用阿托伐他汀 40mg qd，患者用药期间应定期监测的生化指标是

- A. HB
- B. ALT
- C. RBC
- D. PLT
- E. BUN

28. 患者，男，56岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月内的血糖总体控制情况，应监测的指标是：

- A. 血红蛋白
- B. 糖化血红蛋白
- C. 空腹血糖
- D. 餐后2小时血糖
- E. 总胆固醇

29. 缓解视疲劳可选用的药物是

- A. 酞丁安滴眼液
- B. 色甘酸钠滴眼液
- C. 氧氟沙星滴眼液
- D. 羟甲基纤维素钠滴眼液
- E. 毛果芸香碱滴眼液

30. 患者，女，32岁，一周前曾有同事患有沙眼，后发现自己也出现眼红、眼痒等不适，来药店购药，药师可推荐的药物是

- A. 色甘酸钠滴眼液
- B. 玻璃酸钠滴眼液
- C. 酞丁安滴眼液
- D. 毛果芸香碱滴眼液
- E. 七叶洋地黄双苷滴眼液

31. 患者，男，57岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为H1N1甲型流感，该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A. 金刚烷胺
- B. 金刚乙胺
- C. 奥司他韦
- D. 利巴韦林
- E. 阿昔洛韦

32. 可使高血压患者血压升高的药物是

- A. 速感宁胶囊
- B. 银翘解毒片
- C. 复方酚咖伪麻胶囊
- D. 振源胶囊
- E. 复方丹参片

33. 患者，女，65岁，患有高血压，因感冒流鼻涕到药店买药。药师不应推荐其使用的药物是

- A. 复方酚咖伪麻胶囊
- B. 维 C 银翘片
- C. 速克感冒片
- D. 速感宁胶囊
- E. 对乙酰氨基酚片

34. 因摄食蛋白质引起的消化不良者宜服用的药物是

- A. 多潘立酮
- B. 莫沙必利
- C. 胃蛋白酶
- D. 干酵母片
- E. 胰酶

35. 对肠道菌群失调性腹泻宜选用的药物是

- A. 双八面体蒙脱石散
- B. 左氧氟沙星
- C. 胰酶片
- D. 乳酶生
- E. 双歧三联活菌制剂

36. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，宜选择的药物是

- A. 比沙可啶
- B. 乳果糖
- C. 硫酸镁
- D. 东莨菪碱
- E. 阿托品

37. 药品零售企业应该按照处方药进行管理的泻药是

- A. 甘油栓
- B. 比沙可啶片
- C. 乳果糖口服液
- D. 聚乙二醇 4000 散剂
- E. 酚酞片

38. 疗肠道蛔虫病可选用

- A. 双八面体蒙脱石
- B. 聚乙二醇 4000
- C. 阿苯达唑
- D. 莫沙必利
- E. 多潘立酮

39. 瘙痒明显，阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物，经验治疗首选的药物是

- A. 甲硝唑
- B. 硝酸咪康唑
- C. 头孢曲松钠
- D. 青霉素钠
- E. 曲古霉素

40. 治疗中度痤疮宜选用

- A. 阿昔洛韦软膏
- B. 维 A 酸乳膏
- C. 氢化可的松软膏
- D. 复方苯甲酸酊
- E. 炉甘石洗剂

41. 列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

- A. 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- B. I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C. 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染

- D. 烫伤患者的镇痛，镇静药物首选氯丙秦
- E. 失水较多的患者应多饮白开水或无盐饮料

42. 患者，男，48岁，患有青光眼3年。近日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，该患者应慎用的药物是

- A. 多索茶碱注射液
- B. 布地奈德混悬液
- C. 孟鲁司特钠咀嚼片
- D. 沙丁胺醇气雾剂
- E. 异丙托溴铵气雾剂

43. 合并慢阻肺的哮喘可选用的药物是

- A. 异丙托溴铵
- B. 沙丁胺醇
- C. 孟鲁司特
- D. 噻托溴铵
- E. 沙美特罗+布地奈德

44. 患者，男，40岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 乙胺丁醇
- D. 吡嗪酰胺
- E. 对氨基水杨酸

45. 患者，女，28岁，妊娠27周，头晕3天。入院查体：血压160/100mmHg，诊断为：妊娠高血压。患者出现先兆子痫，急救时应首选的药物是

- A. 硫酸镁注射液
- B. 甲氧氯普胺注射液
- C. 葡萄糖酸钙注射液
- D. 尼莫地平注射液
- E. 乌拉地尔注射液

46. 患者，男，70岁，典型的“面具脸”，“慌张步态”表现，临床诊断为帕金森病，患者同时患有前列腺增生，不宜选用的药物是

- A. 普拉克索
- B. 苯海索
- C. 卡比多巴
- D. 甲基多巴
- E. 金刚烷胺

47. 阿尔茨海默病患者应避免使用的药物是

- A. 美金刚
- B. 卡巴拉汀
- C. 颠茄
- D. 多奈哌齐
- E. 加兰他敏

48. 对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是

- A. 地西泮
- B. 雷美尔通
- C. 米氮平
- D. 艾司唑仑
- E. 司可巴比妥

49. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A. 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
- B. 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

- C. 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- D. 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- E. SSRIs 类抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用

50. 患者，女，48 岁，患有胃食管反流病，服用兰索拉唑治疗，近期诊断为高血压，血压 160/90mmHg。为避免加重食管反流症状，应避免使用的降压药是

- A. 吲达帕胺 B. 哌唑嗪
- C. 卡托普利 D. 氯沙坦
- E. 硝苯地平

51. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

- A. 粒细胞减少症 B. 消化性溃疡
- C. 慢性肾衰竭 D. 溶血性贫血
- E. 呼吸抑制

52. 下列关于口服阿仑磷酸钠使用注意事项的说法，错误的是

- A. 口服 30 分钟内应保持立位和座位
- B. 应避免同时使用两种双膦酸盐
- C. 随餐服用，并大量饮水，可增加吸收、可减少胃肠道刺激
- D. 食管炎为典型不良反应
- E. 已批准用于提早绝经女性骨质疏松的防治

53. 患者，男，65 岁，患有癫痫所致骨质疏松症，该患者应选用的药是

- A. 口服维生素 D B. 钙剂+维生素
- C. 钙剂+维生素 D+双膦酸钠 D. 钙剂+双膦酸钠
- E. 钙剂

54. 细菌性尿路感染，最常见的致病菌是

- A. 肠球菌 B. 铜绿假单胞菌
- C. 克雷伯杆菌 D. 大肠埃希菌
- E. 葡萄球菌

55. 男，62 岁，患有良性前列腺增生症，应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂治疗时可能导致的不良反应是

- A. 体位性低血压 B. 尿潴留
- C. 干咳 D. 乳腺增生
- E. 前列腺特异抗原（PSA）水平升高

56. 高血压伴前列腺增生患者适宜选用的药物是

- A. 硝苯地平 B. 卡托普利
- C. 氢氯噻嗪 D. 普萘洛尔
- E. 特拉唑嗪

57. 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是

- A. 心脏毒性
- B. 肝脏毒性
- C. 肾脏毒性
- D. 肺纤维化
- E. 过敏反应

58. 下列关于癌痛患者的镇痛药使用原则，错误的是

- A. 按患者疼痛程度分阶梯给药
- B. 按时给药，而不是按需给药
- C. 提倡无创的给药方式
- D. 用药须个体化
- E. 疼痛时用药，不疼痛时不用药

59. 围绝经期激素替代治疗应禁用的人群不包括

- A. 可疑患乳腺癌
- B. 严重肝肾功能障碍
- C. 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- D. 甲状腺切除术后的患者
- E. 可疑患性激素依赖性恶性肿瘤

60. 短效口服避孕药的主要组成成分是

- A. 孕激素+雄激素
- B. 雌激素
- C. 孕激素
- D. 雌激素+雄激素
- E. 雌激素+孕激素

[61-63]

- A. 阿托品+碘解磷定
- B. 氟马西尼
- C. 硫代硫酸钠
- D. 乙酰半胱氨酸
- E. 纳洛酮

61. 有机磷中毒的解救药物是

62. 地西洋中毒的解救药物是

63. 阿片类药物中毒的解救药物是

[64-66]

- A. 2-3 个半衰期给药 1 次
- B. 每日给药 1 次
- C. 每个半衰期给药 1 次
- D. 静脉滴注给药
- E. 每日给药 3 次

临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

64. 半衰期大于 24h 的药物，通常选择

65. 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物，通常选择

66. 半衰期 12h 的药物，通常选择

[67-69]

- A. 成本-效益分析
- B. 成本-效果分析
- C. 最小成本分析
- D. 成本-效用分析
- E. 荟萃分析

67. 将药物治疗成本和所产生的效益归化为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一

评价属于

68.以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于

69.以质量调整生命年或者质量调整预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于

[70-72]

- A. I 期临床试验
- B. II 期临床试验
- C. III 期临床试验
- D. IV 期临床试验
- E. 临床前试验

70.上市后药品临床再评价阶段是

71.观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

72.进一步验证治疗作用 and 安全性,评价利益风险关系,最终为新药获批提供充分依据的是

[73-75]

- A. 氯苯那敏
- B. 吲达帕胺
- C. 胰酶
- D. 阿司匹林
- E. 阿托品

73.服用后可致嗜睡,驾驶员应慎用的药物是

74.服用后可引起多尿,驾驶员应慎用的药物是

75.服用后可致视物模糊,驾驶员应慎用的药物是

[76-78]

- A. C 级
- B. D 级
- C. A 级
- D. X 级
- E. B 级

根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别

76.正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是

77.头孢曲松的妊娠毒性分级是

78.依那普利的妊娠毒性分级是

[79-80]

- A. 复方磺胺甲噁唑
- B. 头孢克洛
- C. 诺氟沙星
- D. 阿莫西林
- E. 华法林

79.可分泌到乳汁中,引起新生儿黄疸的药物是

80.可能影响儿童骨骼发育的药物是

[81-82]

- A. 呼吸抑制
- B. 消化性溃疡
- C. 肾脏疾病
- D. 溶血性贫血
- E. 红人综合症

81.服用顺铂,可引起的典型药源性疾病是

82.快速静脉滴注万古霉素,可引起的典型药源性疾病是

[83-85]

- A. 维 A 酸片 B. 左旋多巴片
C. 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 D. 非洛地平片
E. 去氨加压素片

83. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸，会影响其吸收、降低疗效的药物是

84. 与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是

85. 高脂饮食可促进其吸收的药物是

[86-87]

- A. 50%葡萄糖注射液 B. 复方氯化钠注射液
C. 0.9%氯化钠注射液 D. 低分子右旋糖酐注射液
E. 5%葡萄糖注射液

86. 配制青霉素输液的适宜溶媒是

87. 配制两性霉素 B 输液的适宜溶媒是

[88-90]

- A. 双眼 B. 左耳
C. 左眼 D. 右耳
E. 右眼

88. 处方中外文缩写 OD. 代表

89. 处方中外文缩写 OU. 代表

90. 处方中外文缩写 OS. 代表

[91-93]

- A. ih B. ac
C. Liq D. pc
E. qs

91. 处方缩写词中餐前为

92. 处方缩写词中适量为

93. 处方缩写词中液体为

[94-95]

- A. 西地碘含片 B. 替硝唑含漱液
C. 地塞米松粘贴片 D. 氯己定含漱液
E. 左旋咪唑片

94. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是

95. 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是

[96-97]

- A. 硫酸镁 B. 比沙可啶
C. 双歧杆菌 D. 干酵母
E. 乳果糖

96. 较强刺激性，服药时不可嚼碎的泻药是

97. 肝性脑病合并便秘患者首选的泻药是

[98-100]

- A. 维生素 AD
- B. 复合维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 E
- E. 维生素 K₁

98.用于治疗厌食、脚气合并糙皮病，服用后尿液可能呈黄色的药物是

99.孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药物是

100.可用于治疗夜盲症的药物是