

中医内外妇儿预测题 100 道

- 下列哪项不是时行感冒的特征
 - 传染性强
 - 证候相似
 - 集中发病
 - 老幼易感
 - 流行性强

- 哮喘缓解期表现为肺肾两虚证候者，宜选用的方剂是
 - 六君子汤
 - 补中益气汤
 - 玉屏风散
 - 金匱肾气丸
 - 生脉地黄汤合金水六君煎

- 患者症见眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。治疗应首选的方剂是
 - 三子养亲汤
 - 贝母瓜蒌散
 - 半夏白术天麻汤
 - 小陷胸汤
 - 黄连温胆汤

- 治疗心悸之瘀阻心脉证，应首选的方剂是
 - 黄连温胆汤合炙甘草汤
 - 半夏泻心汤合当归活血饮
 - 桃仁红花煎
 - 参附汤
 - 通窍活血汤

- 患者，女，28岁。近一周以来，不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。其证候是
 - 心胆气虚证
 - 心肾不交证
 - 心脾两虚证
 - 痰热扰心证
 - 肝火扰心证

- 痴呆的某本病机为
 - 阴精不足，气血亏虚
 - 髓海不足，神机失用
 - 脏腑亏虚，痰瘀内阻

- D. 以虚为本，虚实夹杂
- E. 气滞血瘀，痰浊内阻

7. 治疗腹痛之中脏虚寒证，应首选的方剂是

- A. 枳实导滞丸
- B. 吴茱萸汤
- C. 小建中汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 理中丸

8. 噎膈的病位在

- A. 胃
- B. 脾
- C. 肾
- D. 肝
- E. 食管

9. 泄泻的治疗大法是

- A. 健脾益气
- B. 消食导滞
- C. 运脾化湿
- D. 清热利湿
- E. 芳香化湿

10. 治疗呃逆之胃火上逆证的方剂是


- A. 麦门冬汤
- B. 一贯煎
- C. 增液汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 理中丸

11. 治疗寒湿痢，应首选的方剂是

- A. 平胃散
- B. 藿香正气散
- C. 不换金正气散
- D. 胃苓汤
- E. 香连丸

12. 水肿发病涉及的脏腑是

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 脾、肾、心
- E. 肾、心、肺



金英杰医学

JINGYINGJIE.COM

13. 治疗淋证之气淋，应首选的方剂是

- A. 小蓟饮子
- B. 程氏萆薢分清饮
- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 补中益气汤

14. 按照痰饮停积的部位分类、饮流胁下的是

- A. 痰饮
- B. 溢饮
- C. 悬饮
- D. 支饮
- E. 伏饮

15. 治疗“梅核气”应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 五磨饮子
- D. 半夏厚朴汤
- E. 甘麦大枣汤

16. 痰饮的治疗原则是下列哪一项

- A. 宣肺
- B. 健脾
- C. 温化
- D. 补肾
- E. 发汗

17. 治疗消渴之胃热炽盛证，应首选的方剂是

- A. 茜根散
- B. 消渴方
- C. 玉女煎
- D. 清中汤
- E. 七味白术散

18. 患者，女，65岁。咳喘多年，2天前外感后，症见喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，无汗，口渴，舌苔薄白，舌边红，脉浮数。治疗应选用的方剂是

- A. 苏子降气汤
- B. 桑白皮汤
- C. 麻黄汤合华盖散
- D. 麻杏石甘汤
- E. 定喘汤



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

19. 患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应选用的方剂是

- A. 银翘散
- B. 《千金》苇茎汤合如金解毒散
- C. 沙参清肺汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 加味桔梗汤

(20~21 题共用选项)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 复元活血汤
- C. 通窍活血汤
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 加味四物汤

20. 治疗胃痛之瘀血停胃证，首选的方剂是

21. 治疗头痛之血虚头痛证，首选的方剂是

(22~23 题共用备选答案)

- A. 肝、肾
- B. 肺、脾
- C. 肺、肾
- D. 脾、肾
- E. 肺、肝

22. 阳水的病位在

23. 阴水的病位在

(24~25 题共用选项)

- A. 痹痛游走不定，屈伸不利者为
- B. 关节疼痛，局部灼热红肿
- C. 肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛
- D. 关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增
- E. 关节红肿，疼痛剧烈，入夜尤甚，壮热烦渴

24. 行痹的主症是

25. 着痹的主症是

26. 下列属于外科特殊之毒的是

- A. 红丝疔
- B. 失荣
- C. 药毒
- D. 水火烫伤
- E. 冻伤



英杰医学
YINGJIE.COM

27. 下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是

- A. 有无麻木
- B. 有无脓液
- C. 有无出血
- D. 有无灼热
- E. 有无瘙痒

28. 脓液不多且位于组织深部时，应采用的方法是

- A. 推拿法
- B. 接触法
- C. 穿刺法
- D. 透光法
- E. 点压法

29. 烧伤面积的计算按中国九分法，双上肢面积占

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 36%
- E. 45%

30. 创面边缘整齐，坚硬削直而如凿成，基底高低不平，有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

- A. 压迫性溃疡
- B. 麻风性溃疡
- C. 疮痍性溃疡
- D. 梅毒性溃疡
- E. 岩性溃疡

31. 乳房部脓肿切开引流正确的切口选择是

- A. 乳晕旁弧形切口
- B. 乳晕处放射状切口
- C. 乳房下缘弧形切口
- D. 以乳头为中心弧形切口
- E. 以乳头为中心放射状切口

32. 蛇眼疔的成脓时间是

- A. 2~3 天
- B. 10 天左右
- C. 7~10 天
- D. 3~5 天
- E. 2 周



精英医学
YINGJIE.COM

33. 患者，女，50岁。乳房局部可见一肿块，皮色不变，质硬而边界不清，性情急躁，胸闷胁胀，苔薄，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 银花甘草汤
- B. 逍遥散合桃红四物汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 神效瓜蒌散合开郁散
- E. 二仙汤合开郁散

34. 下列各项中不属肉癭特点的是

- A. 如肉之团
- B. 发展缓慢
- C. 柔韧而圆
- D. 漫肿质软
- E. 结喉一侧或两侧结块

35. 患者肛门部有物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是

- A. 混合痔
- B. 内痔三期
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

36. 患儿，男，9岁。头皮部初起丘疮色红，灰白色鳞屑成斑，毛发干枯，容易折断，易于拔而不疼痛，已有年余，自觉痛痒。其诊断是

- A. 肥疮
- B. 牛皮癣
- C. 白秃疮
- D. 白疔
- E. 圆癣

37. 湿疮湿热蕴肤证，应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮
- B. 龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤
- C. 小儿化湿汤
- D. 当归饮子
- E. 四物消风饮

38. 患者，女，26岁。3天前突发生面、颈部红肿与水疱，自觉痒痛，伴恶寒兼发热，头痛，舌苔薄黄，脉滑数。怀疑接触过敏引起，治疗应首选

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 普济消毒饮
- D. 龙胆泻肝汤



金英杰医学
JINGYINGJIE.COM

E. 黄连解毒汤

39. 患者，男，27岁。颈项部皮肤增厚，瘙痒反复发作1年余，局部皮肤呈苔藓化。其诊断是

- A. 风热疮
- B. 风瘙痒
- C. 牛皮癣
- D. 白屑风
- E. 慢性湿疹

40. 尿道口有白色分泌物溢出，可诊断为

- A. 淋病
- B. 尿路感染
- C. 梅毒
- D. 阴道感染
- E. 尖锐湿疣

41. 下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机

- A. 湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- B. 风热毒邪搏于肌肤而生
- C. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
- D. 秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致

42. 治疗子痈气滞痰凝证的代表方剂是

- A. 小金丸
- B. 橘核丸
- C. 二陈汤
- D. 抵当丸
- E. 橘核汤

(43~44题共用选项)

- A. 缠腰火丹
- B. 抱头火丹
- C. 流火
- D. 赤游丹
- E. 内发丹毒

43. 发于躯干部的丹毒称为

44. 发于小腿部的丹毒称为

(45~46题共用选项)

- A. 阳和汤
- B. 桃红四物汤
- C. 顾步汤



金英杰医学

YINGJIE.COM

- D. 人参养荣汤
E. 附桂八味丸
45. 治疗脱疽寒湿阻络证，应首选的方剂是
46. 治疗脱疽热毒伤阴证，应首选的方剂是

(47~48 题共用选项)

- A. 程氏萆薢分清饮
B. 三金排石汤
C. 金铃子散合石韦散
D. 十全大补汤
E. 八正散或龙胆泻肝汤
47. 治疗尿石症之气血瘀滞证，应首选的方剂是
48. 治疗尿石症之湿热蕴结证，应首选的方剂是

(49~50 题共用选项)

- A. 五味消毒饮
B. 仙方活命饮
C. 黄连解毒汤
D. 犀角地黄汤
E. 清骨散
49. 疮疡内治，清气分热之常用方剂是
50. 疮疡内治，清血分热之常用方剂是

51. 李某，女，36岁，已婚，孕妇。末次月经的时间为2019年8月29日，其预产期时间为

- A. 2020年5月5日
B. 2020年5月6日
C. 2020年5月7日
D. 2020年6月5日
E. 2020年6月6日

52. 妇人产后几天红恶露可干净

- A. 1~2天
B. 3~4天
C. 4~5天
D. 5~6天
E. 6天

53. 与月经产生关系最密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾
B. 肾、肺、脾
C. 肾、肝、心
D. 肾、肝、脾
E. 心、肝、肺



英杰医学
YINGJIE.COM

54. 月经先后不定期，经行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，暖气少食，苔薄白，脉弦。应首选的方剂是

- A. 固阴煎
- B. 半夏泻心汤
- C. 逍遥丸
- D. 归脾汤
- E. 六味地黄丸

55. 月经先后无定期的主要发病机制是

- A. 肝郁气滞，疏泄失调
- B. 肾气不足，封藏失职
- C. 脾气虚弱，统摄无权
- D. 湿热下注，任带不固
- E. 气血失调，血海蓄溢失常

56. 治疗崩漏之实热证，应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 固本止崩汤
- C. 清热固经汤
- D. 清热调血汤
- E. 左归丸

57. 经行乳房胀痛肝肾亏虚证的治法是

- A. 舒肝养血，和胃通络
- B. 温肾养阴，和胃通络
- C. 疏肝理气，和胃通络
- D. 滋肾养肝，和胃通络
- E. 补肾健脾，和胃通络

58. 瘀滞胞宫不孕症的治疗应首选的方剂是

- A. 理冲汤
- B. 失笑散
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

59. 患者，女，29岁，已婚。月经过期半个月，尿妊娠试验(+)，左下腹隐痛，双合诊触及左侧附件可触及界限不清的包块，压痛(+)，反跳痛(+)，B超提示：宫腔未见妊娠囊，腹痛拒按，但逐渐减轻，兼有少量阴道流血，血压平稳，脉细缓。现阶段处理首选的方法是

- A. 寿胎丸
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 生脉散合宫外孕I号方
- D. 宫外孕I号方

E. 宫外孕 II 号方

60. 产后小便不通的基本病机是

- A. 气虚冲任不固
- B. 脾肺气虚，传导无力
- C. 膀胱气化不利
- D. 膀胱失约
- E. 脾肾阳虚，水湿不化

61. 产后缺乳，面色无华，气血虚弱，应首选的方剂是

- A. 通乳丹
- B. 下乳涌泉散
- C. 苍附导痰丸
- D. 漏芦散
- E. 补中益气汤

62. 产后三急是指

- A. 呕吐、泄泻、盗汗
- B. 高热、昏迷、自汗
- C. 心悸、气短、抽搐
- D. 尿闭、便难、冷汗
- E. 下血、腹痛、心悸

63. 患者，女，49 岁。月经或前或后，烘热出汗，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸乏力，舌红苔薄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 左归丸合二至丸
- B. 内补丸
- C. 肾气丸
- D. 两地汤合二至丸
- E. 二仙汤

64. 患者月经停闭半年，神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄，舌淡，苔薄，脉沉缓。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 归肾丸
- C. 参芪四物汤
- D. 人参养荣汤
- E. 大补元煎

65. 患者，女，45 岁。月经不规律 8 个月，现阴道出血 40 天，量时多时少，近 3 天量极多、色淡、质稀，伴气短神疲，面浮肢肿，舌淡苔薄白，脉缓弱。治疗应首选的方剂是

- A. 举元煎
- B. 补中益气汤
- C. 固本止崩汤



D. 清热固经汤

E. 保阴煎

66. 患者，女，36岁，已婚。经行肢体肿胀，按之随手而起，经色暗红有块，伴腕闷肋胀，善叹息，舌紫暗，苔薄白，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

A. 苓桂术甘汤

B. 参苓白术散

C. 八物汤

D. 肾气丸

E. 丹栀逍遥丸

67. 患者，女，31岁，已婚。曾孕3次，均自然流产，平日头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，现又妊娠33天，夜尿频多，面色晦暗，舌淡苔白，脉沉弱。治疗应首选的方剂是

A. 加味阿胶汤

B. 补肾安胎饮

C. 泰山磐石散

D. 补肾固冲丸

E. 以上均非

68. 患者，女，24岁，已婚。妊娠6个半月，面目四肢浮肿，皮薄光亮，按之没指，纳呆便溏，舌胖嫩苔黄腻，脉滑缓无力。治疗应首选的方剂是

A. 茯苓导水汤

B. 真武汤

C. 天仙藤散

D. 猪苓汤

E. 白术散

(69~70题共用选项)

A. 血热证

B. 脾肾虚弱证

C. 肾阳亏虚证

D. 气血虚弱证

E. 血瘀证

69. 胎动不安可用胎元饮治疗的证候是

70. 滑胎可用泰山磐石散治疗的证候是

(71~72题共用选项)

A. 激经

B. 暗经

C. 季经

D. 避年

E. 居经

71. 妇女终身不来潮而能受孕者，称为

72. 受孕初期仍按月经少量出血而无损胎儿者，称为

73. 下列月经病的治疗，错误的是

- A. 重在治本调经
- B. 分清先病和后病
- C. 急则治标，缓则治本
- D. 顺应不同年龄阶段论治
- E. 多用辛温暖宫之品

(74~75 题共用选项)

- A. 血瘀
- B. 风寒
- C. 肾虚
- D. 血虚
- E. 气虚

74. 产后肢体关节疼痛，屈伸不利，痛无定处。其证候是

75. 产后遍身关节酸楚，肢体麻木，头晕心悸。其证候是

76. 小儿的脏腑娇嫩，尤其突出的是

- A. 肝、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肺、肝、肾

77. 由于小儿为“纯阳之体”“稚阴之体”，临床容易表现出的证候是

- A. 瘀证
- B. 实证
- C. 寒证
- D. 虚证
- E. 热证

78. 小儿细动作的发育，正常会拇指、食指拾东西的年龄是

- A. 13~14 个月
- B. 7~个月
- C. 11~12 个月
- D. 5~6 个月
- E. 9~10 个月

79. 下列除哪项外，均属病理性胎黄

- A. 黄疸持续加深
- B. 黄疸 3 周后仍不消退
- C. 黄疸退而复现
- D. 生后 24 小时内出现

E. 黄疸 10~14 天消退

80. 小儿哮喘反复发作，主要是因为

- A. 肾阳亏虚
- B. 脾虚湿盛
- C. 肺气不足
- D. 感触外邪
- E. 宿痰伏肺

81. 患儿 10 天。啼哭不安，不欲吮乳，口舌满布白屑，唇舌俱红，小便短赤。治疗应首
选

- A. 导赤散
- B. 泻黄散
- C. 竹叶石膏汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 清热泻脾散

82. 疳积的主要病机是

- A. 脾胃失和，纳化失健
- B. 脾胃虚损，积滞内停
- C. 肝血不足，筋脉失养
- D. 脾胃虚衰，气血两败
- E. 肾阳虚衰，精髓不充

83. 小儿汗证营卫失调证的汗出特点是


- A. 汗出肤热，汗渍色黄
- B. 汗出遍身而不温
- C. 大汗淋漓，或汗出如油
- D. 头部、手足心汗出明显
- E. 头部、肩背部汗出明显

84. 注意力缺陷多动障碍好发于

- A. 学龄前期儿童
- B. 幼儿
- C. 学龄期儿童
- D. 新生儿
- E. 青少年

85. 可出现草莓舌的疾病是

- A. 丹痧
- B. 慢性萎缩性胃炎
- C. 贫血
- D. 维生素 A 缺乏
- E. 结核



英杰医学

YINGJIE.COM

86. 适宜用清热解毒，软坚散结法治疗的流行性腮腺炎的证候是

- A. 毒窜睾腹证
- B. 热毒壅盛证
- C. 邪陷厥阴证
- D. 邪陷心肝证
- E. 邪犯少阳证

87. 患儿，女，5岁。高热不退，喉核赤肿，溃烂化脓，吞咽困难，口干口臭，大便干结，小便短黄，舌红，苔黄，脉数。应首选的方剂是

- A. 牛蒡甘桔汤
- B. 荆防败毒散
- C. 普济消毒饮
- D. 养阴清肺汤
- E. 银翘马勃散

88. 患儿，女，5岁。心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，胸闷呕恶，面色晦暗，唇甲发绀，舌体胖，舌质紫暗，或舌边尖见有瘀点，舌苔腻，脉滑或结代。治疗应首选的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散
- D. 银翘散
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

89. 患儿，6岁。小便频数日久，淋漓不尽，尿液不清，畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，舌苔薄腻。治疗应首选的方剂是


- A. 菟丝子散
- B. 金匱肾气丸
- C. 缩泉丸
- D. 补中益气汤
- E. 八正散

90. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

- A. 热、咳、涕、泪，麻疹黏膜斑
- B. 热、烦、汗出，皮疹透发
- C. 疹没脱屑，低热不退
- D. 热、烦、渴、饮，疹稠色暗，神昏抽搐
- E. 热、咳、喘、痰，疹稠色暗

(91~92 题共用选项)

- A. 大定风珠
- B. 缓肝理脾汤
- C. 十全大补汤



- D. 银翘散
- E. 人参五味子汤

91. 治疗小儿慢惊风脾虚肝亢证，应首选的方剂是

92. 治疗小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证，应首选的方剂是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 养阴清热，补益肺肾
- B. 温卫和营，益气固表
- C. 补肺固表，健脾益气
- D. 温补肾阳，健脾益气
- E. 泻肺祛痰，补肾纳气

93. 小儿反复呼吸道感染脾肾两虚证的治法为

94. 小儿反复呼吸道感染肺脾气虚证的治法为

(95~96 题共用备选答案)

- A. 大便稀溏，色淡不臭，食后作泻
- B. 质稀如水，心烦不安，目眶及囟门凹陷
- C. 大便清稀，澄澈清冷，完谷不化
- D. 泻下急迫，量多次频，气味秽臭
- E. 大便清稀，夹有泡沫，肠鸣腹痛

95. 泄泻风寒泻的临床表现是

96. 泄泻脾虚泻的临床表现是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 脾、胃
- B. 脾、肾
- C. 心、脾
- D. 肝、脾
- E. 心、肝

97. 眼疳的病位是

98. 骨疳的病位是

99. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是

- A. 驱虫粉
- B. 化虫丸
- C. 追虫丸
- D. 使君子散
- E. 乌梅丸

100. 患儿，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 大补阴丸
- B. 化斑汤
- C. 归脾汤

- D. 连翘败毒散
- E. 犀角地黄汤

扫码关注公众号，获取更多资料和资讯



金英杰医学
JINYINGJIE.COM