

终极押题卷中西医助理第二单元

A1/A2 型选择题

0. 慢性支气管炎的体征，哪项叙述不正确()

- A. 早期常无明显体征
- B. 有时在肺底部可闻及湿性和干性啰音
- C. 长期反复发作，可见肺气肿的体征
- D. 发作时有广泛的湿啰音和哮鸣音
- E. 常在背部出现固定性啰音

答案:E

解析:答案 E 见于早期或干性支气管扩张可无异常肺部体征，病变重或继发感染时常可闻及下胸部. 背部固定而持久的局限性粗湿啰音，有时可闻及哮鸣音，部分慢性患者伴有杵状指(趾)。出现肺气肿. 肺心病等并发症时有相应体征。答案选 E。

标签:

中等

1. 支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，先选用

- A. 吗啡
- B. 杜冷丁
- C. 速尿
- D. 氨茶碱
- E. 肾上腺素

答案:D

解析:氨茶碱能直接松弛支气管平滑肌，缓解气管黏膜的水肿。还有强心、利尿作用。对心率、血压无影响，故不论支气管哮喘还是心源性哮喘，均可使用。

标签:

精华

中等

记忆

2. 左心衰竭时，最早出现和最重要的症状是

- A. 乏力
- B. 呼吸困难
- C. 咳嗽
- D. 咳痰
- E. 咯血

答案:B

解析:左心衰的临床表现为发病急、突然出现呼吸困难、烦躁不安、口唇发绀、大汗淋漓、心率加快、两肺广泛湿啰音及哮鸣音、心尖部奔马律。

标签:

精华

记忆

简单

3. 减慢心率从而降低心肌耗氧量, 缓解心绞痛的药物是

- A. 硝苯地平 (心痛定)
- B. 胺碘酮
- C. 硝酸异山梨醇酯 (消心痛)
- D. 美托洛尔
- E. 硝酸甘油

答案:D

解析:美托洛尔为 β 受体阻滞剂, 可通过阻断 β 受体, 减慢心率, 减弱心肌收缩力, 降低血压, 而减少心肌耗氧量, 缓解心绞痛。

标签:

精华

记忆

简单

4. 消化性溃疡上腹胀满, 疼痛餐后加重, 恶心呕吐后症状缓解。应首先考虑的是

- A. 胃神经官能症
- B. 穿孔
- C. 出血
- D. 幽门梗阻
- E. 癌变

答案:D

解析:A 胃神经官能症之腹痛无规律可循, 可发生于餐前, 亦可发生于餐后, 不支持。B 消化道穿孔常表一, 为突然剧烈腹痛, 持续性加重, 板样腹, 不支持。C 消化道出血临床表现是呕血、便血, 不支持。E 癌变时腹痛呈持续性, 且进行性加重, 不支持。只有幽门梗阻时出现腹痛于餐后加重, 呕吐后疼痛可暂时缓解。

标签:

精华

记忆

简单

5. 慢性胃炎的特异性症状是

- A. 呕吐苦水

- B. 饥饿时中上腹痛
- C. 上消化道反复出血
- D. 进食后中上腹痛
- E. 以上都不是

答案:E

解析:慢性胃炎临床表现缺乏特异性,且症状轻重与病变程度不一致,多数患者常无任何症状。

标签:

精华

记忆

简单

6. 关于慢性肾小球肾炎的描述,哪项是不正确的

- A. 后期有不同程度的贫血
- B. 慢性肾炎多数起病隐匿,进展缓慢,病程较长
- C. 蛋白尿,血尿,高血压,水肿
- D. 晚期无明显的肾功能减退
- E. 慢性肾炎可发于任何年龄,但以中青年为主,男性多见

答案:D

解析:慢性肾小球肾炎晚期可导致肾功能减退。

标签:

精华

记忆

简单

7. 下列哪一项是对鉴别上、下尿路感染最有意义

- A. 中段尿细菌培养阳性
- B. 尿路刺激症状
- C. 尿中白细胞管型
- D. 肾小管浓缩功能正常
- E. 畏寒、发热、腰痛

答案:C

解析:上尿路感染可出现与下尿路感染相似的尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征,但除典型临床表现外,还有白细胞、红细胞、蛋白管型和细菌。而下尿路感染则不会出现白细胞管型。

标签:

精华

记忆

简单

8. 缺铁性贫血最常见的原因是

- A. 摄入量不足
- B. 机体需要量大
- C. 肝脏储存障碍
- D. 慢性失血
- E. 吸收不良

答案:D

解析:慢性失血占缺铁性贫血原因的首位。

标签:

精华

记忆

简单

9. 诊断甲状腺功能亢进最有意义的体征是

- A. 脉压增大
- B. 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音
- C. 浸润性突眼
- D. 心率增快, 第一心音亢进
- E. 双手指细颤

答案:B

解析:诊断甲状腺功能亢进之病位在甲状腺, 如发现弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音意义最大。而浸润性突眼、脉压增大、心率增快, 第一心音亢进、双手指细颤均为甲亢的症状或体征。

标签:

精华

记忆

简单

10. 雄激素治疗再障的机制

- A. 改善骨髓微环境
- B. 提高机体抵抗力, 减少 Ts 细胞数量
- C. 直接刺激骨髓干细胞增生, 提高内源性 EPO 生成
- D. 稳定内皮细胞减少出血
- E. 兴奋中枢神经改善微环境

答案:C

解析:雄激素治疗再障的机制是直接刺激骨髓干细胞增加, 提高内源性 EPO 生成。

标签:

精华

记忆

简单

11. GHbA1 测定的临床意义为反映糖尿病患者

- A. 近半年内血糖总的水平
- B. 近 5 个月内血糖总的水平
- C. 近 16 周内血糖总的水平
- D. 近 8~12 周内血糖总的水平
- E. 近 2~3 周内血糖总的水平

答案:D

解析:GHbA1 测定可反映取血前 8~12 周血糖的总水平,以补空腹血糖只反映瞬时血糖值之不足,成为糖尿病控制情况的监测指标之一。

标签:

精华

记忆

简单

12. 下列各项,大脑中动脉病变不会出现的变化是

- A. 病变对侧偏身感觉障碍
- B. 病变对侧偏瘫
- C. 嗅觉障碍
- D. 病变对侧同向偏盲
- E. 失语或失认

答案:C

解析:大脑中动脉病变会出现“三偏”:对侧偏瘫、偏身感觉障碍、同向性偏盲。当优势半球受损时,可有失语或失认。大脑前动脉病变时刻出现嗅觉障碍。

标签:

精华

记忆

超纲

简单

13. 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是

- A. 强直性脊柱炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 骨性关节炎
- E. 痛风性关节炎

答案:B

解析:类风湿关节炎是以滑膜炎为基本病理改变的风湿病。强直性脊柱炎是附着点炎;风湿性关节炎是关节腔反应性炎症;骨性关节炎是关节软骨变性;痛风性关节炎是关节腔炎症。

标签：
精华
记忆
简单

14. 脑出血和蛛网膜下腔出血临床表现的主要鉴别是

- A. 昏迷程度
- B. 有无神经系统定位体征
- C. 年龄
- D. 血压高低
- E. 起病缓急

答案:B

解析:脑出血多有神经系统定位体征(如内囊等脑实质出血);而蛛网膜下腔出血主要表现为剧烈头痛,如果不合并血管痉挛致脑梗死,多无神经系统定位体征。两病的发病年龄虽有差异,但无法作为主要鉴别点;其他昏迷程度、血压高低、起病缓急都不是重要鉴别点。

标签：
精华
记忆
简单

15. 颈内动脉系统短暂性脑缺血发作的症状可有

- A. 阵发性眩晕
- B. 复视
- C. 交叉性瘫痪
- D. 吞咽困难
- E. 运动性失语

答案:E

解析:颈内动脉系统 TIA 主要表现为对侧单肢无力或轻偏瘫,对侧感觉障碍,失语,一过性黑矇等。

标签：
精华
记忆
简单

16. 有机磷中毒时,下列不属于毒蕈碱样症状的是

- A. 流涎
- B. 瞳孔缩小
- C. 多汗
- D. 肌束颤动
- E. 肺水肿

答案:D

解析:多汗、流涎、瞳孔缩小、肺水肿均为毒蕈碱样症状,局部或全身出现肌束颤动是烟碱样症状。

标签:

精华

记忆

简单

17. 尽快纠正急性 CO 中毒组织缺氧首选方法

- A. 采用高浓度氧气面罩
- B. 注射呼吸兴奋剂
- C. 撤离中毒现场
- D. 人工呼吸
- E. 高压氧舱

答案:E

解析:尽快纠正急性 CO 中毒组织缺氧首选方法高压氧舱治疗。其机制是以高浓度氧置换血中的 CO,是针对病因的治疗。

标签:

精华

记忆

简单

18. 下列哪一项对积与聚无鉴别意义

- A. 积的病位在大腹,聚的病位在小腹
- B. 积属血,聚属气
- C. 积属脏病,聚属腑病
- D. 积的病程长,聚的病程短
- E. 积为固定不移,聚为聚散无常

答案:A

解析:聚病在气分,多属于腑病,病机以气机逆乱为主,可望之有形,但按之无块,聚散无常,痛无定处,病程较短。积病在血分,多属于脏病,病机以痰凝血结为主,望之可无形,但触之必见结块。且固定不移,痛有定处。

标签:

精华

记忆

简单

19. 腰痛的基本病机为

- A. 外邪痹阻经脉,气血运行不畅
- B. 肾精亏虚,腰府失养
- C. 筋脉痹阻,腰府失养

- D. 气滞血瘀，不通则痛
- E. 肾阳不足，不能温煦筋脉

答案:C

解析:腰痛基本病机为筋脉痹阻，腰府失养，记忆题。

标签:

精华

记忆

简单

20. 下列各项，适用消法的是

- A. 尚未成脓的初期肿疡
- B. 脓肿已成的中期肿疡
- C. 肿疡已腐烂筋骨
- D. 正虚邪盛的肿疡
- E. 不易愈合的感染性溃疡

答案:A

解析:消法是运用不同的治疗方法和方药，使初起的肿疡邪毒不致结聚成脓而得到消散的治法，是一切肿疡初起的治法总则，此法适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病以及各种皮肤疾病。故选A。

标签:

精华

记忆

简单

21. 硬膜外麻醉最严重的并发症是

- A. 全脊髓麻醉
- B. 硬膜外出血
- C. 休克
- D. 硬膜外感染
- E. 脊髓损伤

答案:A

解析:硬膜外麻醉最严重的并发症是全脊髓麻醉，病人可呼吸、心跳骤停。

标签:

精华

记忆

简单

22. 煮沸消毒法，杀死带芽胞细菌所需的时间为

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 60 分钟

D. 30 分钟

E. 2 小时

答案:C

解析:煮沸消毒法即水中煮沸至 100℃后,持续 15~20 分钟,一般细菌可被杀灭,但带芽胞的细菌至少需要煮沸 1 小时才能杀灭。

标签:

精华

记忆

简单

23. 关于等渗性缺水,说法正确的是

A. 血清钠浓度明显增高

B. 外科临床中较少见

C. 血清钠浓度明显降低

D. 水和钠按其在血液中的正常比例丢失

E. 也称慢性缺水

答案:D

解析:等渗性缺水又称急性缺水或混合性缺水。外科患者最易生这种缺水。水和钠成比例地丧失,血清钠仍在正常范围,细胞外液的渗透压也保持正常。它造成细胞外液量(包括循环血量)的迅速减少。

标签:

精华

记忆

简单

24. 下列哪项不是丹毒的临床特点

A. 病起缓慢,恶寒发热

B. 局部皮肤焮热肿胀,迅速扩大

C. 局部皮肤忽然变赤

D. 好发于小腿部

E. 容易复发

答案:A

解析:丹毒系由火毒侵犯,郁于肌肤而发的一种急性感染性疾病。病起皮肤突然发红,色如丹涂,焮热肿胀,迅速扩大,一般好发于小腿及头面部,数日内可逐渐痊愈,但常易复发。

标签:

精华

记忆

简单

25. 下列哪一项是诊断张力气胸最充分的依据

- A. 胸膜腔穿刺有高压气体
- B. 伤侧胸部叩诊呈高调鼓音
- C. 伤侧呼吸音消失
- D. X线见纵隔向健侧移位
- E. 呼吸困难并伴有皮下气肿

答案:A

解析:张力性气胸又称高压性气胸,胸膜腔内空气不断增多,压力不断升高,所以胸膜腔穿刺抽出高压气体为其诊断依据。

标签:

精华

记忆

简单

26. 重症急性胰腺炎的实验室检查特异表现是

- A. 血糖下降
- B. 血钙下降
- C. 血脂肪酶早期升高
- D. 尿脂肪酶升高
- E. 血清淀粉酶持续升高

答案:B

解析:重症急性胰腺炎的诊断标准为:急性胰腺炎伴有脏器功能障碍,或出现坏死、脓肿或假性囊肿等局部并发症者,或两者兼有。常见腹部体征有上腹部明显的压痛、反跳痛、肌紧张、腹胀、肠鸣音减弱或消失等。可以并发一个或多个脏器功能障碍,也可伴有严重的代谢功能紊乱,包括低钙血症(血钙 $<1.87\text{mmol/L}$)。增强CT为诊断胰腺坏死的最有效方法,B超及腹腔穿刺对诊断有一定帮助。APACHE II评分 ≥ 8 分。Balthazar CT分级系统 \geq II级。

标签:

精华

记忆

简单

27. 一患者行甲状腺次全切除手术后出现声音嘶哑,喉镜检查显示左侧声带麻痹,分析手术中可能损伤的结构是

- A. 舌下神经
- B. 喉上神经
- C. 舌咽神经
- D. 右侧喉返神经
- E. 左侧喉返神经

答案:E

解析:损伤一侧喉返神经后出现同侧声带麻痹。

标签：
精华
记忆
简单

28. 引起急性乳腺炎最主要的原因是

- A. 初产妇
- B. 先天性乳头内陷
- C. 有乳腺囊性增生症病史
- D. 全身抵抗力下降
- E. 乳头皮肤破溃损伤

答案:E

解析:乳汁淤积和细菌侵入,其中皮肤破溃导致细菌入侵引起乳腺炎是最主要的途径。虽然初产妇的哺乳经验不足可以导致皮肤损伤,身体抵抗力下降可以使发生感染的机会增加,但都不是本病的主要原因,乳腺增生本身与感染无关。

标签：
精华
记忆
简单

29. 下列哪一个是胃十二指肠溃疡外科手术的绝对适应证

- A. 溃疡病穿孔
- B. 瘢痕性幽门梗阻
- C. 应激性溃疡
- D. 胃后壁溃疡
- E. 溃疡病出血

答案:B

解析:胃、十二指肠溃疡患者因幽门管、幽门溃疡或十二指肠球部溃疡反复发作形成瘢痕狭窄,合并幽门痉挛水肿可以造成幽门梗阻。瘢痕性幽门梗阻是外科手术的绝对适应证。术式以胃大部切除为主,也可行迷走神经干切断术加胃窦部切除术。

标签：
精华
记忆
简单

30. 下列哪一项最能说明肝硬化患者已存在门脉高压的表现

- A. 腹水
- B. 门静脉增宽
- C. 食管静脉曲张

D. 痔核形成

E. 脾大

答案:C

解析:门静脉系统阻力增加和门静脉血流量增多是形成门静脉高压症的原因。脾大、侧支循环的建立和开放、腹水是门静脉高压症的三大临床临床表现,尤其以侧支循环的开放,对门静脉高压症的诊断有特征性意义。临床上三支重要的侧支开放,如食管和胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张和痔静脉曲张。

标签:

精华

记忆

简单

31. 下列哪一项是腹外疝最易嵌顿

A. 斜疝

B. 直疝

C. 切口疝

D. 股疝

E. 脐疝

答案:D

解析:由于股管几乎是垂直向下的,疝块在卵圆窝内向前转折时形成一个锐角,并且股环本身比较小,周围又有较多的坚韧的韧带支持,因此股疝容易嵌顿,在腹外疝中,股疝嵌顿者最多。

标签:

精华

记忆

简单

32. 膀胱结石的主要症状是

A. 尿频、尿急

B. 脓尿

C. 尿痛

D. 排尿中断

E. 血尿

答案:D

解析:膀胱结石典型症状为排尿突然中断,多伴有疼痛。故选D。

标签:

精华

记忆

简单

33. 下列哪项不是肛门直肠周围脓肿切开挂线疗法的适应证

- A. 坐骨直肠窝脓肿
- B. 高位肌间脓肿
- C. 骨盆直肠间隙脓肿
- D. 肛门前低位脓肿
- E. 直肠黏膜下脓肿

答案:E

解析:挂线法主要用于坐骨直肠窝脓肿、肌间脓肿,骨合直肠间隙脓肿和脓腔通过肛器直肠环者,直肠黏膜下脓肿表浅,可以采用切开引流术即可。故应选 E。

标签:

精华

记忆

简单

34. 下列哪一项是血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现

- A. 患肢萎缩
- B. 足部及小腿酸痛
- C. 持续性静息痛
- D. 间歇性跛行
- E. 肢端青紫

答案:D

解析:间歇性跛行是血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现。

标签:

精华

记忆

简单

35. 带状疱疹的特征是()

- A. 皮疹多形性
- B. 红色丘疹,散在分布
- C. 粟粒状丘疹,散在分布
- D. 簇集性水疱呈带状分布
- E. 粟粒状丘疹呈带状分布

答案:D

解析:带状疱疹是一种皮肤上出现成簇水疱,呈带状分布,痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。

标签:

36. 股癣指皮肤癣菌感染下列哪一组皮肤部位

- A. 腹股沟、会阴和肛周皮肤
- B. 平滑皮肤、腹股沟、会阴

- C. 平滑皮肤、腹股沟、头发
- D. 平滑皮肤、掌跖皮肤、腹股沟
- E. 腹股沟、会阴、甲板

答案:A

解析:股癣指腹股沟、会阴、肛周和臀部的皮肤癣菌感染。

标签:

精华

记忆

简单

37. 有黏膜覆盖, 位于齿状线上方, 由痔内静脉丛形成的瘡是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 混合痔
- D. 血栓痔
- E. 葡萄痔

答案:A

解析:内痔是直肠上静脉丛的曲张静脉团块, 位于齿线以上, 表面黏膜覆盖, 常见于左侧、右前, 右后三处。

标签:

精华

记忆

简单

38. 下列关于卵巢特征的叙述, 正确的是

- A. 卵巢表面有腹膜覆盖
- B. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
- C. 成年妇女卵巢重约 5~6g
- D. 髓质内含数以万计的原始卵泡
- E. 卵巢内侧以骨盆漏斗韧带与子宫相连

答案:C

解析:卵巢形态上呈椭圆形, 重 5~6g。组织结构上, 卵巢表面无腹膜覆盖。卵巢表层为单层立方上皮即生发上皮, 其下为纤维组织, 称卵巢白膜。髓质在卵巢的中心部, 无卵泡, 与卵巢门相连, 含有疏松结缔组织及丰富的血管、神经。卵巢内侧以卵巢固有韧带与子宫相连。

标签:

精华

中等

记忆

39. 子宫内膜从增生期变成分泌期, 其最直接原因是()

- A. 促性腺激素的作用
- B. 促性腺激素释放激素的作用
- C. 雌激素的作用
- D. 孕激素的作用
- E. HCG 的作用

答案:D

解析:孕激素的作用:①使增生期变化的子宫内膜呈分泌期变化。②降低妊娠子宫对催产素的敏感性。③有使基础体温升高的作用,一般可升高 $0.3^{\circ}\text{C}\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 。④当乳腺已受到雌激素影响之后,孕激素能促使乳腺小泡的发育。

标签:

精华

中等

记忆

40. 关于正常妊娠,于12周末时手测宫底高度是

- A. 双合诊才能够触及
- B. 下腹部不能触及
- C. 脐耻之间
- D. 耻骨联合上2~3横指
- E. 耻骨联合上刚能触及

答案:D

解析:子宫在孕12周末时,手触摸子宫底在耻骨联合上2~3横指;孕16周末,宫底在脐耻之间。

标签:

应用

精华

中等

记忆

41. 出口后矢状径测得的正常值应为

- A. 6cm
- B. 7cm
- C. $10\sim 11\text{cm}$
- D. $8\sim 9\text{cm}$
- E. 12cm

答案:D

解析:出口后矢状径为坐骨结节间径中点至骶骨尖端的长度。正常值为 $8\sim 9\text{cm}$ 。出口后矢状径径值与坐骨结节间径值之和 $>15\text{cm}$,表明骨盆出口无明显狭窄。

标签:

精华

中等

记忆

42. 关于骨产道的描述, 不正确的是

- A. 骨盆入口平面横径比前后径长
- B. 中骨盆平面是骨盆最狭窄的平面
- C. 坐骨结节间径是骨盆出口平面横径
- D. 站立时, 骨盆入口平面与地平面平行
- E. 坐骨棘间径是中骨盆横径

答案:D

解析: 骨盆倾斜度是指妇女站立时, 骨盆入口平面与地平面所形成的角度为 60° 。骨盆倾斜度过大, 影响胎头衔接和娩出。

标签:

精华

中等

记忆

43. 关于产后恶露, 错误的是

- A. 血性恶露持续 $3\sim 4$ 日
- B. 浆液性恶露持续10日左右
- C. 正常恶露持续 $2\sim 3$ 周干净
- D. 白色恶露持续3周左右
- E. 正常恶露总量为 $250\sim 500\text{ml}$, 个体差异较大

答案:C

解析: 正常恶露有血腥味, 但无臭味, 持续 $4\sim 6$ 周, 总量为 $250\sim 500\text{ml}$, 个体差异较大。血性恶露约持续3日, 逐渐转为浆液恶露, 约2周后变为白色恶露, 约持续3周干净。

标签:

精华

中等

记忆

44. 妇科的发病机制, 可概括为

- A. 脏腑功能失常、气血失调、冲任督带损伤三个方面
- B. 先天肾气不足, 后天房劳多产损伤肾精, 肾为冲任之本, 肾虚, 冲任不固
- C. 情志内伤, 肝气郁结, 血为气滞, 冲任失调
- D. 忧思劳倦, 饮食不节, 损伤脾气, 脾失统摄, 气随血陷, 冲任不固
- E. 忧愁思虑, 心阴暗耗, 营血不足, 冲任虚损

答案:A

解析:妇女的经、带、胎、产、乳均与脏腑、气血、经络的生理功能有关。因此各种致病因素引起脏腑功能失常、气血失调,冲、任、督、带损伤,皆可发生妇科疾病。

标签:

精华

中等

记忆

45. 东汉时期提出的“新产三病”是

- A. 冲心、冲肺、冲胃
- B. 呕吐、盗汗、泄泻
- C. 痉、郁冒、大便难
- D. 腹痛、恶露不尽、乳汁不下
- E. 以上均不是

答案:C

解析:

标签:

精华

中等

记忆

46. 诊断胎漏下列哪项最为重要()

- A. 孕后阴道少量出血,胎元未殒
- B. 停经后阴道少量出血,无腰酸腹痛
- C. 孕后阴道出血,时下时止
- D. 停经后阴道出血,淋漓不断
- E. 停经后阴道出血如月经量

答案:B

解析:《医学入门》:“不痛而下血者为胎漏。”多因孕后气血虚弱,或肾虚,血热等因素导致冲任不固,不能摄血养胎,症见阴道不时下血,量少或按月来血,并无腰酸腹痛及小腹下坠等症。

标签:

精华

中等

记忆

47. 下列哪一项是子宫破裂的最典型表现

- A. 产妇在胎儿娩出后,阴道立即流血
- B. 产后突然休克
- C. 子宫出现病理性缩复环
- D. 宫缩消失,腹壁下可触及胎儿肢体

E. 胎动消失伴阴道大流血

答案:D

解析:子宫破裂的最典型表现是宫缩消失,腹壁下可触及胎儿肢体。

标签:

精华

中等

记忆

48. 以下关于产褥感染的论述中正确的是()

A. 分娩后生殖道的感染

B. 表现为分娩 24 小时后至产后 15 天内,体温有两次达到或超过 38℃

C. 由于抗生素的应用,已经不是产妇死亡的主要原因之一

D. 感染源主要为外来感染

E. 感染部位局限,不会蔓延到其他组织器官

答案:A

解析:产褥感染发热一般出现在产后 3-7 日,外阴、阴道、宫颈部位感染者,发热常不明显。故答案 B 不正确;迄今为止,感染、出血和高血压仍为孕产妇死亡的三大主要原因。故答案 C 不正确。产褥感染的诱因有体质虚弱、孕期贫血、营养不良、慢性疾病、临近预产期性交、各种产科手术操作等等很多,故答案 D 不正确。

标签:

精华

中等

记忆

49. 肾阴虚型外阴瘙痒的主症是

A. 阴部皮肤溃疡、疼痛

B. 阴部干涩

C. 带下量多,色黄如脓

D. 外阴变白、皲裂

E. 阴部萎缩、平坦

答案:B

解析:肾阴虚型外阴瘙痒的证候包括阴部干涩,灼热瘙痒,或带下量少,色黄,甚则如血样等。A 选项,溃疡、疼痛为外阴溃疡证候,不属外阴瘙痒证候。C 选项,带下量多,色黄如脓属湿热下注型外阴瘙痒证候。D 选项与 E 选项属硬化性苔癣证候。

标签:

精华

中等

记忆

50. 滴虫阴道炎带下的特点是

- A. 白色乳酪样
- B. 黄绿色脓性
- C. 赤白带相兼
- D. 灰黄色泡沫样
- E. 匀质稀薄状

答案:D

解析:白带多呈灰黄色泡沫状为滴虫阴道炎的带下表现,白色豆腐渣样白带多为念珠菌阴道炎特点,带下匀质稀薄状多为细菌性阴道病特点,赤白带相兼多见于老年性阴道炎。

标签:

精华

中等

记忆

51. 办了确定是否有排卵,进行诊刮的时间()

- A. 月经中期
- B. 月经来潮的第5天
- C. 月经来潮的第3天
- D. 月经来潮前或来潮的6小时内
- E. 月经来潮的24小时内

答案:D

解析:诊断性刮宫:为排除子宫内膜病变和达到止血目的,必须进行全宫刮,搔刮整个宫腔。诊刮时应注意宫腔大小、形态,宫壁是否平滑,刮出物的性质和量。为了确定排卵或黄体功能,应在经前期或月经来潮6小时内刮宫;不规则流血者可随时进行刮宫。子宫内膜病理检查可见增生期变化或增生过长,无分泌期出现。

标签:

精华

中等

记忆

52. 多囊卵巢综合征,内分泌特征下列哪项是错误的()

- A. 雄激素过多
- B. 雌酮过多
- C. 促性腺激素 FSH 与 LH 均升高
- D. 胰岛素过多
- E. 雌、孕激素试验阳性

答案:C

解析:多囊卵巢综合征的内分泌特征有:1. 雄激素过多;2. 雌酮过多;3. 黄

体生成激素/卵泡刺激素(LH/FSH)比值增大；4. 胰岛素过多。

标签：

精华

中等

记忆

53. 宫颈癌的好发部位是

- A. 宫颈外口鳞状上皮处
- B. 宫颈管柱状上皮处
- C. 宫颈内口鳞柱状上皮交界处
- D. 宫颈外口鳞柱状上皮交界处
- E. 宫颈阴道部

答案:D

解析:宫颈原始鳞柱交界和生理性鳞柱交界之间所形成的区域称移行带区,为宫颈癌好发部位。

标签：

精华

中等

记忆

54. 葡萄胎重要的病理特征是()

- A. 绒毛构型完好
- B. 黄素化囊肿
- C. 滋养细胞增生
- D. 绒毛间质水肿
- E. 间质内胚源性血管消失

答案:C

解析:葡萄胎组织特点:①滋养细胞呈不同程度的增生;②绒毛间质水肿;③绒毛间质中血管消失。其中滋养细胞呈不同程度的增生为最重要的特点。

标签：

精华

中等

记忆

55. 子宫内膜异位症患者行根治性手术的切除范围为()

- A. 子宫及双附件
- B. 子宫、双附件及盆腔内所有病灶
- C. 双附件及盆腔内所有内膜异位病灶
- D. 子宫、双附件及盆腔淋巴结清除
- E. 子宫、双附件及盆腔内所有内膜异位病灶

答案:E

解析:为了彻底的根除病灶, 必须将子宫. 双附件及盆腔内所有内膜异位病灶都清除。

标签:

精华

中等

记忆

56. 重度子宫脱垂(III度)常伴有的是

- A. 宫颈溃疡
- B. 膀胱、直肠膨出
- C. 张力性尿失禁
- D. 阴道壁溃疡
- E. 以上都是

答案:E

解析:由于外阴部有块物脱出, 患者行动极为不便, 且可因长期摩擦导致宫颈和阴道壁溃疡, 甚至出现流血。当溃疡继发感染时, 则有脓血分泌物渗出。重度子宫脱垂患者多伴有重度膀胱膨出, 故易有尿潴留; 若同时有尿道膨出, 还可发生张力性尿失禁。

标签:

精华

中等

记忆

57. 下列哪一项是原发性不孕症的定义

- A. 夫妇同居性生活正常, 未避孕一年未孕者
- B. 夫妇同居性生活正常, 未避孕二年未孕者
- C. 夫妇同居性生活正常, 虽第一次婚姻曾生育, 此后未避孕二年未孕者
- D. 夫妇同居性生活正常, 虽第一次婚姻曾生育, 此后未避孕一年未孕者
- E. 夫妇同居婚后一年未孕, 一方有无法纠正的解剖生理缺陷者

答案:A

解析:女子婚后有正常性生活, 夫妇同居 1 年, 未避孕而未怀孕者; 或曾有过妊娠, 而后未避孕, 又连续 1 年未再受孕者, 称为“不孕症”。前者称为“原发性不孕”, 古称“全不产”。后者称为“继发性不孕”, 古称“断绪”。

标签:

精华

中等

记忆

58. 放置宫内节育器的禁忌证不包括

- A. 乳腺增生
- B. 生殖器官炎症

- C. 近 3 个月月经紊乱
- D. 子宫颈口过松
- E. 重度子宫脱垂

答案:A

解析:本题考查放置宫内节育器的禁忌证。放置节育器前,必须排除妊娠;生殖器官炎症;近 3 个月月经紊乱;生殖器肿瘤、子宫颈口过松、重度子宫脱垂;严重的全身性疾病;严重的出血性疾病患者。A 选项乳腺增生不属于放置节育器的禁忌证。

标签:

精华

中等

记忆

59. 婴儿期指的是

- A. 周岁至满 3 周岁
- B. 生后 28 天到满 1 周岁
- C. 出生后脐带结扎时起,至生后足 28 天
- D. 周岁后(第 4 年)到入小学前(6~7 岁)
- E. 6~7 岁至 11~12 岁

答案:B

解析:小儿分为新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期。婴儿期是生后 28 天到 1 岁阶段。

标签:

精华

记忆

简单

60. 关于病理性黄疸叙述不正确的是

- A. 黄疸持续时间长
- B. 黄疸程度较重
- C. 黄疸出现时间晚
- D. 黄疸进展快
- E. 消退后复现

答案:C

解析:答案解析:新生儿病理性黄疸特点是:①黄疸于出生后 24h 内出现;②足月儿黄疸持续>2 周,早产儿黄疸持续>4 周;③黄疸退而复现;④足月儿血清胆红素>205 $\mu\text{mol/L}$ (12mg/dl),早产儿>256 $\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl),血清结合胆红素>26 $\mu\text{mol/L}$ (1.5mg/dl)。

标签:

精华

中等
记忆

61. 关于小儿肺炎合并心力衰竭的诊断要点，错误的是()

- A. 心率突然超过 180/min
- B. 呼吸突然加快，超过 60/min
- C. 心音低钝，颈静脉怒张
- D. 突然极度烦躁不安，发绀
- E. 脾脏迅速增大

答案:E

解析: 小儿肺炎合并心力衰竭的诊断依据: ①呼吸突然加快, 高于 60/min; ②心率突然增快, 高于 180/min; ③突然极度烦躁不安, 明显发绀, 面色苍白发灰, 指(趾)甲微血管充盈时间延长; ④心音低钝, 奔马律, 颈静脉怒张; ⑤肝脏迅速增大; ⑥尿少或无尿, 颜面眼睑或双下肢浮肿。具有前 5 项即可诊断为心力衰竭。

标签:

62. 下列各项中, 不属于诊断病毒性心肌炎的主要指标的是

- A. 多汗、肌痛、胸闷
- B. 有心脏扩大或心包炎表现
- C. 急慢性心功能不全或心脑综合征
- D. 心电图见明显心律失常
- E. 心脏放射性核素扫描发现心室扩大

答案:A

解析: 诊断病毒性心肌炎的主要指标: ①急、慢性心力衰竭或心脑综合征; ②奔马律或心包摩擦音; ③心脏扩大; ④心电图有明显心律失常和 ST-T 改变。多汗、心悸、胸闷为次要指标。

标签:

精华

中等

记忆

63. 重度低渗性脱水患儿, 下列哪项最适用第一天补液()

- A. 150~180ml/kg^{2/3} 含钠液
- B. 120~150ml/kg^{2/3} 张含钠液
- C. 150~180ml/kg^{1/3} 含钠液
- D. 180~200ml/kg^{1/2} 张含钠液
- E. 180~200ml/kg^{1/3} 含钠液

答案:A

解析: 根据脱水的程度确定, 轻度脱水时为 90~120ml/Kg, 中度脱水时为 120~150ml/Kg, 重度脱水时为 150~180ml/kg。等渗性脱水用 1/2 张含钠液,

低渗性脱水用 2/3 张含钠液，高渗性脱水用 1/3 张含钠液。

标签：

64. 下述病史与急性肾小球肾炎关系最为密切的是

- A. 1~2 周前上呼吸道感染
- B. 2 周前腰部外伤史
- C. 3 前天腹泻
- D. 3 个月前有猩红热史
- E. 2 个月前有水痘病史

答案:A

解析:急性肾小球肾炎发病前 1~3 周有上呼吸道感染或脓疱疮(脓皮病)。

标签：

精华

中等

记忆

65. 西医治疗病毒性脑炎以下措施中错误的一项是()

- A. 注意营养供给，维持水和电解质平衡
- B. 重症患儿应注意呼吸道和心血管功能的监护与支持
- C. 积极控制脑水肿和颅内高压
- D. 控制惊厥发作
- E. 使用广谱抗生素

答案:E

解析:病毒性脑炎使用广谱抗生素无效。

标签：

66. 下列各项，不属注意力缺陷多动障碍临床特征的是()

- A. 注意力不集中
- B. 智力低下
- C. 男孩多于女孩
- D. 做事马虎
- E. 冲动任性

答案:B

解析：

标签：

精华

中等

记忆

67. 营养性缺铁性贫血实验室检查中，正确的是

- A. 血清铁降低，总铁结合力增高，铁粒幼红细胞增加
- B. 血清铁蛋白降低，血清铁降低，总结合力降低

- C. 总铁结合力降低，血清铁降低，铁粒幼红细胞减少
- D. 血清铁蛋白降低，红细胞游离原卟啉增高，血清铁降低
- E. 红细胞游离原卟啉增高，铁粒幼红细胞增高，血清铁降低

答案:D

解析:营养性铁性贫血的实验室检查见血红蛋白和红细胞减低，以血红蛋白降低为主，呈小细胞低色素性贫血。血清铁蛋白降低；血清铁降低；总铁结合力增高；红细胞游离原卟啉增高；骨髓细胞总数增加，幼红细胞增生活跃，以中、晚幼红细胞增生明显，各期红细胞均较正常小，胞浆少、染色偏蓝，白细胞系和巨核细胞一般正常。

标签:

精华

中等

记忆

68. 真性性早熟和假性性早熟的鉴别依据是

- A. 颅脑 CT
- B. GnRH 兴奋试验
- C. X 线摄片
- D. B 超
- E. 颅脑 MRI

答案:B

解析:真性性早熟和假性性早熟可通过 GnRH 兴奋试验鉴别。其原理是通过 GnRH 刺激垂体分泌 LH 和 FSH，从而评价垂体促性腺激素细胞的储备功能。

标签:

精华

中等

记忆

69. 佝偻病后遗症期的最主要表现是()

- A. 睡眠不安及多汗
- B. X 线长骨骺端呈毛刷样改变
- C. 骨骼畸形
- D. 血磷下降，血钙正常
- E. 肌肉韧带松弛

答案:C

解析:

标签:

精华

中等

记忆

70. 麻疹恢复期皮肤可见

- A. 无色素斑痕及脱屑
- B. 有麦麸样脱屑(除手心脚掌外), 留存棕色斑痕
- C. 无色素斑痕, 可见脱屑
- D. 有色素斑痕, 无脱屑
- E. 有色素斑痕, 并有麦麸状细微脱屑

答案:B

解析:麻疹出疹 3~5 天后, 如无并发症, 皮疹依出疹顺序逐渐消退, 疹退处有麦麸样脱屑(除手心脚掌外), 留存棕色斑痕, 经 1~2 周后才完全消失, 此色素斑在病的后期有诊断意义。

标签:

精华

中等

记忆

71. 蛔虫病主要疼痛部位是()

- A. 胃脘部
- B. 左下腹
- C. 痛无定处
- D. 右下腹
- E. 脐周部

答案:E

解析:

标签:

精华

中等

记忆

72. 流行性腮腺炎肿大部位是在于

- A. 两侧颈部
- B. 两侧耳后
- C. 两侧颌下
- D. 耳垂为中心
- E. 两侧面部

答案:D

解析:腮腺肿大的特点是以耳垂为中心, 向前、后、下蔓延。

标签:

精华

中等

记忆

73. 某男，患肺炎，经抗生素治疗后好转，现症见：干咳少痰，咳嗽声低，气短神疲，身热，手足心热，自汗，心胸烦闷，口渴欲饮，舌红，苔薄黄，脉细数。其治疗宜首选（ ）

- A. 竹叶石膏汤加减
- B. 清营汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 生脉散合四逆汤
- E. 补肺汤

答案:A

解析:正虚邪恋证 证候:干咳少痰,咳嗽声低,气短神疲,身热,手足心热,自汗或盗汗,心胸烦闷,口渴欲饮,或虚烦不眠,舌红,苔薄黄,脉细数。 治法:益气养阴,润肺化痰。 方药:竹叶石膏汤。

标签:

应用
精华
中等

74. 患者，男，50岁，有心脏病史8年，此次因劳累受惊后发作。症见喘促日久，呼多吸少，动则更甚，形寒神疲，渐至喘促持续不解，张口抬肩，面赤躁扰，汗出如珠，脉浮大无根。查体：双肺可闻及干、湿啰音，心率130次/分，心尖区可闻及舒张期奔马律，中医诊为“心衰”，除西药治疗外，治疗应首选

- A. 真武汤合五苓散
- B. 圣愈汤合小陷胸汤
- C. 通脉四逆汤合参附龙牡汤
- D. 参附汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 参附汤合五苓散

答案:C

解析:从喘促日久,呼多吸少,动则更甚,可判断为肾气虚;形寒神疲,渐至喘促持续不解,抬肩撷肚,面赤躁扰,汗出如珠,脉浮大无根,可判断为肾阳虚,虚阳外越。通脉四逆汤合参附龙牡汤二方具有回阳救逆固脱之功。

标签:

应用
精华
简单

75. 患者，女，28岁。反复胃脘疼痛伴泛酸1年。现症见胃脘灼热作痛，痛势急迫拒按，泛酸嘈杂，心烦易怒，口干口苦。舌红苔黄，脉弦数。查体：剑突下压痛，无反跳痛及肌紧张，胃镜示：慢性浅表性胃炎。其证型是

- A. 饮食停滞证

- B. 肝气犯胃证
- C. 瘀血停滞证
- D. 胃阴不足证
- E. 肝胃积热证

答案:E

解析:从胃脘灼热作痛,舌红苔黄,脉数可以判断有胃热;从心烦易怒,口干口苦,脉弦数可以判断肝经有热。选E。

标签:

精华

记忆

简单

76. 患者,女,48岁。小便淋漓不已,时作时止,每于劳累后发作或加重,小便有灼热感,时有尿痛,面色苍白,神疲倦怠,少气懒言,腰膝酸软,食欲不振,舌质淡,苔薄白,脉沉细。治疗宜选用

- A. 八正散加减
- B. 丹栀逍遥散加减
- C. 无比山药丸加减
- D. 知柏地黄丸加减
- E. 补中益气汤加减

答案:C

解析:尿路感染脾肾亏虚,湿热屡犯证。①证候:小便淋漓不已,时作时止,每于劳累后发作或加重,尿热,或有尿痛,面色无华,神疲乏力,少气懒言,腰膝酸软,食欲不振,口干不欲饮水,舌质淡,苔薄白,脉沉细;②治法:健脾补肾;③方药:无比山药丸加减。

标签:

理解

精华

简单

77. 患者,女,24岁。再生障碍性贫血。症见:面色及唇甲苍白,食欲下降,精神萎靡,腰膝酸软,形寒肢冷,月经色淡,舌胖有齿痕苔白,脉沉细。其证型是

- A. 肾虚血瘀
- B. 脾气虚弱
- C. 气血两虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 脾胃虚寒

答案:D

解析:从食欲减退,舌淡胖有齿痕可判断有脾气虚;从腰膝酸软,形寒肢冷,

脉沉可判断有肾阳虚，综合判断为脾肾阳虚。

标签：

应用

精华

中等

78. 患者，男，65 岁。患消渴病 20 余年，现多食、多饮诸症不明显，唯小便频数，饮一溲一，面色黧黑，腰膝酸软，形寒怕冷，舌淡苔白，脉沉无力。

治疗应首选

- A. 消渴方
- B. 玉女煎
- C. 左归饮
- D. 金匮肾气丸
- E. 六味地黄丸

答案：D

解析：消渴病阴阳两虚。①证候：小便频数量多，或饮一便一，尿如脂膏，面色黎黑，阳事不举，耳输焦干，舌淡苔白，脉象沉细无力；②治法：温阳滋肾；③方药：金匮肾气丸。

标签：

应用

精华

简单

79. 患者，女，50 岁。现症见左侧半身偏枯不用，肢体软弱无力，面色萎黄，有时肢体麻木不仁，舌淡紫，苔薄白，脉细涩无力。治疗应首选

- A. 三痹汤
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 桃红饮
- D. 补阳还五汤
- E. 当归四逆汤

答案：D

解析：从面色萎黄，有时肢体麻木不仁，舌淡紫，苔薄白，脉细涩无力可判断为气虚血瘀证，治疗当益气活血通脉。三痹汤具有益气养血，祛风胜湿功效，用于血气凝滞证，不符合。黄芪桂枝五物汤具有益气温经，和经通痹功效，用于血痹证，不符合。桃红饮具有活血化瘀功效，用于瘀血内阻证，不符合。当归四逆汤具有温经散寒，养血通脉功效，用于阳虚寒凝血脉证，不符合。补阳还五汤具有补气活血通络功效，用于气虚血瘀所致的半身不遂。

选 D。

标签：

应用

精华
简单

80. 患者，男，45 岁。脘腹胀痛，呕吐，停止排便排气 60 小时。检查：神情淡漠，末梢循环差，腹胀如鼓，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，肠鸣音微弱，舌红绛苔黄腻，脉沉细数。应首先考虑的是

- A. 肠梗阻瘀结证
- B. 肠梗阻热结证
- C. 肠梗阻痞结证
- D. 阑尾炎瘀滞证
- E. 阑尾炎湿热证

答案：B

解析：肠梗阻的中医证型有：1 气滞血瘀证宜行气活血，通腑攻下，桃仁承气汤加减。2 肠腑热结证宜活血清热，通里攻下，复方大承气汤加减。3 肠腑寒凝证宜温中散寒，通里攻下，温脾汤加减。4 水结湿阻证宜理气通下，攻逐水饮，甘遂通结汤加减。⑤虫积阻滞证宜消导积滞，驱蛔杀虫，驱蛔承气汤加减。据患者腹胀，呕吐，停止排便排气考虑为肠梗阻。据舌红绛苔黄腻，脉沉细数考虑为热结，故选 B。

标签：

精华
记忆
简单

81. 患者，女，36 岁。乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满，舌质淡红苔薄白，脉细涩。其证型是

- A. 痰瘀凝结
- B. 肝郁气滞
- C. 气滞血瘀
- D. 冲任失调
- E. 湿热蕴结

答案：B

解析：乳腺囊性增生病肝郁气滞证。①证候：乳房胀痛或有肿块，一般月经来潮前乳痛加重，肿块增大，行经后好转；伴有情绪抑郁，心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满等；舌质淡红，苔薄白，脉细涩；②治法：疏肝押气，散结止痛；③方药：逍遥散加减。

标签：

精华
记忆
简单

82. 患者，男，50 岁。小便不畅，尿液点滴而下，小腹拘急胀痛；舌质紫暗

有瘀斑，脉涩。治疗应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 石韦散
- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 天台乌药散

答案:D

解析:前列腺增生症气滞血瘀证。①证候:小便不畅,尿线变细或尿液点滴而下,或尿道闭塞不通,小腹拘急胀痛;舌质紫暗或有瘀斑,脉弦或涩;

②治法:行气活血,通窍利尿;③方药:沉香散加减。

标签:

应用

精华

简单

83. 患者,女,27岁,已婚。G3P0.,自然流产2次停经45天,阴道流血5天,量少,腰腹坠痛,头晕耳鸣,尿频,舌淡,苔白,脉沉滑尺弱。尿妊娠试验(+).下列哪一项是治疗首选的

- A. 寿胎丸
- B. 圣愈汤
- C. 泰山磐石散
- D. 补肾固冲丸
- E. 举元煎

答案:D

解析:患者有停经史,尿妊娠试验(+),应确诊为妊娠;现阴道少量流血,腰酸腹坠痛,应考虑有流产先兆;又因患者已有2次流产史,则有滑胎的可能;其屡孕屡堕,并且表现的症状及舌、脉均为一派肾气亏虚之象,辨其属肾气亏损证。治宜首选补肾固冲丸,以补肾固冲安胎。

标签:

应用

精华

中等

记忆

84. 患者,女,26岁,已婚。产后4天,高热寒战,小腹疼痛拒按,恶露量较多、色紫黯如败酱,有臭气,烦躁口渴,便结尿黄,舌红苔黄,脉洪数。诊断为产褥感染。症状属于

- A. 外感风热
- B. 血瘀
- C. 血虚

D. 感染邪毒

E. 湿热

答案:D

解析:患者产后,除高热、恶露臭秽、腹痛拒按外,伴见邪毒炽盛、津液受损的症状舌脉均为邪毒内盛之征,故辨证为感染邪毒。

标签:

精华

中等

记忆

85. 女, 28 岁, 近 1 周出现阴部瘙痒, 如虫形状, 甚则奇痒难忍, 灼热疼痛, 带下量多, 色黄呈泡沫状, 臭秽, 心烦少寐, 胸闷呃逆, 口苦咽干, 苔黄腻, 脉滑数。主方选用()

A. 龙胆泻肝汤去木通

B. 易黄汤

C. 五味消毒饮

D. 胜湿汤

E. 二妙散

答案:A

解析:龙胆泻肝汤【组成】龙胆草(6 克) 黄芩(9 克) 山栀子(9 克) 泽泻(12 克) 车前子(9 克) 当归(8 克) 生地黄(20 克) 柴胡(10 克) 生甘草(6 克)

【功用】泻肝胆实火, 清下焦湿热。【主治】肝胆实火上扰, 症见头痛目赤, 胁痛口苦, 耳聋耳肿; 或湿热下注, 症见阴肿阴痒, 筋痿阴汗, 小便淋浊, 妇女湿热带下等。

标签:

精华

中等

记忆

86. 某女, 21 岁, 未婚。月经先期, 经期延长已 2 年余。肛检: 外阴发育正常, 宫体较小。诊为“功血”。曾用激素并服中药治疗 3 个月无效。前次月经约行 50 日始止。本次又值经期, 已 2 日, 量多如注, 色鲜红, 质稍稠, 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 口干, 苔少, 脉细数。此病常用方剂()

A. 清热固经汤

B. 左归丸合二至丸

C. 固本止崩汤

D. 四物汤合失笑散

E. 右归丸

答案:B

解析:患者为肾阴虚的功能失调性子宫出血, 应该采用左归丸合二至丸以滋

肾养阴，调经止血。故答案选择B。

标签：

精华

中等

记忆

87. 王某，女，38岁。月经数月不行，形体肥胖，胸脘满闷，呕恶痰多，带下量多，舌苔白腻，脉滑。治法应是()

- A. 燥湿祛痰，行气通经
- B. 健脾祛湿，活血调经
- C. 燥湿祛痰，健脾止带
- D. 燥湿健脾，消食导滞
- E. 燥湿化痰，活血通经

答案：E

解析：患者症状符合闭经的痰湿阻滞型(月经停闭，胸胁胀满，呕恶痰多，神疲倦怠，或面浮肢肿，或带下量多，色白，质黏稠，大便溏。舌体淡胖，苔腻，脉沉缓或滑)。治法：燥湿化痰，活血通经；方药：苍附导痰丸。

标签：

88. 一女患者，腹中有癥瘕，小腹胀痛或刺痛，伴有精神抑郁，经前乳房胀痛，胸胁胀闷，舌苔薄，舌边有瘀点，脉细弦。可用哪一方治疗()

- A. 银甲丸
- B. 血府逐瘀汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 以上都不是

答案：C

解析：患者为气滞血瘀证。采用活血化瘀，软坚散结的方法治疗，方用膈下逐瘀汤治疗。

标签：

精华

中等

记忆

89. 患者，女，42岁。下腹疼痛，经期加重已8年，经期长，经量多，药物治疗无显效。妇科检查：宫体后曲，活动尚可，增大如妊娠7周，右角结节状突起质硬，轻压痛。该患者应该是

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫内膜异位症
- C. 子宫腺肌病
- D. 慢性盆腔炎

E. 结核性盆腔炎

答案:C

解析:中年生育期妇女,继发性逐渐加重性痛经,应考虑有子宫腺肌病。如伴有月经过多,经期过长,子宫增大,更应考虑子宫腺肌病。

标签:

精华

中等

记忆

90. 足月男婴,出生后 6 小时即出现身黄、目黄、精神差、呕吐、吮乳少、尿黄,四肢欠温,便溏,舌质淡,苔白腻,指纹淡。治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤加减
- B. 膈下逐瘀汤加减
- C. 茵陈理中汤加味
- D. 羚角钩藤汤合茵陈蒿汤加减
- E. 黄连解毒汤加减

答案:C

解析:茵陈理中汤加味对于治疗足月男婴,出生后 6 小时即出现身黄、目黄、精神差、呕吐、吮乳少、尿黄,四肢欠温,便溏,舌质淡,苔白腻,指纹淡有较好的效果

标签:

精华

中等

记忆

91. 患儿,3 岁。发热 2 天,咳嗽气急,双肺下部啰音固定。突然烦躁,面色苍白,口唇发绀,心率快 170/min。心音低钝,肝脏增大,查心电图,T 波低平。其诊断是()

- A. 支气管肺炎,心阳虚衰
- B. 支气管肺炎,邪陷厥阴
- C. 支气管肺炎,风寒闭肺
- D. 支气管肺炎,风热闭肺
- E. 间质性肺炎,风热犯肺

答案:A

解析:根据题干,应诊断为支气管肺炎,心阳虚衰证。

标签:

92. 患儿,7 岁。神疲乏力、心悸不适 2 周,现发热咳嗽,就诊时突然面色苍白,呼吸急促,额汗不温,四肢厥冷,唇指发青,脉沉细微弱。其证候是()

- A. 心脉瘀阻

- B. 风热犯心
- C. 心阳暴脱
- D. 心阳虚弱
- E. 气阴亏虚

答案:D

解析:解析: 患儿症见面色苍白, 呼吸急促, 额汗不温, 四肢厥冷, 唇指发青, 脉沉细微弱为心阳虚弱; 心阳暴脱者可见大汗淋漓、四肢厥冷、唇紫息微、脉微细欲绝。故选 D。

标签:

应用

精华

中等

记忆

93. 患儿, 男, 1 岁。患婴幼儿腹泻 2 天, 泻下急迫, 大便呈稀水蛋花样, 有黏液及辛臭味, 伴阵发啼哭, 发热, 烦躁, 口渴, 困倦, 小便短赤, 肛门灼热、发红。其证型是下列哪一项

- A. 伤食
- B. 湿热
- C. 脾虚
- D. 风寒
- E. 脾肾阳虚

答案:B

解析:湿热泻的证候为泻下如注, 一日数次或数十次, 粪色深黄而臭, 或便排不畅似痢非痢, 微见黏液, 肛门灼热而痛, 食少纳差, 神倦乏力, 口渴引饮, 烦躁, 腹部微痛, 发热或不发热, 小便短黄, 面黄唇红。舌质红, 苔黄厚腻, 指纹紫滞。

标签:

精华

中等

记忆

94. 患儿, 6 岁。浮肿 4 天, 小便量少色赤, 烦热口渴, 头身困重, 尿蛋白(+), 红细胞 20 个/HP, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。其首选方剂是()

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 五味消毒饮
- C. 五苓散
- D. 温胆汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

答案:B

解析:

标签:

应用

精华

中等

记忆

95. 患儿，11 岁。面色萎黄，精神疲惫，食欲不振，喉中做声，四肢肌肉抽动，时轻时重，舌质淡红，舌苔白腻，脉沉弦无力。治疗应首选的方剂是（ ）

- A. 礞石滚痰丸加减
- B. 醒脾散加减
- C. 清肝达郁汤
- D. 大定风珠加减
- E. 《千金》龙胆汤加减

答案:B

解析:

标签:

精华

中等

记忆

96. 患儿，3 岁。营养性缺铁性贫血，症见面色萎黄，唇甲淡白，发黄枯燥，容易脱落，心悸气短，头晕目眩，夜寐欠安，语声低微，精神萎靡，食欲不振，舌淡红，苔薄白，脉细弱，指纹淡红。其首选方剂是（ ）

- A. 右归丸
- B. 参苓白术散
- C. 左归丸
- D. 归脾汤
- E. 异功散

答案:D

解析:

标签:

精华

中等

记忆

97. 患儿，男，6 个月。夜惊多汗，烦躁，不安，面色不华，纳食不佳，枕秃，舌淡苔白，指纹淡。实验室检查:血钙磷乘积稍低，血碱性磷酸酶升高。诊断为佝偻病，其分期及证型是

- A. 活动早期，肾精亏损

- B. 活动早期，脾气虚弱
- C. 活动早期，肾虚骨弱
- D. 活动期，肾精亏损
- E. 活动期，肾虚骨弱

答案:B

解析:维生素 D 缺乏性佝偻病初期多见于 6 个月以内,尤其 3 个月以内的小婴儿,主要表现为神经兴奋性增高,如激惹、烦躁、睡眠不安、易惊、夜啼,常伴与室温季节无关的多汗,患儿因汗多而摇头擦枕导致枕秃。血生化改变轻微,血清 25-(OH)D₃ 下降,血钙正常或略下降,血磷降低,碱性磷酸酶正常或稍高,骨骼 X 线摄片可无异常,或见临时钙化带稍模糊。脾虚气弱证候为多汗夜惊,烦躁不安,面色不华,纳呆便溏,头颅软,凶门开大,毛发稀黄,枕秃常见,舌质淡红,苔薄白,指纹淡红或脉缓无力。

标签:

精华

中等

记忆

98. 患儿,4 岁。发热 1 天,全身出现红色斑丘疹,继有疱疹,头面躯干多见,舌红苔薄白,脉浮数。首选考虑的诊断是

- A. 风疹
- B. 猩红热
- C. 幼儿急疹
- D. 水痘
- E. 麻疹

答案:D

解析:发热 1 天出现皮疹,继而变为疱疹,故应首先考虑水痘。

标签:

精华

中等

记忆

99. 患儿,男,3 岁。麻疹见疹已 6 日,高热不退,咳嗽气急,鼻翼扇动,口渴烦躁,舌红苔黄,脉数。其证型是

- A. 顺证,见形期
- B. 顺证,初热期
- C. 逆证,麻毒闭肺
- D. 逆证,热毒攻喉
- E. 逆证,邪陷心肝

答案:C

解析:顺证麻疹为见疹 3 天后体温逐渐下降,咳嗽减少,故本病应为逆证逆

证麻毒闭肺的证候为高热不退，咳嗽气促，鼻翼扇动，口渴烦躁，疹点不多，或疹点密集色紫，或疹点早回，舌红，苔黄，脉数。逆证热毒攻喉以咽喉肿痛，声音嘶哑，咳声重浊，声如犬吠为特点。逆证邪陷心肝以高热，烦躁，神昏抽搐为特点。

标签：

应用

精华

中等

记忆

100. 患儿，3岁。脐周疼痛2天，时作时止，食欲不振，面色萎黄，见有白斑，睡眠不安，寐中磨牙，有便下蛔虫史。治疗应首选的方剂是

- A. 驱虫粉
- B. 追虫丸
- C. 化虫丸
- D. 乌梅丸
- E. 使君子散

答案：E

解析：考查小儿时期寄生虫病的治疗方剂。小儿时期常见的寄生虫病有三种：蛔虫病、蛲虫病和绦虫病。其中，以蛔虫病及蛲虫病多见。蛔虫病的临床特点：腹痛，位于脐周，疼痛不剧烈，时痛时止，有时便下蛔虫。食欲不振，面色萎黄，可见白斑，睡眠不安，磨牙等；蛲虫病的特点：肛周及会阴部奇痒，夜间尤甚，患儿常于半夜突然惊哭，烦躁不安，消瘦等。绦虫病的特点：大便中出现白色节片，腹痛，多为上腹部或全腹隐痛。蛔虫病采用驱蛔杀虫、调理脾胃法。方剂为使君子散。如出现蛔厥证则予以乌梅丸治疗。蛲虫病采用杀虫止痒法，方剂为追虫丸。绦虫病多采用槟榔与南瓜子和用驱虫。

标签：

精华

中等

记忆

A3/A4型选择题

(101-1~101-4题共用题干)

患者，男，15岁。寒战、高热3天，伴鼻出血和口腔溃疡，体格检查：全身可见散在出血点，浅表淋巴结不肿大，胸骨无压痛，肝脾未触及；血象，Hb为100g/L，WBC为 $1.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.15，淋巴细胞0.85，血小板 $12 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.001。

101. 该患者诊断最可能是

- A. 普通型再障
- B. 败血症合并DIC

- C. 急性粒细胞缺乏症
- D. 急性早幼粒细胞白血病
- E. 重型再障

答案:E

解析:重型再障的血象标准:①网织红细胞 <0.01 , 绝对值 $<15\times 10^9/L$; ②中性粒细胞绝对值 $<0.5\times 10^9/L$; ③血小板 $<20\times 10^9/L$ 。

标签:

精华

中等

记忆

102. 为明确诊断, 应进一步检查

- A. 骨髓细胞染色体检查
- B. ECT 骨成像
- C. 骨髓象检查
- D. 血培养致病菌+药敏试验
- E. 凝血功能检查

答案:C

解析:为明确诊断, 应进一步进行骨髓象检查。

标签:

精华

记忆

简单

103. 本患者治疗首选的是下列哪一项

- A. 抗生素+激素+肝素
- B. 雄性激素+抗生素+血小板输注
- C. 环孢菌素+抗生素+G-CSF
- D. 联合化疗+抗生素
- E. 自体骨髓移植

答案:C

解析:考虑该患者存在感染, 故其最佳治疗为环孢菌素+抗生素+G-CSF。

标签:

精华

记忆

简单

(104-1~104-3 题共用题干)

患者, 男, 45 岁。颈增粗 15 年, 近一年消瘦 10kg, 并有心悸。体检发现双侧甲状腺多个结节, 基础代谢率 31%, 2 小时内甲状腺摄碘 29%。

104. 下列哪一项最可能的诊断

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 继发性甲亢
- C. 原发性甲亢
- D. 结节性甲状腺肿
- E. 甲状腺肿瘤

答案:B

解析:根据患者颈增粗 15 年,体检发现双侧甲状腺多个结节考虑为结节性甲状腺肿,结合近一年消瘦 10kg,并有心悸,基础代谢率、甲状腺摄碘增高的甲亢表现,因此诊为继发性甲亢。

标签:

精华

记忆

简单

105. 下列哪一项最有效的治疗

- A. 长期抗甲状腺药物治疗
- B. 甲状腺素治疗
- C. 放射治疗
- D. 手术治疗
- E. 中医治疗

答案:D

解析:继发性甲亢最有效手段为手术治疗。

标签:

精华

记忆

简单

106. 甲状腺手术后 1 天,患者手足抽搐的处理方法应该是立刻

- A. 测定血清钙浓度
- B. 静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10~20ml
- C. 口服二氢速固醇
- D. 口服钙剂
- E. 行甲状旁腺移植术

答案:B

解析:术后抽搐为损伤甲状旁腺所致低钙性抽搐,处理应静脉补充钙剂。

标签:

精华

记忆

简单

B1 型选择题

(107-1~107-2 题共用备选答案)

- A. 增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛
- B. 无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛
- C. 心绞痛发作时，心电图某些导联 ST 段抬高
- D. 心尖部针刺样疼痛，发作时无心电图异常
- E. 心前区压迫疼痛 15 分钟以上，心电图有病理型 Q 波

107. 劳力型心绞痛的诊断标准是

答案:A

解析:劳力型心绞痛及稳定型心绞痛，是由于心肌负荷的增加引起的心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧而出现的，可以确定答案为 A；变异型心绞痛即不稳定型心绞痛，具有短暂 ST 段抬高的特征，故选项为 C。无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛为早期心衰的表现；心前区压迫疼痛 15 分钟以上，心电图有病理型 Q 波，为心肌梗死的表现特征。

标签:

精华

中等

记忆

108. 变异型心绞痛的诊断标准是

答案:C

解析:劳力型心绞痛及稳定型心绞痛，是由于心肌负荷的增加引起的心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧而出现的，可以确定答案为 A；变异型心绞痛即不稳定型心绞痛，具有短暂 ST 段抬高的特征，故选项为 C。无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛为早期心衰的表现；心前区压迫疼痛 15 分钟以上，心电图有病理型 Q 波，为心肌梗死的表现特征。

标签:

精华

中等

记忆

(109-1~109-2 题共用备选答案)

- A. 化肝煎
- B. 三仁汤
- C. 保和丸
- D. 失笑散
- E. 四君子汤

109. 治疗慢性胃炎脾胃虚弱证，应首选的方剂是

答案:E

解析:慢性胃炎脾胃虚弱证，治法为健脾益气，温中和胃，方选四君子汤；胃炎脾胃湿热证，治法为清利湿热，醒脾化浊，治疗应首选的方剂是三仁汤。

C 用于饮食伤胃，D 用于瘀血阻络。

标签：

应用

精华

简单

110. 治疗慢性胃炎脾胃湿热证，应首选的方剂是

答案：B

解析：慢性胃炎脾胃虚弱证，治法为健脾益气，温中和胃，方选四君子汤；胃炎脾胃湿热证，治法为清利湿热，醒脾化浊，治疗应首选的方剂是三仁汤。

C 用于饮食伤胃，D 用于瘀血阻络。

标签：

应用

精华

简单

(111-1~111-2 题共用备选答案)

A. 24 小时尿蛋白定量

B. 尿培养及菌落计数

C. 肾功能检查

D. 摄腹部平片

E. 静脉肾盂造影

111. 对肾病综合征最有诊断意义的检查是

答案：A

解析：肾病综合征的诊断标准是大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症、明显水肿。故 24 小时尿蛋白定量对肾病综合征的检查最有诊断意义。泌尿系感染的诊断是除膀胱刺激征外，应有尿细菌培养及菌落计数，其标准为尿含菌数 $>10^5$ 为阳性， $<10^4$ /ml 为污染， $10^4\sim 10^5$ ml 属可疑。

标签：

精华

记忆

简单

112. 对确诊泌尿系感染最有意义的检查是

答案：B

解析：肾病综合征的诊断标准是大量蛋白尿、低蛋白血症、高胆固醇血症、明显水肿。故 24 小时尿蛋白定量对肾病综合征的检查最有诊断意义。泌尿系感染的诊断是除膀胱刺激征外，应有尿细菌培养及菌落计数，其标准为尿含菌数 $>10^5$ 为阳性， $<10^4$ /ml 为污染， $10^4\sim 10^5$ ml 属可疑。

标签：

精华

记忆

简单

(113-1~113-4 题共用备选答案)

- A. 香砂六君子汤合当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤合无比山药丸
- D. 化虫丸合八珍汤
- E. 桃红四物汤

113. 缺铁性贫血脾肾阳虚证方药用

答案:C

解析:考查缺铁性贫血辨证论治: ①脾胃虚弱证: 治宜健脾和胃, 益气养血, 方药用香砂六君子汤合当归补血汤加减; ②心脾两虚证: 治宜益气补血, 养心安神, 方药用归脾汤或八珍汤加减; ③脾肾阳虚证: 治宜温补脾肾, 方药用八珍汤合无比山药丸加减; ④虫积证: 治宜杀虫消积, 补益气血。方药用化虫丸合八珍汤加减。

标签:

应用

精华

简单

114. 缺铁性贫血脾胃虚弱证方药用

答案:A

解析:考查缺铁性贫血辨证论治: ①脾胃虚弱证: 治宜健脾和胃, 益气养血, 方药用香砂六君子汤合当归补血汤加减; ②心脾两虚证: 治宜益气补血, 养心安神, 方药用归脾汤或八珍汤加减; ③脾肾阳虚证: 治宜温补脾肾, 方药用八珍汤合无比山药丸加减; ④虫积证: 治宜杀虫消积, 补益气血。方药用化虫丸合八珍汤加减。

标签:

应用

精华

简单

(115-1~115-2 题共用备选答案)

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓
- C. 短暂性脑缺血性发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

115. 患者长期卧床, 突发意识障碍, 偏瘫, 偏身感觉障碍。应首先考虑的是

答案:A

解析:患者长期卧床,易致静脉血栓形成,血栓脱落随血循环进入脑动脉,发生脑栓塞,出现突发意识障碍,偏瘫,偏身感觉障碍。

标签:

精华

记忆

简单

116. 患者起病急,头痛重,伴有呕吐,意识障碍,克匿格征阳性。应首先考虑的是

答案:E

解析:患者突然发病,头痛,意识障碍,考虑急性出血性脑血管病。未提示一侧肢体活动障碍,巴宾斯基征阳性,脑出血可能性不大。头痛重,伴有呕吐,意识障碍,兼有克尼格征阳性、脑膜刺激征,应首先考虑蛛网膜下腔出血。

标签:

精华

记忆

简单

(117-1~117-2 题共用备选答案)

A. 牛蒡解肌汤

B. 龙胆泻肝汤

C. 仙方活命饮

D. 银翘散

E. 五神汤合萆薢渗湿汤

117. 左下肢丹毒患者,下肢红肿灼热,口渴少饮,舌苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

答案:E

解析:丹毒常见的中医证型有风热化火证、肝胆湿热证、湿热化火、胎火胎毒症和毒邪内攻证。患者舌苔黄腻,脉滑数考虑为丹毒的湿热化火证型,火毒夹湿,治宜利湿清热解毒,故选 E;颈痈患者宜散风清热,化痰消肿,选 A。

标签:

应用

精华

简单

118. 颈痈患者,高热,疼痛加剧,口渴,舌苔黄,脉弦数。治疗应首选

答案:A

解析:丹毒常见的中医证型有风热化火证、肝胆湿热证、湿热化火、胎火胎毒症和毒邪内攻证。患者舌苔黄腻,脉滑数考虑为丹毒的湿热化火证型,火

毒夹湿，治宜利湿清热解毒，故选 E；颈痈患者宜散风清热，化痰消肿，选 A。

标签：

应用

精华

简单

（119-1~119-2 题共用备选答案）

- A. 驱蛔承气汤
- B. 桃仁承气汤
- C. 甘遂通结汤
- D. 复方大承气汤
- E. 温脾汤

119. 对于肠梗阻气滞血瘀证者，宜用

答案：B

解析：肠梗阻气滞血瘀证。①证候：腹痛阵作，胀满拒按，恶心呕吐，无排气排便；舌质淡红，苔薄白，脉弦或涩；②治法：行气活血，通腑攻下；③方药：桃仁承气汤。

标签：

应用

精华

简单

120. 对于肠梗阻肠腑寒凝证者，宜用

答案：E

解析：肠腑寒凝证。①证候：起病急骤，腹痛剧烈，遇冷加重，得热稍减，腹部胀满，恶心呕吐，无排气排便；脘腹怕冷，四肢畏寒；舌质淡红，苔薄白，脉弦紧；②治法：温中散寒，通里攻下；③方药：温脾汤。

标签：

应用

精华

简单

（121-1~121-4 题共用备选答案）

- A. 疝内容物有动脉性血循环障碍
- B. 疝内容物被病环卡住不能还纳，但无动脉性循环障碍
- C. 疝内容物易回纳入腹腔
- D. 疝内容物不能完全回纳入腹腔
- E. 疝内容为部分肠壁

121. 绞窄性疝为

答案：A

解析:嵌顿如不能及时解除,肠管及其系膜受压情况不断加重而使动脉血流减少,最后导致完全阻断,即为绞窄性疝;凡疝内容物很容易回纳入腹腔者,称为易复性疝;疝门较小而腹内压突然增高时,疝内容物强行挤入疝囊,后因囊颈的弹性回缩,使疝内容物卡住不能回纳,这种情况称为嵌顿性疝;疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔者,称为难复性疝。

标签:

精华

记忆

简单

122. 易复性疝为

答案:C

解析:嵌顿如不能及时解除,肠管及其系膜受压情况不断加重而使动脉血流减少,最后导致完全阻断,即为绞窄性疝;凡疝内容物很容易回纳入腹腔者,称为易复性疝;疝门较小而腹内压突然增高时,疝内容物强行挤入疝囊,后因囊颈的弹性回缩,使疝内容物卡住不能回纳,这种情况称为嵌顿性疝;疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔者,称为难复性疝。

标签:

精华

记忆

简单

123. 嵌顿性疝为

答案:B

解析:嵌顿如不能及时解除,肠管及其系膜受压情况不断加重而使动脉血流减少,最后导致完全阻断,即为绞窄性疝;凡疝内容物很容易回纳入腹腔者,称为易复性疝;疝门较小而腹内压突然增高时,疝内容物强行挤入疝囊,后因囊颈的弹性回缩,使疝内容物卡住不能回纳,这种情况称为嵌顿性疝;疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔者,称为难复性疝。

标签:

精华

记忆

简单

(124-1~124-2 题共用备选答案)

A. 内痔

B. 外痔

C. 血栓痔

D. 肛裂

E. 直肠肛管周围脓肿

124. 肛门缘周围有黯紫色椭圆形肿块突起,表面水肿的病征为

答案:C

解析:血栓性外痔可见肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起,表面水肿。结缔组织性外痔可见肛门缘有不规则赘皮突起。

标签:

精华

记忆

简单

125. 肛门缘有不规则赘皮突起的病症为

答案:B

解析:血栓性外痔可见肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起,表面水肿。结缔组织性外痔可见肛门缘有不规则赘皮突起。

标签:

精华

记忆

简单

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 阳和汤
- B. 桃红四物汤
- C. 四妙勇安汤
- D. 八珍汤合左归丸
- E. 十全大补汤

126. 治疗血管闭塞性脉管炎气血两虚证应首选()

答案:E

解析:略

标签:

简单

127. 治疗动脉硬化性闭塞症脾肾阳虚证应首选()

答案:D

解析:略

标签:

简单

(128-1~128-2 题共用备选答案)

- A. 肝肾阴虚型
- B. 脾肾阳虚型
- C. 湿热下注型
- D. 湿虫滋生型
- E. 津亏血少型

128. 阴部干涩,灼热瘙痒,五心烦热,舌红苔少,脉细数。其中医证型是

()

答案:A

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

129. 阴部瘙痒, 带下量多, 色黄如脓, 稠黏臭秽, 舌苔黄腻, 脉弦数。其中医证型是()

答案:C

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(130-1~130-2 题共用备选答案)

A. 崩漏

B. 经期延长

C. 月经后期

D. 月经先期, 月经过多

E. 月经先后无定期

130. 患者月经周期 3~7 天/20~40 天, 其诊断是

答案:E

解析: 月经周期紊乱, 提前或延后 7 天以上, 连续出现三月经周期以上, 但月经的经期和经量基本正常, 即可诊断为月经先后无定期。

标签:

精华

中等

记忆

131. 患者月经周期 4~6 天/15~20 天, 其诊断是

答案:D

解析: 月经周期缩短, 一般少于 21 天而连续二次以上者, 即可诊为月经先期。经期基本正常者, 可伴有月经过多。

标签:

精华

记忆

简单

(132-1~132-2 题共用备选答案)

- A. 产后三冲
- B. 产后三病
- C. 产后三禁
- D. 产后三急
- E. 产后三审

132. 古人将产后发生呕吐、盗汗、泄泻的病证称作

答案:D

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

133. 古人将产后发生“痉”“郁冒”“大便难”的病证称作

答案:B

解析:历代医家十分重视对产后病的研究,早在东汉时期就提出了“新产三病”,即“痉”“郁冒”“大便难”;唐代以后又提出产后败血上冲有“冲心”“冲肺”“冲胃”三种危重症;清代把产后发生呕吐、盗汗、泄泻三种伤津耗液的病证称为“产后三急”。

标签:

精华

中等

记忆

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 大补元煎
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤
- D. 举元煎
- E. 补中益气汤

134. 治疗气虚型子宫脱垂,应首选的方剂是()

答案:E

解析:略

标签:

应用

精华

中等

记忆

135. 治疗肾虚型子宫脱垂,应首选的方剂是()

答案:A

解析:略

标签:

应用

精华

中等

记忆

(136-1~136-3 题共用备选答案)

A. 大黄牡丹汤

B. 膈下逐瘀汤

C. 开郁二陈汤

D. 清宫消癥汤

E. 少腹逐瘀汤

136. 治疗子宫肌瘤湿热瘀阻证, 应首选

答案:A

解析:

标签:

精华

中等

记忆

137. 治疗子宫肌瘤痰湿瘀阻证, 应首选

答案:C

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(138-1~138-2 题共用备选答案)

A. 失笑散

B. 桃红四物汤

C. 膈下逐瘀汤

D. 少腹逐瘀汤

E. 血府逐瘀汤

138. 治疗痛经寒湿凝滞型, 首选的是

答案:D

解析:痛经寒凝血瘀证。①证候:经前或经期小腹冷痛拒按, 得热痛减; 月经或见推后, 量少, 经色暗而有瘀块; 面色青白, 肢冷畏寒; 舌暗苔白, 脉沉紧; ②治法:温经散寒, 化瘀止痛; ③方药:少腹逐瘀汤或温经散寒汤。

标签:

精华
中等
记忆

(139-1~139-2 题共用备选答案)

- A. 失笑散
- B. 桃红四物汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 血府逐瘀汤

139. 治疗不孕血瘀型，首选的是

答案:D

解析:不孕瘀滞胞宫证。①证候:婚久不孕,月经后期或正常,量或多或少,色黯,有血块,经行腹痛,平时小腹及腰骶疼痛,性交痛,舌质紫黯或边有瘀点,苔薄白,脉弦或细弦涩;②治法:逐瘀荡胞,调经助孕;③方药:少腹逐瘀汤(《医林改错》)或膈下逐瘀汤。

标签:

精华
中等
记忆

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 出生后 2 周
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 6~7 天
- D. 出生后 24 小时内
- E. 出生后 4~5 天

140. 生理性胎黄,黄疸出现的时间是()

答案:B

解析:略

标签:

精华
记忆
简单

141. 病理性胎黄,黄疸出现的时间是()

答案:D

解析:略

标签:

精华
记忆

简单

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 知柏地黄丸
- B. 参苓白术散
- C. 泻心导赤散
- D. 黄连解毒汤
- E. 清热泻脾散

142. 治疗鹅口疮心脾积热证，首选的是

答案:E

解析:鹅口疮心脾积热证，应首选清热泻脾散。

标签:

精华

中等

记忆

143. 治疗鹅口疮虚火上炎证，首选的是

答案:A

解析:鹅口疮虚火上炎证，应首选知柏地黄丸。

标签:

精华

中等

记忆

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 五味消毒饮合五皮饮
- B. 参苓白术散合玉屏风散
- C. 麻黄连翘赤小豆汤
- D. 温胆汤合附子泻心汤
- E. 龙胆泻肝汤

144. 急性肾炎变证水毒内闭证应首选的方剂是()

答案:D

解析:略。

标签:

精华

中等

记忆

145. 急性肾炎变证邪陷心肝证应首选的方剂是()

答案:E

解析:略。

标签:

精华
中等
记忆

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 健运脾胃，益气养血
- B. 补脾养心，益气养血
- C. 扶正固本，温补脾胃
- D. 温补脾肾，益精生血
- E. 滋养肝肾，益精生血

146. 营养性缺铁性贫血脾胃虚弱证的治法是()

答案:A

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

147. 营养性缺铁性贫血肝肾阴虚证的治法是()

答案:E

解析:略

标签:

精华

中等

记忆

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 透疹凉解汤
- D. 清胃解毒汤
- E. 清解透表汤

148. 治疗风疹邪郁肺卫证，首选

答案:B

解析:风疹邪郁肺卫证。①证候:发热恶风,喷嚏流涕,轻微咳嗽,胃纳欠佳,精神倦怠,疹色淡红,稀疏细小,分布均匀,微有痒感,耳后、枕后及颈部淋巴结肿大,舌尖红,苔薄黄,脉浮数;②治法:疏风清热,解表透疹;③方药:银翘散加减。

标签:

精华

中等

记忆

149. 治疗水痘风热轻证，首选

答案:B

解析:水痘邪郁肺卫证(风热轻证)。①证候:发热轻微,或无热,鼻塞流涕,喷嚏,咳嗽,起病后1~2天出皮疹,疹色红润,疱浆清亮,根盘红晕,皮疹瘙痒,分布稀疏,多见于躯干、颜面及头皮,舌质淡,苔薄白,脉浮数;

②治法:疏风清热,解毒利湿;③方药:银翘散加减。

标签:

中等

记忆



金英杰中医执业医师考平台