

真题

1.可摘局部义齿铸造金属基托的平均厚度为 ( ) (原题)

- A . 0.8mm
- B . 2.0mm
- C . 0.5mm
- D . 1.5mm
- E . 1.0mm

答案: C

2.儿童行舌系带矫正术时, 最好的年龄是

- A.4~6 个月
- B.7~12 个月
- C.1~2 岁
- D.3~4 岁
- E.4~5 岁

【答案】 C

【解析】 儿童行舌系带矫正术应在学说话之前进行, 在 1~2 岁期间最佳, 故 C 正确。

3 患儿男性, 1 岁。先天性双侧完全性唇裂伴双侧完全性腭裂, 现拟行唇裂修复术, 目前常用的方法是 ( )

- A. 前唇加长法修复术
- B.前唇原长法修复术
- C. 下唇阿贝氏瓣修复术
- D. 双侧鼻唇沟瓣修复术
- E.唇腭裂修复术

答案: B

4.能够真实地反映牙槽嵴顶骨吸收程度, 适用于早期牙周炎的影像学检查方法是

- A.根尖片
- B.牙合翼片
- C.曲面体层片
- D.片
- E.根尖片数字减影技术

【答案】 B

【解析】 牙合翼片可以显示上、下颌多个牙的牙冠部影像, 还可较清晰地显示牙槽嵴顶, 用于观察牙槽嵴顶有无骨质破坏

5.拔除上颌第一磨牙时需要麻醉的神经为 (还问了下 8)

- A.上牙槽中神经
- B.上牙槽中神经、上牙槽后神经
- C.上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经
- D.上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经

E. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经、腭后神经

【答案】 C.

6. 附着龈宽度是指()

- A. 龈缘到釉牙骨质界的距离
- B. 袋底到釉牙骨质界的距离
- C. 龈缘到袋底的距离
- D. 膜龈联合到袋底的距离
- E. 龈沟底到牙槽骨嵴顶的距离延伸

A. 髁突经咽侧位片

B. 曲面体层片

C. 许勒位片

D. 头颅侧位

E. 经咽侧位片

1. 观察颞下颌关节间隙变化, 应选择的是

2. 观察上颌骨, 颧骨骨折时, 应选择的是

## 命中题

1. Garre 骨髓炎又称

A. 慢性化脓性骨髓炎

B. 慢性局灶性骨髓炎

C. 致密骨炎

D. 骨化性骨膜炎

E. 结核性骨髓炎

F. 参考答案: D

参考解析: 颌骨骨髓炎可分为以下类型: ①急性化脓性骨髓炎, 大多来自于牙源性感染; ②慢性化脓性骨髓炎, 可由于治疗不当或毒力弱的细菌感染引起; ③慢性骨髓炎伴增生性骨膜炎, 又称为 Garre 骨髓炎或 Garre 慢性非化脓性硬化性骨炎或骨化性骨膜炎, 是一种伴明显骨膜炎症反应的慢性骨髓炎亚型; ④慢性局灶性硬化性骨髓炎, 又称为致密性骨炎, 是轻度感染导致骨的局灶性反应; ⑤结核性骨髓炎, 常为身体其他部位结核的继发病; ⑥放射性骨髓炎, 又称为放射性骨坏死, 是头颈部恶性肿瘤放射治疗的严重并发症。因此, 正确答案为 D。

2 前伸髁导斜度为 30°时，侧方髁导斜度应为 A . 5°B . 10°C . 15°D . 16°E . 24°

前伸髁导斜度为 30°时，侧方髁导斜度应为

- A . 5°
- B . 10°
- C . 15°
- D . 16°
- E . 24°

3.颞下颌关节内强直的病因中哪一项是错误的

- A.化脓性中耳炎
- B.颞下颌关节紊乱
- C.颈部对冲性损伤
- D.外伤直接损伤颞下颌关节
- E.血源性化脓性关节炎和类风湿性关节炎

【答案】 B

4 关于预防亚硝酸盐中毒的措施不正确的是()

- A. 少吃或不吃隔夜剩饭菜
- B. 腌制时间过短或食盐用量不足 10%时，亚硝酸含量会减少
- C. 腌制食品在腌制 15 天后吃比较适宜
- D. 少吃火锅

5 不属于牙源性角化囊肿多房性的 X 线表现是

- A . 囊腔大小相差悬殊
- B . 囊腔大小相近似
- C . 常沿颌骨长轴生长**
- D . 牙根可有吸收
- E . 颌骨可向舌侧膨胀

原题问常沿颌骨长轴生长的是

6 以下哪项不是静脉曲张的临床特点

- A.体位试验阳性
- B.表浅肿瘤呈蓝色或紫色
- C.有时可扪到静脉石
- D.扣之柔软，有压缩性
- E.触诊有震颤感，听诊有吹风样杂音

【答案】 E

【解析】 E 是动静脉畸形的特点。

7.葡萄酒斑状血管瘤属于

- A.微静脉畸形
- B.海绵状血管瘤
- C.混合型血管瘤
- D.蔓状血管瘤
- E.杨梅状血管瘤

【答案】 A

8.单侧颞下颌关节强直患者可出现

- A.颞点偏向健侧
- B.颞点偏向患侧
- C.患侧面部狭长
- D.健侧面部丰满
- E.下前牙反

【答案】 B

A.肯氏一类，第一亚类

B.肯氏二类，第三亚类

C.肯氏三类，第二亚类

D.肯氏四类

E.以上均不是

196.余留牙为 743223567，按照肯氏分类法应属

【答案】 C

197.缺失牙为 87654125678，按照肯氏分类法应属

【答案】 A

198.余留牙为 8765445678，按照肯氏分类法应属

【答案】 D

199.缺失牙为 876521256，按照肯氏分类法应属

【答案】 B

牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 6个月
- E. 1~3个月

