

2022年中西医医师资格助理押题

第一单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 中医学关于"证"的概念是
A.对阴阳气血失调临床表现的概括
B.一个完整的异常生命过程
C.对疾病表现症状的综合概括
D.对疾病症状与体征的分析概括
E.对疾病发展过程中某一阶段的病理概括
- "无阳则阴无以生,无阴则阳无以化"是说明
A.阴阳的相互对立
B.阴阳互根互用
C.阴阳的相互消长
D.阴阳相互转化
E.阴阳的相互平衡
- 《素问·脉要精微论》所说"四变之动,脉与之上下",主要反映了
A.人体自身的完整性
B.人与自然环境的统一性
C.人与社会环境的统一性
D.形神一体观
E.辨证论治
- 五脏中与血液生成无关的脏是
A.肾
B.肝
C.肺
D.脾
E.心
- 肝促进男子排精、女子排卵和月经,体现了肝
A.主疏泄
B.主升发
C.主藏血
D.为刚脏
E.藏魂
- "乙癸同源"应归属于
A.心与肺
B.心与肾
C.肝与肾
D.肝与脾
E.肺与脾
- 肺与大肠的表里关系主要体现在
A.肺气宣发布津于大肠
B.肺气肃降输送水液于大肠
C.肺气肃降以助大肠之传导
D.宗气充足以助大肠之传导
E.肺主治节,调节大肠的功能
- 可用"离、入、出、合"来概括其循行特点的是
A.十五别络
B.十二经别
C.十二经筋
D.十二经脉
E.奇经八脉
- 下列哪项是火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点
A.耗气
B.上炎
C.伤津
D.动血
E.生风
- 《素问·生气通天论说》:"冬伤于寒,春必温病."此说的发病类型是属于
A.感邪即发
B.徐发
C.伏而后发
D.复发
E.继发
- "塞因塞用"的治法,适用于治疗
A.表实时虚证
B.虚实夹杂证
C.真虚假实证
D.真实假虚证
E.表虚里实证
- 肝藏血与脾统血的共同生理功能是
A.调节血量

- B. 统摄血液
C. 贮藏血液
D. 防止出血
E. 化生血液
13. "中正之官"指的是
A. 胆
B. 小肠
C. 胃
D. 大肠
E. 膀胱
14. 下列关于五脏外合五体的叙述, 错误的是
A. 心合脉
B. 肝合爪
C. 脾合肉
D. 肺合皮
E. 肾合骨
15. 下列哪项对诊断心肾不交证最有意义
A. 心悸怔忡, 肢肿尿少
B. 心烦失眠, 腰酸盗汗
C. 心悸失眠, 头晕目眩
D. 嗜睡神疲, 心悸肢肿
E. 眩晕耳鸣, 腰膝酸软
16. 痢病的病机是
A. 气郁化火, 痰火扰心
B. 阳明热盛, 扰乱神明
C. 肝风挟痰, 蒙蔽清窍
D. 痰气郁结, 蒙蔽心神
E. 温病邪热入于心包
17. 咽喉色鲜红娇嫩, 肿痛不甚者的原因为
A. 肺胃积热
B. 痰湿停滞
C. 寒凝咽喉
D. 阴虚火旺
E. 胃中有热
18. 大便夹有不消化的食物, 酸腐臭秽者, 多因
A. 大肠湿热
B. 寒湿内盛
C. 伤食积滞
D. 脾胃虚弱
E. 肝胃不和
19. 鹤膝风的病因病机为
A. 风湿郁久化热
B. 寒湿久留, 气血亏虚
C. 先天不足, 或后天失养
D. 经络痹阻, 肢体失养
E. 寒湿内侵, 络脉血瘀
20. 表虚证的脉象主见
A. 洪数
B. 细弱
C. 弦紧
D. 浮缓
E. 浮数
21. 不出现滑苔的病证是
A. 脚阳不振
B. 痰饮内生
C. 蓄水证
D. 外感寒湿
E. 血瘀气滞
22. 病人热入营分, 气分有湿, 其舌象是
A. 舌红有裂纹, 苔黄燥
B. 舌红, 苔黄腻
C. 舌红绛, 苔白滑腻
D. 舌青紫, 少苔
E. 舌红绛, 苔黄白
23. 身热初按热甚, 久按热反轻者多属
A. 热在表
B. 热在里
C. 虚阳外越
D. 阴虚证
E. 热在半表半里
24. 下列哪项不是寒证与热证的鉴别要点
A. 喜温与喜凉
B. 便秘与便溏
C. 口渴与不渴
D. 头痛与不痛
E. 苔黄与苔白
25. 既能解毒消痈, 又能凉血止血的药物是
A. 侧柏叶、茜草
B. 艾叶、炮姜
C. 三七、蒲黄
D. 紫草、赤芍
E. 大蓟、小蓟
26. 平性药是指
A. 无毒之药
B. 寒热之性不显著, 药性平和的药物
C. 毒性不显著的药物
D. 治疗作用广泛的药物
E. 以上都不是
27. 与京大戟相反的药物是
A. 藜芦

- B. 昆布
- C. 大枣
- D. 甘草
- E. 细辛

28. 既能行气安胎,又能发表散寒,解鱼蟹毒的药物是

- A. 砂仁
- B. 黄芩
- C. 紫苏
- D. 白术
- E. 白豆蔻

29. 热闭、寒闭神昏,均常选用的药物是

- A. 紫苏
- B. 麝香
- C. 牛黄
- D. 羚羊角
- E. 苏合香

30. 巴豆内服的用量是

- A. 0.1~0.3g
- B. 0.5~1g
- C. 1.5~3g
- D. 3~5g
- E. 5~10g

31. 功能补肺气、补肺阴、补脾气、补肾固涩的药物是

- A. 太子参
- B. 西洋参
- C. 黄精
- D. 山药
- E. 五味子

32. 风热咳嗽、痰热咳嗽均为适宜的药组是

- A. 前胡、浙贝母
- B. 瓜蒌、川贝母
- C. 竹茹、桔梗
- D. 白前、紫苏子
- E. 旋覆花、竹沥

33. 善治血淋,尿血的药物是

- A. 车前子
- B. 泽泻
- C. 石韦
- D. 草薢
- E. 木通

34. 为"血中气药"、能"上行头目,下调经水"的药物是

- A. 川芎
- B. 延胡索
- C. 姜黄
- D. 莪术

E. 郁金

35. 三仁汤中的"三仁"是指

- A. 杏仁、桃仁、白蔻仁
- B. 杏仁、柏子仁、冬瓜仁
- C. 杏仁、薏苡仁、白蔻仁
- D. 桃仁、郁李仁、白蔻仁
- E. 大麻仁、桃仁、杏仁

36. 组成中不含人参、甘草、大枣的方剂是

- A. 半夏泻心汤
- B. 理中丸
- C. 小柴胡汤
- D. 炙甘草汤
- E. 旋覆代赭汤

37. 组成中含有穿山甲、皂角刺的方剂是

- A. 复元活血汤
- B. 阳和汤
- C. 四妙勇安汤
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 仙方活命饮

38. 旋覆代赭汤中用量最大的药是

- A. 旋覆花
- B. 生姜
- C. 代赭石
- D. 半夏
- E. 人参

39. 下列不属于完带汤的组成是

- A. 白术、苍术
- B. 柴胡、陈皮
- C. 人参、甘草
- D. 白芍、柴胡
- E. 厚朴、枳壳

40. 温脾汤的功效是

- A. 温脾暖胃,攻逐冷积
- B. 温肾暖脾,攻逐冷积
- C. 温补脾肾,攻逐冷积
- D. 温补脾阳,荡涤胃肠
- E. 温补脾阳,攻逐冷积

41. 玉液汤的组成中不含有

- A. 玉竹
- B. 山药
- C. 鸡内金
- D. 天花粉
- E. 葛根

42. 温经汤的功效是

- A. 活血化瘀,散结止痛

- B. 养血化瘀, 温经止痛
 C. 温经散寒, 养血祛瘀
 D. 活血化瘀, 缓消瘤块
 E. 温经止痛, 破血消癥
43. 小建中汤中配伍芍药的意义是
 A. 温中补虚, 和里缓急
 B. 温阳化气, 祛寒温中
 C. 滋养营阴, 缓急止痛
 D. 益阴养血, 柔肝缓急
 E. 气血双补, 活血通脉
44. 不属于肝细胞性黄疸的特点是
 A. 尿胆红素阳性
 B. 尿胆原常增多
 C. 血清结合型、非结合型胆红素均增高
 D. 血清仅结合型胆红素增高
 E. 大便颜色正常或变深
45. 下列描述为右上肺中心型肺癌的典型X线的是
 A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
 B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
 C. 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行"S"状的下缘
 D. 肺内有多发的薄壁空洞
 E. 肺内有多发的肿块影
46. CK-MB在急性心肌梗死(AMI) 发生后多久开始升高
 A. 4~10小时
 B. 12~36小时
 C. 3~8小时
 D. 9~30小时
 E. 3~6小时
47. 落日现象可见于
 A. 小颅
 B. 尖颅
 C. 方颅
 D. 巨颅
 E. 长颅
48. 下列关于左心室肥大的心电图的说法, 错误的是
 A. Rv_5 或 $Rv_6 > 2.5mV$
 B. Rv_5 或 $Rv_6 + Sv_1 > 4.0 mV$ (男)
 C. 心电图轴左偏
 D. 以R波为主的导联中, S-T段下移 $0.05 mV$
 E. T波高尖
49. 下列选项中, 属于呼气性呼吸困难的是
 A. 急性喉炎
 B. 支气管哮喘
 C. 气管异物
 D. 支气管肿瘤
 E. 大面积肺不张
50. 病侧呼吸动度减弱伴叩诊为鼓音、呼吸音消失者, 见于
 A. 肺实变
 B. 肺气肿
 C. 肺不张
 D. 气胸
 E. 胸膜增厚
51. 对于过敏性鼻炎患者, 增高的是
 A. IgG
 B. IgA
 C. IgM
 D. IgD
 E. IgE
52. 存在首过效应的是哪种给药途径
 A. 直肠给药
 B. 肌内注射
 C. 舌下给药
 D. 静脉注射
 E. 口服
53. 毛果芸香碱的叙述, 不正确的是
 A. 常用制剂为1%滴眼液
 B. 可使眼内压升高
 C. 可用于治疗青光眼
 D. 能直接激动M受体, 产生M样作用
 E. 可使汗腺和唾液腺的分泌明显增加
54. 治疗支气管哮喘的拟肾上腺素药物是
 A. 去甲肾上腺素
 B. 异丙肾上腺素
 C. 多巴胺
 D. 甲氧明
 E. 氨茶碱
55. 卡马西平即可以用于治疗癫痫, 还可以治疗
 A. 心律失常
 B. 心绞痛
 C. 失眠
 D. 外周神经痛
 E. 帕金森病
56. 抗结核病的合理化疗原则是
 A. 早期、大剂量、联合、规律及全程用药
 B. 早期、适量、联合、规律及全程用药
 C. 早期、小剂量、联合、全程用药
 D. 早期、适量、联合、全程用药
 E. 早期、大剂量、联合、全程用药

57. 磺胺类药物作用机制是与细菌竞争

- A. 叶酸还原酶
- B. 四氢叶酸还原酶
- C. 二氢叶酸还原酶
- D. 一碳单位转移酶
- E. 二氢叶酸合成酶

58. 下列关于对于双胍类药物的描述, 错误的是

- A. 增加胰岛素与其受体的结合
- B. 尤适用于肥胖性、饮食控制无效的糖尿病
- C. 用于轻症糖尿病
- D. 加速葡萄糖在肠道的吸收
- E. 不依赖于胰岛 细胞

59. 下列发疹性传染病按皮疹出现的先后次序排列, 依次为

- A. 猩红热、天花、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- B. 猩红热、风疹、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- C. 天花、水痘、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- D. 水痘、猩红热、天花、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- E. 水痘、天花、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒

答案: D

解析: 水痘多于病程第1日, 猩红热于第2日, 天花于第3日, 麻疹于第4日, 斑疹伤寒于第5天, 伤寒于第6日出疹.

60. 甲型肝炎和戊型肝炎共有的主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 母婴传播
- C. 血液传播
- D. 体液传播
- E. 性传播

61. 病原体侵入人体后, 引起机体发生免疫应答, 同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应, 导致组织损伤, 引起病理改变与临床表现, 此种情况是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏感染
- E. 机会性感染

62. 流行性出血热的"三痛"是指

- A. 头痛、腰痛和身痛
- B. 头痛、腰痛和关节痛
- C. 头痛、腰痛和腓肠肌痛
- D. 头痛、腰痛和眼眶痛
- E. 头痛、腰痛和腹痛

63. 关于志贺菌属, 下列哪项说法是正确的

- A. 为革兰阴性杆菌, 有鞭毛
- B. 对化学消毒剂不敏感
- C. 在外界生存时间甚短期
- D. 对理化因素抵抗力强
- E. 产生外毒素和内毒素

64. 确诊伤寒的依据是

- A. 发热中毒症状, 周围白细胞减低
- B. 大便培养阳性
- C. 血培养阳性
- D. 肥达反应"H" "O" 滴度增高
- E. 嗜酸性粒细胞减少

65. 艾滋病患者在艾滋病期常见的呼吸系统并发症为

- A. 巨细胞病毒引起的病毒性肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 卡氏肺孢子菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 念珠菌引起的肺真菌病

66. 下列关于人禽流感病理改变的叙述, 错误的是

- A. 肺部病变最明显
- B. 肺泡内无透明膜形成
- C. 少数患者有广泛肝小叶中心坏死
- D. 少数患者有急性肾小管坏死
- E. 少数患者有淋巴细胞功能衰竭

67. 足阳明经和足太阴经交接于

- A. 足大指内端
- B. 足大趾外侧
- C. 足小趾内侧
- D. 足小趾外侧
- E. 足中指内侧

68. 位于下肢外侧中线的经脉是

- A. 胆经
- B. 脾经
- C. 胃经
- D. 膀胱经
- E. 三焦经

69. 隔盐灸的作用是

- A. 清热、解毒、消肿
- B. 回阳、救逆、固脱
- C. 解表、散寒、温中
- D. 防病、保健、益寿
- E. 温肾、壮阳、通脉

70. 中风闭证针刺水沟的刺法

- A. 斜向上刺
- B. 斜向下刺
- C. 平刺

- D. 提插捻转
E. 平补平泻
71. 患者, 长久以来低头工作, 项背部强痛, 低头加重, 颈项后枕部疼痛, 颈部僵紧不舒, 针刺选用
- A. 督脉、太阳经
B. 督脉、少阳经
C. 任脉、太阳经
D. 督脉、厥阴经
E. 督脉、太阴经
72. 痛痹除选用阿是穴和局部经穴外, 主要配下列哪组经穴
- A. 肾俞、关元
B. 大椎、曲池
C. 肝俞、太冲
D. 膈俞、血海
E. 阴陵泉、足三里
73. 下列属于现代医学目的的是
- A. 重治疗轻预防
B. 提高生命质量
C. 过度追求技术发展
D. 克服疾病
E. 避免死亡
74. 下列不是辅助检查应遵循的道德要求的是
- A. 目的明确, 诊治需要.
B. 知情同意, 尽职尽责.
C. 综合分析, 切忌片面.
D. 密切联系, 加强协作.
E. 全面系统, 认真细致.

75. 下列不属于医德品质内容的是
- A. 仁爱
B. 诚挚
C. 严谨
D. 公正
E. 专业
76. 下述规范性文件中属于卫生行政法规的是
- A. 《药品管理法》
B. 《执业医师法》
C. 《传染病防治法》
D. 《红十字会法》
E. 《医疗机构管理条例》
77. 《中华人民共和国药品管理法》规定: 执业医师收受药品经营企业给予财物或其他不正当利益的违法行为, 其中情节严重的, 由卫生行政部门给予的行政处罚是
- A. 警告、降职
B. 处分、没收违法所得
C. 吊销执业医师证书
D. 吊销医师资格证书
E. 记过、没收违法所得
78. 《中华人民共和国传染病防治法》的立法目的是为了预防、控制和消除传染病的发生与流行
- A. 保证社会发展
B. 保障人体健康
C. 保证正常的社会秩序
D. 保障人体健康和公共卫生
E. 保障公共卫生秩序

A2 型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

79. 患者, 女, 72岁. 嗜睡, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 纳差, 大便夹有不消化食物, 夜尿频多, 舌淡嫩苔白, 脉沉迟无力, 临床诊断最可能是
- A. 脾阳虚证
B. 心阳虚证
C. 肾阳虚证
D. 脾肾阳虚证
E. 湿困脾证
80. 患者, 男, 43岁. 入冬后, 肢体关节游走窜痛, 沉重. 苔薄白, 脉弦缓, 临床诊断最可能是
- A. 表湿证
B. 里湿证
C. 风湿证
D. 寒湿证
E. 湿热证
81. 患者, 女, 29岁. 外出游泳后, 发热, 腰痛, 尿频尿急, 尿道灼痛, 小便黄少, 舌红苔黄腻, 脉濡数. 临床诊断最可能是
- A. 小肠实热证
B. 膀胱湿热证
C. 热结膀胱证
D. 湿热下注证
E. 热入营血证
82. 患者, 男, 39岁, 小便短数, 灼热刺痛. 尿色黄赤,

舌苔黄腻,脉数.治疗应选用

- A.大蓟
- B.地榆
- C.槐花
- D.白茅根
- E.侧柏叶

83.患者,女,32岁.喜凉,喝冷饮,经期小腹冷痛,经色黯,有血块.伴面色淡白,四肢发冷.舌质淡白,脉沉迟.治疗应选用

- A.肉桂
- B.川芎
- C.牡丹皮
- D.川芎
- E.青皮

84.患儿,男,5岁.高热,神昏,手足不时痉挛抽搐,宜用

- A.青黛
- B.夏枯草
- C.栀子
- D.大青叶
- E.黄连

85.患者,男,55岁.长期腰膝酸软冷痛,小便清长,近几日腹痛便秘.治疗首选药物是

- A.雄黄
- B.雌黄
- C.皂矾
- D.硼砂
- E.硫磺

86.患者,女,25岁.妊娠4周,患病前来就诊,问下列除哪组药外,均是妊娠用药禁忌的

- A.巴豆、牵牛子、大戟
- B.三棱、莪术、水蛭
- C.斑蝥、麝香、雄黄
- D.当归、阿胶、丹参
- E.冬葵子、瞿麦、木通

87.患者,男45岁,大量饮酒后出现一身面目俱黄的表现,前来就诊,黄色鲜明,腹微满,口中渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉数,治宜用

- A.黄连解毒汤
- B.三仁汤
- C.甘露消毒汤
- D.茵陈蒿汤
- E.龙胆泻肝汤

88.患者,女,29岁,3天前顺产一男婴,后血虚受寒,恶露不尽,少腹冷痛者,治宜用

- A.血府逐瘀汤
- B.温经汤
- C.桃核承气汤
- D.生化汤
- E.复元活血汤

89.患者,女,40岁,热闭,神昏谵语,痰甚气粗,身热烦躁,舌红苔黄腻者,治宜用

- A.安宫牛黄丸
- B.紫雪丹
- C.至宝丹
- D.羚角钩藤汤
- E.苏合香丸

90.患者,女,32岁,平素心烦易怒,与家人吵架后致咳嗽痰中带血,心烦易怒,胁痛苔黄,脉弦数者,治宜用

- A.犀角地黄汤
- B.十灰散
- C.咳血方
- D.百合固金汤
- E.左金丸

91.患者,男,32岁,平素患有湿疹,时好时坏,近日外出受风后出现了皮疹加重,瘙痒难忍,抓破后有水液渗出,苔白,脉浮.治宜用

- A.消风散
- B.槐花散
- C.川芎茶调散
- D.羌活胜湿汤
- E.连朴饮

92.男,30岁.既往有乙型肝炎病史.近1个月来右上腹反复疼痛,查体:肝肋下3cm,质硬,有结节感.实验检查应首选下列哪项

- A.乙肝两对半检查
- B.血清白蛋白
- C.单胺氧化酶
- D.甲胎蛋白
- E.碱性磷酸酶

93.患者,男,60岁,有糖尿病家族史,高血压病史3年,平素喜爱甜食,测空腹血糖6.5mmol/L,但无明显症状,为明确诊断,可以进行

- A.尿糖测定
- B.甘油三酯测定
- C. OGTT
- D.糖化血红蛋白测定
- E. LDL-C测定

94.患者,男,38岁.因双手关节对称性肿胀、疼痛3

个月,经检查在当地医院诊为类风湿关节炎,则其检查结果最不可能出现的是

- A.轻度贫血
- B.血小板减少
- C.反应蛋白升高
- D.血沉加快
- E.类风湿因子阳性

95.患者,女,60岁,车祸后瘫痪,肢体能在床面上做水平移动,但不能抬离床面,此时的肌力分级为

- A.1级
- B.2级
- C.3级
- D.4级
- E.5级

96.女,45岁.既往有胆道结石病史,今天出现持续性明显腹痛,放射到腰背部,伴呕吐.查体:上腹部肌紧张,明显压痛伴反跳痛,肠鸣音减弱.血AMS 3600U/L.诊断应考虑

- A.胆石症胆道感染
- B.急性胰腺炎
- C.急性胃炎
- D.急性肝炎
- E.急性肝脓肿

97.患者,女,32岁.一周前受凉后感冒,表现为鼻塞、咳嗽,未予治疗,今日突发寒战、发热,咳嗽、咳痰,痰中带有血丝,遂来医院就诊.为明确诊断,患者应进行的检查不包括

- A.血常规
- B.胸部X线
- C.痰涂片
- D.肺功能
- E.痰培养

98.患者,长久以来低头工作,项背部强痛,低头加重,颈项后枕部疼痛,颈部僵紧不舒,针刺选用

- A.督脉、太阳经
- B.督脉、少阳经
- C.任脉、太阳经
- D.督脉、厥阴经
- E.督脉、太阴经

99.痛痹除选用阿是穴和局部经穴外,主要配下列哪组经穴

- A.肾俞、关元
- B.大椎、曲池
- C.肝俞、太冲
- D.膈俞、血海

E.阴陵泉、足三里

100.患者,34岁,自觉有气从少腹上冲胸咽,诊断为奔豚气,治疗穴位为

- A.地机
- B.血海
- C.公孙
- D.太白
- E.隐白

101.患者,59岁,自感午后及夜间低热,有热自骨内向外透发,若治疗选用背俞穴,首选穴位

- A.肝俞
- B.肺俞
- C.脾俞
- D.三焦俞
- E.心俞

102.患者,男,29岁,恶寒发热,鼻塞流涕,咳嗽头痛,周身酸楚不适,恶寒重发热轻,无汗喷嚏,苔薄白,脉浮紧,除主穴外,还需要选择的配穴是

- A.尺泽、委中
- B.大椎、风门
- C.风门、肺俞
- D.少商、商阳
- E.曲池、尺泽

103.患者,男,56岁,腰痛半个月,腰部冷痛重着,拘挛不可俯仰,舌淡,苔白,脉紧,治疗除选取阿是穴、大肠俞、委中外,应配用下列哪组腧穴

- A.膈俞
- B.腰阳关
- C.足三里
- D.志室
- E.悬钟

104.谢某,男,63岁,中风半身不遂,舌强语蹇,口眼歪斜,兼见目赤面红,心烦,口苦,舌红苔黄,脉弦.除水沟、内关、三阴交、极泉、尺泽、委中外,还应选取哪些配穴

- A.丰隆、合谷
- B.内庭、风池
- C.太冲、太溪
- D.足三里、气海
- E.曲池、内庭

105.刘某,女,45岁,2天前突然出现耳鸣,自觉耳中胀痛,耳鸣如潮,鸣声隆隆不断,按之不减.兼见头胀,目赤,咽干,脉弦.该患者除上述主穴外,还应选取的配穴为

- A.外关、合谷

- B. 行间、丘墟
- C. 太冲、行间
- D. 太冲、太溪
- E. 丰隆、丘墟

106. 何某,女,47岁.头部空痛10年,头痛隐隐,遇劳发作,兼头晕,神疲乏力,面色不华,舌淡,脉细弱.除阿是穴外,该患者应选取的主穴为

- A. 合谷、风池、外关
- B. 率谷、风池、外关
- C. 足临泣、后溪、外关
- D. 百会、风池、合谷
- E. 合谷、风府、百会

107. 某女,49岁,由于劳累、过度兴奋而突发心绞痛,服用下列哪种药效果好

- A. 口服硫酸奎尼丁
- B. 舌下含服硝酸甘油
- C. 注射盐酸利多卡因
- D. 口服盐酸普鲁卡因胺
- E. 注射苯妥英钠

108. 患者,男,41岁.大面积烧伤合并严重铜绿假单胞菌感染,生化检查血肌酐及尿素氮值异常.应选用的抗感染药物是

- A. 复方新诺明
- B. 头孢氨苄
- C. 丁胺卡那霉素
- D. 庆大霉素
- E. 头孢他定

109. 男,39岁.双眼睑下垂7~8天,渐加重,近一两天四肢或活动无力,晨起轻,下午重,休息后减轻,活动后加重.诊断:重症肌无力.对该病人最好用哪种药物

- A. 新斯的明
- B. 毒扁豆碱
- C. 阿托品
- D. 毛果芸香碱
- E. 加兰他敏

110. 患者,女,58岁.因全身关节疼痛,长期服用某药昨日出现自发性骨折.导致该不良反应的药物是

- A. 保泰松
- B. 阿司匹林
- C. 消炎痛
- D. 强的松
- E. 布洛芬

B型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择.

(111~112题共用备选答案)

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚寒证
- D. 虚热证
- E. 阴阳两虚证

111. 适用于"益火之源,以消阴翳"的治法是

112. 适用于"壮水之主,以制阳光"的治法是

答案: CD

解析: 虚寒则"益火之源,以消阴翳",也可"阴中求阳"即补阳时适当佐以补阴药.虚热则相火偏亢,出现潮热盗汗、五心烦热、性欲亢进、遗精或梦交、舌红少苔、脉细数等症,治当滋养肾阴,"壮水之主,以制阳光".

(113~114题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 肾

- D. 三焦
- E. 脾

113. "生之本,神之变"为

114. "罢极之本"为

答案: A B

解析: 心为生之本,神之变.肝为罢极之本.

(115~116题共用备选答案)

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阳中之至阳

115. 肺的阴阳属性是

116. 肾的阴阳属性是

答案: B C

解析: 肺一阳中之阴.肾一阴中之阴.

(117~118题共用备选答案)

- A. 有机磷中毒
- B. 瘟疫类
- C. 肾衰
- D. 消渴并发症
- E. 癌病

117. 烂苹果样气味多见于() 患者

118. 尿臊味多见于() 患者

答案: D C

解析: 烂苹果样气味多见于消渴并发症患者。尿臊味多见于肾衰患者。

(119~120题共用备选答案)

- A. 血瘀
- B. 寒证
- C. 疼痛
- D. 惊风
- E. 水饮

119. 黑色不主

120. 青色不主

答案: D E

解析: 黑色主肾虚、寒证、水饮、疼痛、瘀血。青色主疼痛、气滞、血瘀、寒证、惊风。

(121~122题共用备选答案)

- A. 心阳虚证
- B. 心脉痹阻证
- C. 心阴虚证
- D. 心血虚证
- E. 心气虚证

121. 心悸怔忡,形寒肢冷,气短心痛者,证属

122. 心烦心悸,失眠多梦,舌红少苔者,证属

答案: A C

解析: 心阳虚证临床表现: 心悸怔忡,心胸憋闷或痛,气短,自汗,畏冷肢凉,神疲乏力,面色胱白,或面唇青紫,舌质淡胖或紫暗,苔白滑,脉弱或结或代。心阴虚证临床表现: 心烦,心悸,失眠,多梦,口燥咽干,形体消瘦,或见手足心热,潮热盗汗,两颧潮红,舌红少苔乏津,脉细数。

(123~124题共用备选答案)

- A. 相恶、相使
- B. 相杀、相反
- C. 相须、相恶
- D. 相杀、相畏
- E. 相须、相使

123. 七情配伍中,可取降低药物毒副作用的是

124. 七情配伍中,可以提高药效的是

答案: D E

解析: 相须就是两种功效相似的药物配合应用,可以增强原有药物的疗效。相使就是以一种药物为主,另一种药物为辅,两种药物合用,辅药可以提高主药的功效。相畏就是一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制。相杀就是一种药物能够减轻或消除另一种药物的毒副作用。

(125~126题共用备选答案)

- A. 羚羊角
- B. 天南星
- C. 天麻
- D. 地龙
- E. 白芥子

125. 用于中风痰壅、口眼歪斜,破伤风之证者,宜选

126. 用于风湿痹痛之肢体麻木、手足不遂者,宜选

答案: B C

解析: 天南星功效燥湿化痰,祛风止痉;外用散结消肿。主治顽痰咳嗽,湿痰寒痰证;风痰眩晕,中风,口眼歪斜,癫痫,破伤风;痈疽肿痛,痰核瘰疬;蛇虫咬伤。天麻功效: 息风止痉,平抑肝阳,祛风通络。能够治疗肢体麻木,中风手足不遂,风湿痹痛。

(127~128题共用备选答案)

- A. 石膏
- B. 栀子
- C. 天花粉
- D. 夏枯草
- E. 淡竹叶

127. 治疗温病气分实热证,症见壮热,烦渴,脉洪大,宜选用的药物是

128. 治疗温病热盛伤津,口干舌燥,烦渴,宜选用的药物是

答案: A C

解析: 温热病气分实热证,症见壮热,烦渴,脉洪大。宜选用: 石膏。温热病热盛伤津,口干舌燥,烦渴,宜选用: 天花粉。

(129~130题共用备选答案)

- A. 平冲降逆
- B. 温阳化气
- C. 疏风解表
- D. 温通经脉
- E. 调和营卫

129. 桂枝在桂枝茯苓丸中的作用是

130. 桂枝在五苓散中的作用是

答案: D B

解析: 桂枝茯苓丸中桂枝辛甘而温,温通血脉,以行瘀滞,为君药。五苓散中桂枝温阳化气以助利水

(131~132题共用备选答案)

- A. 阳明气分热盛
- B. 阴虚有火,潮热盗汗
- C. 热病之后,余热未清,气津两伤
- D. 温病后期,阴虚邪伏
- E. 阴虚内热,虚劳骨蒸

131. 青蒿鳖甲汤证的病机是

132. 白虎汤证的病机是

答案: DA

解析: 青蒿鳖甲汤主治温病后期,邪伏阴分证;白虎汤主治气分热盛证。

(133~134题共用备选答案)

- A. 当归、生地、黄连
- B. 当归、熟地、黄芩
- C. 黄连、黄芩、生地
- D. 薄荷、桔梗、枳实
- E. 薄荷、桔梗、连翘

133. 清胃散和朱砂安神丸中均含有

134. 银翘散和桑菊饮中均含有

答案: AE

解析: 清胃散组成: 生地黄当归身牡丹皮黄连升麻。

朱砂安神丸组成: 朱砂黄连炙甘草 生地黄当归。

银翘散组成: 银花连翘牛蒡子薄荷竹叶苇根芥穗淡豆豉桔梗甘草。

桑菊饮组成: 桑叶菊花连翘薄荷杏仁桔梗苇根 甘草。

(135~136题共用备选答案)

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 回归热
- E. 不规则热

135. 斑疹伤寒所致的发热热型通常为

136. 霍奇金病所致的发热热型通常为

答案: AD

解析: 稽留热多见于肺炎链球菌肺炎、伤寒、斑疹伤寒等的发热极期。弛张热常见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症等。间歇热常见于疟疾、急性肾盂肾炎等。回归热可见于回归热、霍奇金病等。不规则热可见于结核病、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎等。

(137~138题共用备选答案)

- A. 咳声嘶哑
- B. 犬吠样咳嗽
- C. 无声咳嗽
- D. 鸡鸣样咳嗽

E. 金属调咳嗽

137. 纵隔肿瘤的咳嗽声的特点为

138. 百日咳的咳嗽声的特点为

答案: ED

解析: 咳嗽声音嘶哑多见于声带炎、喉炎、喉癌及喉返神经受压迫;犬吠样咳嗽多见于喉头炎症水肿或气管受压;无声咳嗽多见于极度衰弱或声带麻痹患者;鸡鸣样咳嗽多见于百日咳;金属调咳嗽多见于纵隔肿瘤或支气管癌等,是肿块直接压迫气管所致。

(139~140题共用备选答案)

- A. 组胺
- B. 雷尼替丁
- C. 氯丙嗪
- D. 氢氯噻嗪
- E. 异丙嗪

139. 抑制胃酸分泌的药物是

140. 促进胃酸分泌的药物是

答案: BA

解析: 雷尼替丁是H受体阻滞药的代表药物之一,抑制胃酸分泌作用强而持久。

组胺具有促进胃酸分泌的作用。

(141~142题共用备选答案)

- A. 作用于远曲小管和集合管,竞争醛固酮受体,对抗醛固酮的作用
- B. 作用于近曲小管,抑制碳酸酐酶,减少H⁺-Na⁺交换
- C. 作用于远曲小管近端,阻滞Na⁺通道,减少Na⁺的重吸收
- D. 作用于髓袢升支粗段皮质部,抑制Na⁺-K⁺-2Cl⁻共同转运系统
- E. 作用于髓袢升支粗段的髓质和皮质部,抑制Na⁺-K⁺-2Cl⁻共同转运系统

141. 呋塞米的利尿作用机制是

142. 螺内酯的利尿作用机制是

答案: EA

解析: 呋塞米等抑制髓袢升支粗段上皮细胞上的Na⁺-K⁺-2Cl⁻同向转运机制,产生强效利尿作用。

螺内酯利尿作用与醛固酮水平有关,作用弱而缓慢.螺内酯化学结构与醛固酮相似,可竞争性地与胞浆中的醛固酮受体结合,拮抗醛固酮的排钾保钠作用,产生与醛固酮相反的作用即保钾利尿。

(143~144题共用备选答案)

- A. 肾俞
- B. 肺俞
- C. 风门
- D. 命门

E. 次髂

143. 第2腰椎棘突下, 旁开1.5寸的腧穴是

144. 在骶区, 正对第2骶后孔中的是

答案: A E

解析: 肾俞, 在第2腰椎棘突下, 旁开1.5寸. 次髂, 正对第2骶后孔。

(145~146题共用备选答案)

A. 钩端螺旋体

B. 奈瑟菌

C. HIV

D. 汉坦病毒

E. 黄病毒

145. 引发肾综合征出血热的病原体是

146. 引发流行性脑脊髓膜炎的病原体是

答案: DB

解析: 肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的; 流行性脑脊髓膜炎是由奈瑟菌属引起的。钩端螺旋体能引起钩端螺旋体病, HIV 引起艾滋病, 乙型脑炎病毒属虫媒病毒乙组的黄病毒科。

(147~148题共用备选答案)

A. 尊重患者原则

B. 生命价值原则

C. 知情同意原则

D. 保密原则

E. 最优化原则

147. 临床诊疗的道德原则中, 最普通、最基本的治疗原则是

148. 临床诊疗的道德原则中, 医疗行为原则的重要伦理依据是

答案: EB

解析: 临床诊疗的道德原则中, 最普通、最基本的治疗原则是最优化原则。

医疗行为原则的重要伦理依据是生命价值原则。

(149~150题共用备选答案)

A. 二日极量

B. 一次常用量

C. 三日常用量

D. 四日极量

E. 七日常用量

149. 为门(急) 诊患者开具的麻醉药品注射剂每张处方为

150. 第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外, 其他剂型每次每张处方不得超过

答案: BC

解析: 为门(急) 诊患者开具的麻醉药品注射剂每张处方为一次常用量。第一类精神药品除注射剂、控缓释制剂外, 其他剂型每次每张处方不得超过三日常用量。

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元	西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
第三单元	中西医内科150
第四单元	中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基20、中诊20、中药20、方剂20、 西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
第二单元	中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25

