

2 0 2 2 执 业 医 师 考 试

模拟卷

2022年

青海中西医医师资格考试

延期专用

第一单元

1. 关于中医学的学科属性，以下哪项更准确
 - A. 科学
 - B. 哲学
 - C. 医学科学
 - D. 自然科学
 - E. 自然哲学

2. 中医学形成的时间最迟为
 - A. 夏朝
 - B. 商朝
 - C. 春秋时期
 - D. 战国至秦汉时期
 - E. 东汉时期

3. 中医学理论体系的形成标志为
 - A. 《五十二病方》
 - B. 《黄帝内经》
 - C. 《难经》
 - D. 《伤寒杂病论》
 - E. 《神农本草经》

4. 中医学理论体系的确立标志为
 - A. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》
 - B. 《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
 - C. 《五十二病方》《黄帝内经》《难经》《神农本草经》
 - D. 《五十二病方》《黄帝内经》《伤寒杂病论》《神农本草经》
 - E. 《五十二病方》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》

5. 倡导以六经辨证和脏腑辨证等方法，为我国第一部临床医学专著的是
 - A. 《五十二病方》
 - B. 《黄帝内经》
 - C. 《难经》
 - D. 《伤寒杂病论》
 - E. 《神农本草经》

6. 人体是一个有机整体，其“中心”是
 - A. 脑
 - B. 六腑
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 奇恒之腑

7. 人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是
- A. 脑
 - B. 心
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 肾
8. 《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是
- A. 恒动观念
 - B. 辨证论治
 - C. 形神一体观
 - D. 整体观念
 - E. 辨证观念
9. 《素问·金匱真言论》说所“善病洞泄寒中”的季节是
- A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
10. 《素问·金匱真言论》所说“善病风疰”的季节是
- A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
11. 《素问·脉要精微论》所说“泛泛乎万物有余”的脉象，其相应的时间是
- A. 春日
 - B. 夏日
 - C. 长夏
 - D. 秋日
 - E. 冬日
12. 《素问·脉要精微论》所说“蛰虫周密”的脉象出现的时间是
- A. 春日
 - B. 夏日
 - C. 长夏
 - D. 秋日
 - E. 冬日
13. 《灵枢·顺气一日分为四时》“夫百病者……多以旦慧”，其原因是
- A. 人气始生，病气衰

- B. 人气长，长则胜邪
- C. 人气始衰，邪气始生
- D. 人气入脏，邪气独居于身
- E. 人气抗邪，卫外为固

14. 《灵枢·顺气一日分为四时》所说疾病随昼夜时间节律而变化，其病“安”的时间是

- A. 旦
- B. 昼
- C. 夕
- D. 夜
- E. 晨

15. 采取同病异治方法的原因是

- A. 疾病相同
- B. 症状不同
- C. 阶段相同
- D. 证候不同
- E. 体征不同

16. 寒凉派医家代表为

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张介宾

17. 下列选项，能够体现事物阴阳属性相对性的是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

18. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间的关系是

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

19. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳互藏
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡

- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

20. “阴平阳秘，精气乃治”，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳的对立制约
- B. 阴阳的对立消长
- C. 阴阳的互根互用
- D. 阴阳的消长平衡
- E. 阴阳的相互转化

21. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阴阳相互转化
- B. 阴阳互根互用
- C. 阴阳相互消长
- D. 阴阳对立制约
- E. 阴阳动态平衡

22. “热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

23. “阳生阴长，阳杀阴藏”所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳交感
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳对立
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳转化

24. 五脏分阴阳，则肺的阴阳属性是

- A. 阳中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阴中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

25. 五行中，“金”的“所不胜”之行是

- A. 火
- B. 水
- C. 土
- D. 木
- E. 金

26. 肺主司一身之气的生成体现于

- A. 吸入清气
- B. 呼出浊气
- C. 生成宗气
- D. 调节气机
- E. 辅心行血

27. 《素问·上古天真论》“筋骨坚，发长极，身体盛壮”所指女子的年龄段是

- A. “二七”
- B. “三七”
- C. “四七”
- D. “五七”
- E. “六七”

28. “胃之关”指的是

- A. 贲门
- B. 幽门
- C. 阑门
- D. 大肠
- E. 肾

29. 与血液生成及运行关系密切的是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

30. 贯注于心肺之脉的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑精气

31. 《灵枢·经脉》说，经脉十二者，伏行于何处

- A. 全身
- B. 分肉之间
- C. 四肢
- D. 躯干
- E. 头面

32. 手三阴经的走向规律是

- A. 从足走头
- B. 从头走足
- C. 从胸走手
- D. 从手走头
- E. 从足走腹

33. 足厥阴肝经分布于内踝尖八寸以上的

- A. 下肢内侧前缘
- B. 下肢外侧前缘
- C. 下肢内侧后缘
- D. 下肢外侧中线
- E. 下肢内侧中线

34. 手三阳经在躯干部的分布是

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 背部
- D. 肩胛部
- E. 体侧

35. 下述经脉在其循行过程中，经过气街的是

- A. 足少阴与足太阳
- B. 手少阳与足少阳
- C. 手阳明与足阳明
- D. 足厥阴与足太阳
- E. 足阳明与足少阳

36. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是

- A. 扰神
- B. 炎热
- C. 伤津
- D. 动血
- E. 生风

37. 《素问·五脏生成》说“多食甘”则

- A. 脉凝泣而变色
- B. 皮槁而毛拔
- C. 筋急而抓枯
- D. 肉胝皱而唇揭
- E. 骨痛而发落

38. 《临证指南医案》说“内风”产生的机理是

- A. 体内气机之逆乱
- B. 身中阳气之变动

- C. 体内阴血之不足
- D. 体内筋脉之失养
- E. 体表络脉之失濡

39. 不属于反治的是

- A. 以寒治寒
- B. 热因热用
- C. 以通治通
- D. 以补开塞
- E. 寒者热之

40. 用寒远寒，用热远热属于

- A. 扶正祛邪
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 未病先防

41. 下列各项，不属于失神表现的是

- A. 神志昏迷
- B. 形羸色败
- C. 呼吸微弱
- D. 目无精彩
- E. 壮热面赤

42. 下列各项，不是精亏神衰失神表现的是

- A. 动作艰难
- B. 呼吸气微
- C. 肌肉瘦削
- D. 神昏谵语
- E. 面色无华

43. 根据《灵枢·五色》的分法，整个面部称为“藩”的部分是

- A. 鼻
- B. 耳门
- C. 眉间
- D. 颊侧
- E. 额

44. 脏腑在面部的分属，阙中所候脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾

E. 肝

45. 下列各项，是青色和黑色共同所主之病证的是

- A. 寒证
- B. 惊风
- C. 水饮
- D. 肾虚
- E. 气滞

46. 患者双侧瞳孔散大属

- A. 颅脑外伤
- B. 肝火上炎
- C. 颅内肿瘤
- D. 青风内障
- E. 有机磷中毒

47. 小儿食指络脉紫黑的临床意义是

- A. 实寒证
- B. 实热证
- C. 虚热证
- D. 血虚证
- E. 血络闭郁

48. 络舌本的经脉是

- A. 手少阴心经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阴肺经

49. 无神之舌的表现是

- A. 裂纹舌
- B. 痿软舌
- C. 枯舌
- D. 肿胀舌
- E. 胖嫩舌

50. 舌绛少苔的临床意义是

- A. 血瘀
- B. 热盛
- C. 气虚
- D. 阴虚
- E. 痰火

51. 苔黑而滑润的临床意义是

- A. 阴虚火旺
- B. 湿热郁蒸
- C. 热盛伤津
- D. 痰火内蕴
- E. 阳虚寒盛

52. 邪闭、厥证、痛极的脉象是

- A. 牢脉
- B. 革脉
- C. 紧脉
- D. 伏脉
- E. 弦脉

53. 邪热内结的脉象是

- A. 革脉
- B. 濡脉
- C. 芤脉
- D. 紧脉
- E. 迟脉

54. 心阳虚证与心阳虚脱证临床表现相同的是

- A. 冷汗淋漓
- B. 神志模糊
- C. 面唇青紫
- D. 失眠多梦
- E. 胸痛暴作

55. 肝血虚证的临床表现是

- A. 两目干涩
- B. 视力减退
- C. 手足蠕动
- D. 头痛目赤
- E. 面部烘热

56. 下列各项，不属于心肾不交证临床表现的是

- A. 舌淡少苔
- B. 惊悸多梦
- C. 健忘
- D. 腰膝酸软
- E. 口干咽燥

57. 性能功效相类似的药物配合应用，可增强原有疗效的配伍关系是

- A. 相须

- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

58. 一种药物的毒烈性，能被另一种药物消除的配伍关系是

- A. 相恶
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相须
- E. 相反

59. 七情配伍中，可以降低药物功效的是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相须
- D. 相使
- E. 相恶

60. 下列各项说法错误的是

- A. 麻黄清表热
- B. 石膏清里热
- C. 秦艽清虚热
- D. 金银花透表热，清里热
- E. 牡丹皮清血热，退虚热

61. 治疗外感风寒，项背强痛而无汗，应选用的药组是

- A. 葛根、柴胡
- B. 葛根、升麻
- C. 葛根、麻黄
- D. 葛根、牛蒡子
- E. 葛根、白芷

62. 治疗胃火上炎的头痛、牙龈肿痛，应选用的药组是

- A. 玄参、黄芩
- B. 知母、贝母
- C. 石膏、升麻
- D. 龙胆、黄柏
- E. 紫苏、生姜

63. 具有清实热、退虚热功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 黄芩

- D. 苦参
- E. 栀子

64. 上以清肺，中以凉胃，下泻肾火的物是

- A. 黄柏
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 地骨皮
- E. 生地黄

65. 治疗热病心烦、郁闷、躁扰不宁，血热妄行之吐衄、尿血的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 苦参
- D. 栀子
- E. 黄芩

66. 具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮功效的药物是

- A. 银柴胡
- B. 苦参
- C. 黄芩
- D. 黄连
- E. 黄柏

67. 治疗湿热下注之足膝红肿热痛，应选用的药组是

- A. 羌活、独活
- B. 白芷、苍耳子
- C. 苦参、茯苓
- D. 黄柏、苍术
- E. 细辛、防风

68. 治疗湿热黄疸和肝经热盛，高热惊厥，手足抽搐，应选用的药物是

- A. 黄柏
- B. 黄连
- C. 黄芩
- D. 龙胆
- E. 防风

69. 具有峻下逐饮、杀虫疗疮、祛痰止咳功效的药物是

- A. 京大戟
- B. 大黄
- C. 巴豆霜
- D. 芫花
- E. 牵牛子

70. 治疗水肿胀满，大便秘结，小便不利，应首选的药物是

- A. 大黄
- B. 牵牛子
- C. 麻黄
- D. 巴豆霜
- E. 芒硝

71. 独活的功效是

- A. 利尿
- B. 清热解毒
- C. 治骨鲠
- D. 解表
- E. 安胎

72. 患者，女，61岁。患风湿痹痛多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 秦艽
- C. 五加皮
- D. 木防己
- E. 桑叶

73. 患者，男，28岁。外出感寒，左下肢痛，遇风则疼痛加剧，舌苔薄白。用药应首选的药物是

- A. 独活
- B. 威灵仙
- C. 羌活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

74. 患者，女，50岁。2周前突发小腿肌肉抽筋(腓肠肌痉挛)，近来发作频繁，尤以夜间为重，每因天气寒冷或包裹不严而发作，用药应首选的药物是

- A. 羌活
- B. 木瓜
- C. 独活
- D. 桑寄生
- E. 秦艽

75. 患者，女，35岁，大便水泻，并见轻微发热，恶心欲吐，舌质淡，苔白腻，脉象濡滑，用药应首选的药物是

- A. 白术
- B. 苍术
- C. 车前子

- D. 茯苓
- E. 藿香

76. 飞滑石入煎剂的用法是

- A. 冲服
- B. 包煎
- C. 另煎
- D. 先煎
- E. 久煎

77. 治疗元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，应选用的药组是

- A. 附子、黄芪
- B. 附子、人参
- C. 白术、附子
- D. 附子、干姜
- E. 附子、肉桂

78. 具有散寒止痛、理气和胃功效的药物是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 小茴香
- E. 花椒

79. 具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是

- A. 枳实
- B. 佛手
- C. 陈皮
- D. 薤白
- E. 川楝子

80. 治疗脏器下垂，应选用的药物是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 沉香

81. 具有凉血止血散瘀功效，尤善治尿血的药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

82. 具有凉血止血、解毒敛疮功效的药物是

- A. 侧柏叶
- B. 大蓟
- C. 艾叶
- D. 地榆
- E. 栀子

83. 百合除治疗肺热咳嗽、劳嗽咯血外，还能够治疗的病证是

- A. 肝肾阴虚、头晕目眩
- B. 胃阴不足、舌干口渴
- C. 脾胃虚弱、倦怠无力
- D. 虚烦惊悸、失眠多梦
- E. 老年津亏、肠燥便秘

84. 患者，女，54岁。面色㿔白，时自汗出，恶风，经常患感冒，脉浮无力。用药应首选药物是

- A. 党参
- B. 麻黄根
- C. 浮小麦
- D. 生黄芪
- E. 太子参

85. 乌梅的功效是

- A. 涩肠，止遗
- B. 止带，止遗
- C. 涩肠，生津
- D. 涩肠，止带
- E. 止带，止血

86. 银翘散组成的药物中，除银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子外，其余的药物是

- A. 竹叶杏仁桔梗甘草
- B. 苏叶桔梗芦根甘草
- C. 薄荷杏仁桔梗甘草
- D. 薄荷竹叶桔梗甘草
- E. 薄荷杏仁竹叶甘草

87. 止嗽散组成的药物中含有

- A. 苏梗
- B. 荆芥
- C. 百合
- D. 白芷
- E. 紫苏

88. 九味羌活汤的功用是

- A. 散寒解表，祛风除湿
- B. 发汗解表，疏风止痛
- C. 宣肺散寒，除湿止痛
- D. 发汗祛湿，兼清里热
- E. 散寒除湿，通痹止痛

89. 柴葛解肌汤的功用是

- A. 解肌发表
- B. 解肌透疹
- C. 解肌清热
- D. 解肌疏风
- E. 透疹解毒

90. 银翘散中配伍荆芥、淡豆豉的目的是

- A. 宣郁发表，疏风泄热
- B. 解郁除烦，疏散风热
- C. 辛散透邪，以助解表
- D. 疏散风热，宣肺止咳
- E. 疏散风邪，和营止痒

91. 桑菊饮证的主要临床表现是

- A. 头痛身热，微恶风寒，有汗不多，口渴咽干，舌尖红，脉浮数
- B. 咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮微数
- C. 头痛，发热，汗出恶风，苔薄白，脉浮缓
- D. 身热，咳逆，气急鼻塞，苔薄黄，脉滑数
- E. 咳嗽咽痒，微有恶寒发热，苔薄白，脉浮缓

92. 下列何药不是温脾汤组成的药物

- A. 大黄
- B. 甘草
- C. 附子
- D. 人参
- E. 厚朴

93. 功用为泻热逐水的方剂是

- A. 十枣汤
- B. 大承气汤
- C. 大陷胸汤
- D. 济川煎
- E. 大黄牡丹汤

94. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数者，治宜选用

- A. 济川煎

- B. 增液汤
- C. 五仁丸
- D. 麻子仁丸
- E. 小承气汤

95. 蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 燥湿化痰，和胃降逆
- B. 散结除痞，降逆止呕
- C. 散肝舒脾，降逆止呕
- D. 下气宽中，除痰消痞
- E. 温中散寒，散结除痞

96. 由石膏、知母、粳米、甘草组成的方剂是

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 白虎汤
- E. 竹叶石膏汤

97. 功用为清泻肺热，止咳平喘的方剂是

- A. 止嗽散
- B. 泻白散
- C. 麻黄汤
- D. 定喘汤
- E. 麻杏石膏汤

98. 四逆汤和理中丸组成中均含有的药物是

- A. 附子
- B. 人参
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 白术

99. 吴茱萸汤的功用是

- A. 温中补虚，和里缓急
- B. 温中祛寒，益气健脾
- C. 温中补虚，降逆止呕
- D. 温肾暖脾，涩肠止泻
- E. 温中补虚，散寒止痛

100. 大柴胡汤的功用是

- A. 和解少阳，内泻热结
- B. 疏肝止痛，清热散结
- C. 透邪解郁，疏肝理脾

- D. 解肌疏表，清泻里实
- E. 疏肝解郁，健脾和营

101. 参苓白术散中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外，还有

- A. 黄芪、当归、陈皮、升麻、柴胡
- B. 莲子肉、薏苡仁、砂仁、白扁豆、山药
- C. 莲子肉、薏苡仁、砂仁、当归、陈皮
- D. 黄芪、当归、砂仁、白扁豆、山药
- E. 黄芪、当归、陈皮、白扁豆、山药

102. 不属于补中益气汤组成药物的是

- A. 人参、黄芪
- B. 白术、炙甘草
- C. 茯苓、砂仁
- D. 当归、橘皮
- E. 升麻、柴胡

103. 左归丸的功用是

- A. 温补肾阳，填精补血
- B. 滋阴补肾，填精益髓
- C. 补益肝肾，强壮筋骨
- D. 滋阴补肾，涩精止遗
- E. 填精补髓，滋阴降火

104. 症见汗出恶风，面色㿔白，舌淡，苔薄白，脉浮虚者，宜选用

- A. 玉屏风散
- B. 桂枝汤
- C. 四君子汤
- D. 当归补血汤
- E. 八珍汤

105. 大补阴丸中除熟地黄、猪脊髓、白蜜外，还有

- A. 黄连贝母龟板
- B. 黄柏知母龟板
- C. 黄芩知母鳖甲
- D. 黄柏当归龟板
- E. 黄柏贝母鳖甲

106. 真人养脏汤的功用是

- A. 温中祛寒，补益脾胃
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 益气健脾，缓急止痛
- D. 温补脾肾，涩肠止泻
- E. 涩肠固脱，温补脾肾

107. 治疗五更泄泻的首选方剂是

- A. 吴茱萸汤
- B. 理中丸
- C. 真人养脏汤
- D. 四神丸
- E. 金匱肾气丸

108. 酸枣仁汤组成的药物中含有

- A. 知母
- B. 茯神
- C. 远志
- D. 柏子仁
- E. 龙眼肉

109. 手足三阳经在四肢的分布规律是

- A. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
- B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
- C. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
- D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
- E. 少阳在前，阳明在中，太阳在后

110. 相表里的阴经与阳经的循行交接部位是

- A. 心中
- B. 胸中
- C. 腹中
- D. 头面部
- E. 手足末端

111. 手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

112. 足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是

- A. 肺内
- B. 腹中
- C. 胸中
- D. 心中
- E. 目旁

113. 下列各组经脉中，未按气血循行流注顺序排列的是

- A. 胆经、肝经、肺经
- B. 心经、小肠经、肾经
- C. 大肠经、胃经、脾经
- D. 肾经、心包经、三焦经
- E. 三焦经、胆经、肝经

114. 对奇经八脉的叙述中，错误的是

- A. 阳维脉总督六阳
- B. 阳跷脉调节肢体运动
- C. 冲脉涵蓄十二经气血
- D. 任脉总任六阴经
- E. 阴跷脉司眼睑开阖

115. 被称为“阳脉之海”的是

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阳维脉
- E. 阳跷脉

116. 属于十五络脉的是

- A. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络
- B. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络
- C. 任脉之络、督脉之络、脾之大络
- D. 任脉之络、督脉之络、胃之大络
- E. 任脉之络、督脉之络、冲脉之络

117. 根据十二经别循行分布特点排列的是

- A. 出、入、离、合
- B. 入、离、出、合
- C. 离、合、出、入
- D. 离、入、出、合
- E. 出、离、入、合

118. 属于脏，循行分布于上肢内侧和胸腹的是

- A. 奇经八脉
- B. 手三阴经
- C. 手三阳经
- D. 足三阴经
- E. 足三阳经

119. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- B. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后

- C. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- D. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- E. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

120. 手三阴经的循行走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

121. 具有调节全身阴经经气作用的是

- A. 任脉
- B. 冲脉
- C. 带脉
- D. 阴跷脉
- E. 阴维脉

122. 带脉的功能是

- A. 调节全身阴经经气
- B. 涵蓄十二经气血
- C. 调节六阴经经气
- D. 调节肢体运动
- E. 约束纵行躯干的诸条经脉

123. 属于奇经的是

- A. 手少阳三焦经
- B. 十二经筋
- C. 十二皮部
- D. 十五络脉
- E. 阴维脉

124. 属于正经的是

- A. 手少阳三焦经
- B. 十二经筋
- C. 十二皮部
- D. 十五络脉
- E. 阴维脉

125. 任脉别络的分布部位是

- A. 从鸠尾分出散布于背部
- B. 从鸠尾分出散布于腹部
- C. 从鸠尾分出散布于胸部
- D. 从长强分出散布于头部

E. 从长强分出散布于腹部

126. 督脉别络的分布部位是

- A. 从鸠尾分出散布于背部
- B. 从鸠尾分出散布于腹部
- C. 从鸠尾分出散布于胸部
- D. 从长强分出散布于头部
- E. 从长强分出散布于腹部

127. 经络按诊最常用的部位是

- A. 交会穴
- B. 五输穴
- C. 背俞穴
- D. 八会穴
- E. 八脉交会穴

128. 腧穴的分类是

- A. 十四经穴、奇穴、特定穴
- B. 十四经穴、奇穴、阿是穴
- C. 十二经穴、奇穴、特定穴
- D. 十二经穴、奇穴、阿是穴
- E. 十二经穴、奇穴、五输穴

129. 下列关于奇穴的描述，错误的是

- A. 有固定名称和位置
- B. 某些奇穴是多个穴点的组合
- C. 分布都不在十四经循行路线上
- D. 对某些病证有特殊疗效
- E. 是在“阿是穴”的基础上发展起来

130. 手阳明大肠经的主治特点是

- A. 后头、神志病
- B. 侧头、胁肋病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、咽喉病、胃肠病

131. 手厥阴心包经的主治特点是

- A. 心病
- B. 心、胃病
- C. 肺、喉病
- D. 肝病、脾胃病
- E. 肾、肺、咽喉病

132. 手少阳三焦经的主治特点是

- A. 前头、鼻、口齿病
- B. 前头、口齿、胃肠病
- C. 侧头、胁肋病
- D. 后头、肩胛病、神志病
- E. 后头、背腰痛

133. 足太阳膀胱经的主治特点是

- A. 后头、肩胛病，神志病
- B. 后头、背腰痛，脏腑病
- C. 侧头、耳病，胁肋病
- D. 前头、鼻、口齿病
- E. 前头、口齿、胃肠病

134. 下列特定穴中，不位于肘膝关节以下部位的是

- A. 原穴
- B. 十二经脉络穴
- C. 下合穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

135. 下列各项中，叙述不正确的是

- A. 所根为井
- B. 所溜为荥
- C. 所注为输
- D. 所行为经
- E. 所入为合

136. 合穴多位于

- A. 指、趾末端
- B. 肘膝关节附近
- C. 掌指、跖趾关节附近
- D. 掌指、跖趾关节之前
- E. 掌指、跖趾关节之后

137. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是

- A. 井穴
- B. 荥穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

138. 督脉之络穴位于

- A. 头顶部

- B. 上腹部
- C. 下腹部
- D. 胸胁部
- E. 尾骶部

139. 脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴称为

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 募穴
- D. 五输穴
- E. 八会穴

140. 手阳明大肠经的络穴是

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 偏历
- E. 温溜

141. 大肠的下合穴是

- A. 合谷
- B. 曲池
- C. 天枢
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

142. 大肠的募穴是

- A. 下腕
- B. 中腕
- C. 梁门
- D. 水道
- E. 天枢

143. 治疗急性胃痛应首选的腧穴是(B)

- A. 梁门
- B. 梁丘
- C. 内庭
- D. 上巨虚
- E. 下巨虚

144. 解溪穴的特定穴属性是

- A. 原穴
- B. 输穴
- C. 经穴

- D. 郄穴
- E. 络穴

145. 不属于足阳明胃经五输穴的是

- A. 厉兑
- B. 解溪
- C. 内庭
- D. 陷谷
- E. 丰隆

146. 不属于足太阴脾经五输穴的是

- A. 大都
- B. 地机
- C. 商丘
- D. 太白
- E. 隐白

147. 既为脾经络穴又属于八脉交会穴的是

- A. 公孙
- B. 丰隆
- C. 后溪
- D. 列缺
- E. 阴陵泉

148. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 风湿热
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

149. 体温上升期的临床表现是

- A. 皮肤潮红而灼热
- B. 畏寒或寒战，皮肤苍白无汗
- C. 呼吸加快、加强
- D. 心率减慢，脉搏有力
- E. 可有出汗，尿少色黄

150. 体温下降呈渐降形式的是

- A. 疟疾
- B. 输液反应
- C. 风湿热
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 急性肾盂肾炎

第二单元

151. 脑出血引起发热的主要原因是

- A. 植物神经功能紊乱
- B. 体温调节中枢的功能失常
- C. 无菌性坏死物质的吸收
- D. 皮肤散热量的减少
- E. 感染性发热

152. 属感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热
- E. 广泛性皮炎

153. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A. 产热过多
- B. 散热过少
- C. 抗原-抗体反应
- D. 坏死物质吸收
- E. 植物神经功能紊乱

154. 下列可引起反射性呕吐的是

- A. 晕动病
- B. 脑膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 休克
- E. 有机磷中毒

155. 引起心绞痛疼痛的原因是

- A. 挤压
- B. 出血
- C. 坏死
- D. 扩张
- E. 缺血

156. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是

- A. 颅内高压症
- B. 小脑肿瘤
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑膜炎
- E. 中暑

157. 血管性头痛的特点多是

- A. 胀痛
- B. 电击痛
- C. 重压感
- D. 牵拉痛
- E. 紧箍感

158. 头痛常在夜间发作的是

- A. 颅内占位性病变所致头痛
- B. 高血压性头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 眼源性头痛
- E. 副鼻窦炎所引起的头痛

159. 有关头痛的说法下列哪项不正确

- A. 小脑幕以下病变引起的头痛多位于后枕部
- B. 三叉神经痛表现为颜面部发作性电击样疼痛
- C. 紧张性头痛多在下午或傍晚出现
- D. 舌咽神经痛的特点是咽后部发作性疼痛并向耳及枕部放射
- E. 大脑半球的病变疼痛多位于病变的对侧，以颞部为多

160. 昏睡的主要临床表现是

- A. 呼唤和推动身体不能使其清醒
- B. 对强烈疼痛刺激可唤醒
- C. 角膜、对光反射消失
- D. 腱反射消失
- E. 能正确回答问题

161. 浅昏迷的主要临床特点是

- A. 对声、光刺激仍有反应
- B. 对强烈疼痛刺激无反应
- C. 对光反射存在
- D. 角膜反射消失
- E. 吞咽反射消失

162. 典型心绞痛的疼痛性质是

- A. 灼痛
- B. 刺痛
- C. 闷痛
- D. 压榨样痛
- E. 酸痛

163. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是

- A. 急性化脓性胆管炎
- B. 结缔组织病
- C. 急性腹腔内出血
- D. 肠梗阻
- E. 结核性腹膜炎

164. 下列各项，可引起腹痛伴休克的是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 肝破裂
- C. 慢性胰腺炎
- D. 胃癌
- E. 急性阑尾炎

165. 可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是

- A. 消化性溃疡
- B. 胆道蛔虫梗阻
- C. 肾结石
- D. 肠梗阻
- E. 急性弥漫性腹膜炎

166. 急性喉头水肿的主要临床表现是

- A. 体温 38℃ 以上
- B. 心率加快
- C. 烦躁不安
- D. 饮水呛咳
- E. 吸气时出现“三凹征”

167. 吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是

- A. 兴奋呼吸中枢
- B. 使支气管痉挛
- C. 使肺淤血
- D. 肺泡弹性减弱
- E. 呼吸中枢受抑制

168. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是

- A. 呼吸深快
- B. 吸气费力
- C. 呼吸深慢
- D. 呼气费力
- E. 吸气和呼气均感费力

169. 心源性哮喘最主要的临床表现是

- A. 气闷、气促
- B. 心率加快

- C. 发绀、出汗
- D. 端坐呼吸
- E. 两肺哮鸣音及湿啰音

170. 夜间阵发性呼吸困难，夜间发作的原因主要是

- A. 迷走神经兴奋性增高
- B. 呼吸中枢被抑制
- C. 代谢性酸中毒
- D. 压力感受器受刺激
- E. 肺通气、换气功能不良

171. 支气管哮喘发作时的主要临床表现是

- A. 胸闷、咳嗽
- B. 出汗、微绀
- C. 鼻痒、喷嚏
- D. 双肩耸起
- E. 呼气延长伴哮鸣音

172. 支气管扩张的典型症状是

- A. 发热、盗汗
- B. 消瘦、贫血
- C. 刺激性干咳
- D. 胸痛
- E. 慢性咳嗽、咯脓性痰

173. 可引起混合性呼吸困难的疾病是

- A. 肺气肿
- B. 支气管哮喘
- C. 急性喉炎
- D. 重症肺炎
- E. 支气管异物

174. 咳嗽伴杵状指的疾病是

- A. 支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 肺结核
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 胸膜炎

175. 引起痰分层现象的疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺炎链球菌肺炎

E. 心源性哮喘

176. 引起咯血最常见的疾病是

- A. 肺结核
- B. 肺淤血
- C. 肺部恶性肿瘤
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 肺梗死

177. 咯血量较大而能骤然停止的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 肺结核空洞
- C. 肺脓肿
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺炎球菌性肺炎

178. 符合溶血性黄疸表现的是

- A. 网织红细胞减少
- B. 尿中尿胆原减少
- C. 尿中有胆红素
- D. 大便色浅
- E. 结合胆红素与总胆红素比值 $<20\%$

179. 符合阻塞性黄疸表现的是

- A. 粪便颜色加深
- B. 尿中胆红素阴性
- C. 尿中尿胆原增加
- D. 心率增快
- E. 血清碱性磷酸酶明显增高

180. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 原发性胆汁性肝硬化
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 毒蕈中毒
- D. 蚕豆病
- E. 病毒性肝炎

181. 先有体温升高后有意识障碍的疾病是

- A. 脑出血
- B. 病毒性脑炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 巴比妥中毒
- E. 冬眠灵中毒

182. 以夜间阵发性呼吸困难为突出表现的是

- A. 喉头水肿
- B. 左心衰竭
- C. 右心衰竭
- D. 支气管哮喘
- E. 胸腔积液

183. 心源性水肿最常见的病因是

- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 渗出性心包炎
- D. 缩窄性心包炎
- E. 心绞痛

184. 可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是

- A. 胆囊炎
- B. 胆管炎
- C. 胰头癌
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

185. 正常肺泡呼吸音最明显的听诊部位在

- A. 喉部
- B. 胸骨角附近
- C. 右肺尖
- D. 肩胛下部
- E. 肩胛上部

186. 下列各项，可引起听觉语音增强的是

- A. 气管异物
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 肺实变
- E. 胸膜增厚粘连

187. 主动脉瓣狭窄，可出现的体征是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨右缘第 2 肋间舒张期震颤

188. 引起中性粒细胞减少的疾病是

- A. 脾功能亢进

- B. 尿毒症
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性溶血

189. 下列各项，不引起淋巴细胞增多的疾病是

- A. 百日咳
- B. 流行性腮腺炎
- C. 肾综合征出血热
- D. 免疫缺陷性疾病
- E. 结核病

190. 前间壁心肌梗死特征性心电图改变出现的导联是

- A. V_1 、 V_2 、 V_3
- B. V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_5
- C. V_3 、 V_4 、 V_5
- D. V_5 、I、aVL
- E. II、III、aVF

191. QRS 波群代表的是

- A. 心室肌除极过程
- B. 心房肌除极过程
- C. 心室肌复极过程
- D. 心房肌复极过程
- E. 房室交界区的兴奋性

192. 下列关于心电图价值的描述，错误的是

- A. 能反映心功能
- B. 能确诊心律失常
- C. 诊断心肌梗死
- D. 辅助诊断房室肥大
- E. 辅助诊断电解质紊乱

193. 下列各项，不属室性早搏心电图特点的是

- A. 提前出现宽大的 QRS 波
- B. 宽大 QRS 波前无 P 波
- C. QRS 波时间 $>0.12s$
- D. 其 T 波方向与 QRS 主波方向相反
- E. 代偿间期不完全

194. 婴幼儿咳嗽、发烧, 首选的 X 线检查方法是

- A. 摄胸片正位
- B. 摄胸片侧位
- C. 摄胸片正侧位

- D. 胸部透视
- E. 支气管造影

195. 支气管肺炎的基本病变是

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化
- D. 钙化
- E. 肺水肿

196. 最常见的支气管扩张类型是

- A. 囊状扩张
- B. 柱状扩张
- C. 囊状或柱状扩张混合存在
- D. 局限性梭形扩张
- E. 球状扩张

197. 肺癌空洞常发生于

- A. 鳞状上皮癌
- B. 腺癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 小细胞未分化癌
- E. 细支气管-肺泡癌

198. 胃溃疡的主要 X 线表现是

- A. 黏膜破坏
- B. 黏膜中断
- C. 龛影
- D. 充盈缺损
- E. 痉挛性切迹

199. 传染病的基本特征为

- A. 有传染性、免疫性和病原体
- B. 有传染性、流行性、地方性和季节性
- C. 有传染性、病原体、免疫性和流行性
- D. 有传染性、传播途径和传染源
- E. 有传染性、免疫性和流行性

200. 下列各项，可降低人群易感性的是

- A. 新生儿增加
- B. 非流行区人口迁入
- C. 免疫人口死亡等
- D. 新的传染病出现或传入
- E. 接种疫苗

201. 潜伏期是指

- A. 自病原体侵入机体至典型症状出现
- B. 自病原体侵入机体至排出体外
- C. 自病原体侵入机体至临床症状开始出现
- D. 自接触传染源至患者开始出现症状
- E. 自接触传染源至典型症状出现

202. 再燃是指

- A. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体
- B. 传染病患者进入恢复期后，已稳定退热一段时间，潜伏于组织内的病原体再度繁殖，使发热等初发症状再度出现
- C. 传染病患者在恢复期，体温未稳定下降至正常，又再度升高
- D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体
- E. 传染病痊愈以后再次发病

203. 传染病与感染性疾病的主要区别是

- A. 有无病原体
- B. 有无感染后免疫
- C. 有无发热
- D. 有无传染性
- E. 有无皮疹

204. 病原体侵入人体后，局限在机体的某些部位，但机体免疫功能不足以将病原体清除，一旦机体免疫功能低下可发病。此种表现属于

- A. 病原携带状态
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 机会性感染

205. 在感染过程中，最常见的表现形式是

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

206. 传染病流行过程的基本条件是

- A. 散发、流行、暴发
- B. 病原体、人体、外环境
- C. 自然因素、社会因素
- D. 传染源、传播途径、易感人群
- E. 患者、病原携带者、受感染的动物

207. 确定传染病检疫期的依据是

- A. 隔离期
- B. 传染期
- C. 最长潜伏期
- D. 最短潜伏期
- E. 平均潜伏期

208. 下列传染病常见出疹时间, 错误的是

- A. 水痘多在第 1 病日
- B. 猩红热多在第 2 病日
- C. 天花多在第 3 病日
- D. 麻疹多在第 4 病日
- E. 伤寒多在第 5 病日

209. 下列传染病, 外周血白细胞正常或减少的是

- A. 流行性出血热
- B. 狂犬病
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 伤寒

210. 下列各项, 不属传染源的是

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 隐性感染者
- D. 易感者
- E. 受感染的动物

211. 下列传染病, 根据传染病防治法要求, 不按甲类传染病管理的是

- A. AIDS
- B. SARS
- C. 肺炭疽
- D. 鼠疫
- E. 霍乱

212. 下列各项, 与病原体致病作用无关的是

- A. 侵袭力
- B. 毒力
- C. 数量
- D. 大小
- E. 变异性

213. 下列感染中, 没有传染性的是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染的潜伏期
- C. 显性感染的症状明显期
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

214. 传染病流行过程的三环节是

- A. 传染源、传播途径、易感人群
- B. 病原体、传播途径、易感人群
- C. 病原体、社会因素、环境因素
- D. 人体、病原体、外环境
- E. 人体、病原体、社会因素

215. 确定传染病隔离期的主要依据是

- A. 最短潜伏期
- B. 平均潜伏期
- C. 最长潜伏期
- D. 前驱期
- E. 传染期

216. 停药后血药浓度已降至阈浓度以下仍残存的药理效应是

- A. 停药反应
- B. 过敏反应
- C. 后遗效应
- D. 耐受性
- E. 毒性反应

217. 存在首过效应的给药途径是

- A. 口服
- B. 静脉注射
- C. 皮肤给药
- D. 肌内注射
- E. 舌下给药

218. 酸性药物过量中毒，为加速排泄，可以采用的方法是

- A. 碱化尿液，减少肾小管重吸收
- B. 酸化尿液，促进肾小管重吸收
- C. 碱化尿液，促进肾小管重吸收
- D. 酸化尿液，减少肾小管重吸收
- E. 酸化尿液，促进肾小球滤过

219. 药物转化酶系统中属于非专一性的酶是

- A. 胆碱酯酶
- B. 单胺氧化酶

- C. 过氧化物歧化酶
- D. 肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系
- E. 胃蛋白酶

220. 首次剂量加倍的目的是

- A. 为了使血药浓度维持高水平
- B. 为了使血药浓度迅速达到 C_{ss}
- C. 为了药理作用加倍
- D. 为了延长半衰期
- E. 为了提高生物利用度

221. 某药 $t_{1/2}$ 为 12 小时，每天给药两次，每次固定剂量，血药浓度大于稳态血药浓度 98% 所需要的最短时间是

- A. 1 天
- B. 1.5 天
- C. 3 天
- D. 4 天
- E. 7 天

222. 可以通过血脑屏障的药物是

- A. 脂溶性高、分子量较小
- B. 脂溶性低、分子量较小
- C. 脂溶性低、分子量较大
- D. 水溶性高、分子量较大
- E. 脂溶性高、分子量较大

223. 某患者服用巴比妥类催眠药后，次晨仍有困倦、头晕、乏力等反应，这属于

- A. 药物的特异质反应
- B. 药物的副作用
- C. 药物的变态反应
- D. 药物的急性毒性反应
- E. 药物的后遗效应

224. 因失眠，睡前服用苯巴比妥钠，第二天上午呈现宿醉现象，属于的不良反应种类是

- A. 副作用
- B. 毒性反应
- C. 停药反应
- D. 后遗效应
- E. 变态反应

225. 毛果芸香碱治疗虹膜睫状体炎应采用的方法是

- A. 与缩瞳药同时应用
- B. 单独使用
- C. 与扩瞳药交替使用

- D. 与缩瞳药交替使用
- E. 与扩瞳药同时使用

226. 全身麻醉前给药，应选用的药物是

- A. 毛果芸香碱
- B. 新斯的明
- C. 毒扁豆碱
- D. 阿托品
- E. 安定

227. 关于去甲肾上腺素的临床应用，错误的是

- A. 在短时间内保证重要脏器的血液供应
- B. 用于药物中毒引起的低血压
- C. 用于出血性休克早期血压骤降时
- D. 用于上消化道出血
- E. 用于胃出血

228. 关于 β 受体阻滞药的适应证，错误的是

- A. 心律失常
- B. 支气管哮喘
- C. 心肌梗死
- D. 高血压
- E. 心绞痛

229. 对各种类型癫痫均有治疗作用的药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 地西洋
- C. 乙琥胺
- D. 苯巴比妥
- E. 丙戊酸钠

230. 下列属于氯丙嗪药理作用的是

- A. 激动 M 受体
- B. 减少催乳素分泌
- C. 收缩血管升压
- D. 肾上腺素翻转
- E. 抗帕金森病

231. 吗啡的药理作用是

- A. 扩瞳
- B. 镇咳平喘
- C. 提高胃肠平滑肌张力
- D. 兴奋呼吸
- E. 降低颅内压

232. 小剂量阿司匹林临床用于

- A. 风湿性关节炎
- B. 头痛
- C. 发热
- D. 神经痛
- E. 预防血栓形成

233. 关于可乐定的叙述，错误的是

- A. 属于中枢性降压药
- B. 单用于III级高血压
- C. 用于II级高血压
- D. 适用于兼有溃疡病的高血压患者
- E. 有镇静作用

234. 禁用于消化性胃溃疡患者的降压药是

- A. 可乐定
- B. 卡托普利
- C. 硝普钠
- D. 利血平
- E. 硝苯地平

235. 关于利多卡因的应用，错误的是

- A. 心肌梗死致室性心律失常
- B. 强心苷中毒致室性心律失常
- C. 室性心律失常
- D. 室性早搏
- E. 心房纤颤

236. 强心苷中毒心脏反应中最多且早见的不良反应是

- A. 室上性心动过速
- B. 窦性心动过缓
- C. 室性早搏
- D. 室性心动过速
- E. 房室传导阻滞

237. 不宜使用普萘洛尔的是

- A. 稳定型心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 不稳定型心绞痛
- D. 高血压伴心绞痛
- E. 心律失常伴心绞痛

238. 糖皮质激素隔日清晨一次给药法（隔日疗法）可避免的不良反应是

- A. 反跳现象
- B. 诱发和加重感染
- C. 对胃酸和胃蛋白酶分泌的刺激作用
- D. 类肾上腺皮质功能亢进综合征
- E. 停药后肾上腺皮质功能不全

239. 急性上呼吸道感染说法错误的是

- A. 白细胞计数一般正常或偏高，分类淋巴细胞比例相对降低
- B. 病毒分离有助于确诊
- C. 免疫荧光技术检测，阳性者有助于早期诊断
- D. 血清学检查有助于早期诊断
- E. 伴有细菌感染时，可见白细胞计数增高

240. 患者，男，23岁。3日前受凉后出现咽干、口渴、头胀痛，伴鼻塞、流浊涕、流泪。查体：体温 38.5℃，鼻黏膜轻度充血水肿，咽部轻度充血，余未查及异常。舌淡红，苔薄白。脉浮数。血常规：白细胞 $10.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.65，淋巴细胞 0.30。应首先考虑的诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 普通感冒
- C. 急性鼻窦炎
- D. 急性支气管炎
- E. 急性扁桃体炎

241. 急性支气管炎胸部 X 线表现是

- A. 双肺有片状阴影
- B. 正常或有肺纹理增强
- C. 肺门阴影增强
- D. 右下肺有片状阴影
- E. 沿支气管分布的小片状阴影

242. 某患者，咳嗽新起，咳声嘶哑，干咳无痰，黏稠难出，咳引胸痛，鼻燥咽干，恶风头痛，舌尖红，苔薄黄而干。其中医证型是

- A. 风寒袭肺证
- B. 燥热伤肺证
- C. 风热犯肺证
- D. 凉燥伤肺证
- E. 寒饮犯肺证

243. 慢性支气管炎 X 线检查可见

- A. 两肺纹理增粗，呈网状或条索状，以下肺野较明显
- B. 肺纹理增粗或呈卷发状
- C. 两肺野的透亮度增加，肺血管纹理外带纤细、稀疏和变直，内带的血管纹理可增粗或紊乱
- D. 块状阴影或结节状影
- E. 肺动脉影增宽

244. 下列各项，不属于慢性阻塞性肺疾病体征的是

- A. 桶状胸
- B. 语颤增强
- C. 肺部叩诊为过清音
- D. 两肺呼吸音减弱
- E. 肝脏浊音界下降

245. 张某，女，43岁，1个月来干咳，胸闷憋气，呼吸困难，夜间明显，影响睡眠，既往有类似发作病史，双肺可闻及哮鸣音。治疗应首选的药物是

- A. 口服安定
- B. 雾化吸入色甘酸钠
- C. 吸入特布他林，口服茶碱控释片
- D. 静脉滴注琥珀酸氢化可的松
- E. 氧气吸入

246. 下列各项中，不属于心力衰竭基本病因的是

- A. 缺血性心肌损害
- B. 心肌炎和心肌病
- C. 心肌代谢障碍性疾病
- D. 压力负荷（后负荷）过重
- E. 过度劳累与情绪激动

247. 下列哪项不是心律失常的发生机制

- A. 自律性降低
- B. 异常自律性
- C. 触发活动致冲动形成异常
- D. 折返激动
- E. 传导阻滞

248. 无血流动力学障碍的持续性室性心动过速，应首先给予

- A. 索他洛尔
- B. 胺碘酮
- C. 利多卡因
- D. 阿替洛尔
- E. 美托洛尔

249. 目前诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A. X线钡餐检查
- B. 血清胃泌素测定
- C. 胃镜检查加活检
- D. 胃酸测定
- E. 血清抗壁细胞抗体测定

250. 慢性肾炎中，由急性肾炎转变而来的是

- A. 全部
- B. 少数
- C. 半数
- D. 大多数
- E. 没有

251. 缺铁性贫血的红细胞特点是

- A. 正细胞正色素性贫血
- B. 大细胞低色素性贫血
- C. 小细胞低色素性贫血
- D. 巨细胞高色素性贫血
- E. 小细胞高色素性贫血

252. 反映甲状腺功能最有价值的指标是

- A. FT_3
- B. FT_4
- C. T_3
- D. T_4
- E. TSH

253. TIA 最常见的临床表现是

- A. 运动障碍
- B. 麻木
- C. 头晕
- D. 眼花
- E. 恶心呕吐

254. 沿表皮蚀烂，越腐越痒的属

- A. 风胜
- B. 湿胜
- C. 热胜
- D. 虫淫
- E. 血虚

255. 疮疡初起，肿势散漫不聚，为促使疮形缩小，趋于局限，早日成脓和破溃，治疗应首选

- A. 草药
- B. 油膏
- C. 箍围药
- D. 掺药
- E. 消散药

256. 蛛网膜下腔麻醉不适用于

- A. 甲状腺手术

- B. 下腹部手术
- C. 盆腔手术
- D. 下肢手术
- E. 肛门及会阴部手术

257. 蛛网膜下腔麻醉最常见的并发症是

- A. 术后头痛
- B. 腰背痛
- C. 尿潴留
- D. 下肢瘫痪
- E. 低血压

258. 不属慢性贫血输血适应证的是

- A. 心率 >100 次/分
- B. 心绞痛发作
- C. 胸闷气短
- D. 体位性低血压
- E. 高钾血症

259. 发生于口底颌下的急性蜂窝织炎最严重的后果是

- A. 面部蜂窝织炎
- B. 纵隔化脓性感染
- C. 呼吸困难、窒息
- D. 吞咽困难
- E. 脓毒血症

260. 下列哪项不属于脑震荡的诊断要点

- A. 神经系统检查无阳性体征
- B. 有一过性昏迷，不超过半小时
- C. 有头部外伤史
- D. 肢体活动障碍
- E. 近事遗忘

261. 张力性气胸最确切的诊断依据是

- A. 伤侧肺呼吸音消失
- B. 广泛而严重的皮下气肿
- C. 胸膜腔穿刺抽出高压气体
- D. 胸部X线检查见伤肺完全萎陷
- E. 严重缺氧导致呼吸循环衰竭

262. 食管癌的主要证型不包括

- A. 痰气交阻证
- B. 痰湿内蕴证
- C. 瘀毒内结证

- D. 邪热内陷证
- E. 津亏热结证

263. 患者，女性，36岁，乳房内多发性肿块，伴疼痛，月经后有所缩小、变软，应首先考虑的诊断是

- A. 乳腺增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

264. 下列除哪项外均为门脉高压症的临床表现

- A. 外周静脉压升高
- B. 腹壁静脉扩张
- C. 腹水
- D. 食管静脉曲张
- E. 脾肿大

265. 急腹症病人腹腔内穿刺液为带臭味的血性液，最可能为

- A. 肠套叠
- B. 绞窄性肠梗阻
- C. 急性胰腺炎
- D. 胃、十二指肠溃疡穿孔
- E. 胆囊穿孔

266. 疝囊壁部分由腹内脏器构成的腹外疝属

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 滑动性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

267. 患者，男，52岁，左下肢发凉，间歇性跛行1年，冠心病史3年，心电图检查示冠状动脉供血不足。应首先考虑的诊断是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 动脉硬化性闭塞症
- C. 单纯性下肢静脉曲张
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 干性坏疽

268. 下列关于女性骨盆的叙述，错误的是

- A. 骨盆入口呈横椭圆形
- B. 入口横径长于前后径
- C. 耻骨弓较宽

- D. 坐骨棘间径小于 10cm
- E. 骶骨切迹呈圆形

269. 我国妇女最常见的骨盆类型是

- A. 女型
- B. 男型
- C. 扁平型
- D. 漏斗型
- E. 类人猿型

270. 下列各项，不属骨盆平面的是

- A. 骨盆入口平面
- B. 骨盆轴平面
- C. 中骨盆平面
- D. 骨盆最大平面
- E. 骨盆出口平面

271. 骨盆的类型中最多见的是

- A. 女型
- B. 男型
- C. 类人猿型
- D. 扁平型
- E. 漏斗型

272. 下列关于阴道解剖的叙述，错误的是

- A. 阴道位于骨盆下部的中央
- B. 阴道上端较下端宽敞
- C. 阴道后壁较前壁长
- D. 阴道上端包绕宫颈，下端开口于前庭前部
- E. 阴道为复层扁平上皮所覆盖，无腺体

273. 下列关于阴道的形态学及组织学特征的叙述，正确的是

- A. 阴道下端比上端宽
- B. 阴道黏膜受性激素影响有周期性变化
- C. 下端开口于前庭前部
- D. 黏膜覆以单层柱状上皮
- E. 阴道壁有丰富的腺体

274. 子宫最狭窄的部分是

- A. 组织学内口
- B. 解剖学内口
- C. 宫颈管
- D. 子宫峡部
- E. 子宫外口

275. 下列关于输卵管的叙述，错误的是
- A. 为精子与卵子结合的场所
 - B. 分间质部、峡部、壶腹部、伞部 4 个部分
 - C. 伞端有“拾卵”作用
 - D. 由浆膜层、黏膜层构成
 - E. 黏膜受激素影响发生周期性变化

276. 下列关于宫颈的叙述，错误的是
- A. 宫颈主要由平滑肌纤维组成
 - B. 分阴道上部和阴道部
 - C. 宫颈管黏膜有腺体，分泌碱性黏液
 - D. 鳞柱状上皮交界处为宫颈癌的好发部位
 - E. 宫颈黏液栓有利于防止病原体侵入

277. 宫颈癌的好发部位是
- A. 宫颈管
 - B. 柱状上皮
 - C. 宫颈阴道部
 - D. 鳞状上皮
 - E. 宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处

278. 子宫内膜发生周期性变化的是
- A. 基底层
 - B. 功能层
 - C. 浆膜层
 - D. 肌层
 - E. 子宫内膜层

279. 下列关于骨盆底的叙述，正确的是
- A. 外层为盆膈
 - B. 中层为泌尿生殖膈
 - C. 肛门外括约肌属盆膈范围
 - D. 球海绵体肌有松弛阴道作用
 - E. 肛提肌是组成骨盆底的一块肌肉

280. 下列关于前庭大腺的叙述，错误的是
- A. 又称巴氏腺，位于大阴唇后部
 - B. 左右各一个
 - C. 开口于处女膜与小阴唇之间的沟内
 - D. 正常时如黄豆大小，检查时可触及
 - E. 腺管堵塞，可形成前庭大腺囊肿或脓肿

281. 成年女子宫体与宫颈的比例是

- A. 2:1
- B. 1:2
- C. 1:1
- D. 3:1
- E. 3:2

282. 下列关于女性外生殖器解剖的叙述，正确的是

- A. 女性外生殖器即会阴
- B. 阴阜即耻骨联合前面隆起的脂肪垫
- C. 前庭球位于会阴两侧，前部与阴蒂相连
- D. 前庭大腺称斯氏腺
- E. 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区

283. 下列各项，不属胎儿附属物的是

- A. 胎盘
- B. 胎膜
- C. 胎脂
- D. 脐带
- E. 羊水

284. 下列关于胎盘组成的叙述，正确的是

- A. 平滑绒毛膜+包蜕膜+羊膜
- B. 平滑绒毛膜+底蜕膜+真蜕膜
- C. 叶状绒毛膜+包蜕膜+真蜕膜
- D. 叶状绒毛膜+底蜕膜+羊膜
- E. 叶状绒毛膜+真蜕膜+底蜕膜

285. 孕妇尿中与胎儿胎盘功能关系密切的激素是

- A. 雌二醇
- B. 雌酮
- C. 雌三醇
- D. 孕酮
- E. 睾酮

286. 下列关于正常枕先露分娩机制的叙述，正确的是

- A. 下降，衔接，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转
- B. 衔接，俯屈，内旋转，下降，仰伸复位，外旋转
- C. 衔接，下降，俯屈，内旋转，仰伸复位，外旋转
- D. 下降，俯屈，衔接，内旋转，仰伸复位，外旋转
- E. 衔接，下降，内旋转，俯屈，仰伸复位，外旋转

287. 初产妇，23岁。32周妊娠，阴道流水1小时入院，检查：无宫缩，胎心率130次/分，胎头先露，未入盆，阴道液pH值呈碱性，考虑胎膜早破。错误的处理措施是

- A. 卧床，抬高床尾

- B. 注意胎心率变化
- C. OCT 试验
- D. 注意观察体温，测血常规
- E. 注意保持会阴部清洁

288. 可疑黄体功能不全，应选择诊刮的时间是

- A. 经前期或月经来潮 6 小时内
- B. 月经来潮后 12 小时
- C. 月经来潮后 24 小时
- D. 行经第 2 天
- E. 行经第 5 天

289. 宫颈癌的临床分期是根据

- A. 有无淋巴结转移
- B. 术后所见修订分期
- C. 肉眼所见病灶大小
- D. 病灶累及的范围
- E. 临床症状严重程度

290. 下列各项，属良性葡萄胎追踪的主要目的是

- A. 及早发现妊娠
- B. 及早发现病变
- C. 指导避孕
- D. 了解盆腔恢复情况
- E. 了解腹痛情况

291. 小儿体格发育最快的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

292. 中度脱水时患儿失水量为体重的

- A. 5%~10%
- B. 10%左右
- C. 5%左右
- D. 5%以下
- E. 10%以上

293. 6 个月男婴，呕吐腹泻 3 天，无尿 12 小时，体温 37.8℃，嗜睡与烦躁交替，双眼凹陷，口唇樱红干燥，皮肤弹性差，四肢冷，脉细弱，呼吸 60 次/分，心率 160 次/分，心音低钝，腹胀，肠鸣音减少，血象：HGB150g/L，WBC 13×10^9 /L，N0.40，L0.60。初步诊断婴儿腹泻伴

- A. 重度脱水、代谢性酸中毒
- B. 中度低渗性脱水、代谢性酸中毒
- C. 重度脱水、低钾血症、代谢性酸中毒
- D. 败血症、脓毒性休克、代谢性酸中毒
- E. 重度高渗性脱水、代谢性酸中毒

294. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A. 生后 5~6 天出现, 30~35 天完全消退
- B. 生后 1~2 天出现, 3~7 天完全消退
- C. 生后 3~4 天出现, 15~20 天完全消退
- D. 生后 3~4 天出现, 21~28 天完全消退
- E. 生后 2~3 天出现, 10~14 天完全消退

295. 诊断急性支气管肺炎, 主要的肺部体征是

- A. 双肺可及捻发音
- B. 双肺呼吸音增粗
- C. 双肺呼吸音减弱
- D. 双肺可有可闻及固定的中、细湿啰音
- E. 双下肺可闻及不固定湿啰音

296. 下列各项, 不属肺炎合并心力衰竭诊断要点的是

- A. 心率突然超过 180 次/分
- B. 呼吸突然加快, 超过 60 次/分
- C. 突然极度烦躁不安, 发绀
- D. 心音低钝, 颈静脉怒张
- E. 左肋缘下可扪及脾脏

297. 病毒性心肌炎的主要病原体是

- A. 肠道病毒
- B. 柯萨奇 B 组病毒
- C. 埃可病毒
- D. 呼吸道合胞病毒
- E. 流感病毒

298. 鹅口疮心脾积热证的首选方剂是

- A. 导赤散
- B. 泻心汤
- C. 泻黄散
- D. 清热泻脾散
- E. 清胃散

299. 对急性肾炎诊断和鉴别诊断最有价值的血液化验是

- A. 抗链球菌溶血素 O 增高 (ASO)
- B. 4~8 周内总补体及 C3 暂时性下降

- C. 轻度贫血
- D. 白细胞总数增高
- E. 血沉增快

300. 营养性缺铁性贫血，铁剂治疗后停药的指征是

- A. 血清铁恢复正常
- B. 血红蛋白及红细胞恢复正常
- C. 面色转红，精神及食欲好转
- D. 网织红细胞升高后再用 1~2 个月
- E. 血红蛋白及红细胞恢复正常后再用 6~8 周